



5205511

258.

1

521

258.

~~A.~~

~~VII. C. 20.~~

~~Fla 25~~

WENCESLAI TRNKA
DE KRŽOWITZ

S. R. I. EQUITIS MEDIC. DOCT.
IN REG. UNIVERS. BUDENS.

PATHOLOGICÆ

PROF. P. O.

HISTORIA
OPHTHALMIÆ

OMNIS ÆVI OBSERVATA
MEDICA CONTINENS.



VINDOBONÆ

Prostat apud RUD. GRÆFFERUM.
CIC MDCC LXXY III.

305201



ILLUSTRI

AC

INTEGRIMO

VIRO

JOSEPHO FRIDERICO

NOBILI

DE TOMASONI

REGNI BOHEMIÆ

NEC NON

SACR. ROM. IMPERII

EQUITI

HOC SUUM
DE
OPHTHALMIA
OPUS
IN
PERPETUUM
AMICITIÆ
GRATITUDINIS ET OBSERVANTIÆ
MONUMENTUM
D. D. D.

AUCTOR.

SERIES OPERIS.

P A R S I.

pagina

CAP. I. Definitio	1
CAP. II. Genera, quæ præbet	4
I. Sedes : unde ophthalmia est	5
1. Monocula	ibid.
2. Utriusque oculi	7
3. Interna	ibid.
4. Externa	8
a) Totalis	ibid.
b) Angularis	ibid.
II. Gradus : unde	ibid.
1. Taraxis	9
2. Chemosis	ibid.
III. Habitus : hinc ophthalmia	11
1. Sicca	ibid.
2. Humida	ibid.
a) Serosa	12
b) Saniosa.	ibid.
IV. Duratio : ob quam ophthal.	13
1. Acuta	ibid.
2. Chronica	ibid.
a) Continua	14
b) Recursans	14
1) Vaga	14
2) Periodica	ibid.

v.	Causa spectata est	16
	1. Protopathica	ibid.
	2. Deuteropathica.	ibid.
CAP. III.	Proegumenæ causæ :	ibid.
	1. Ætas, sexus	ibid.
	2. Hæreditaria labes	17
	3. Idiocynerasia	ibid.
	4. Laxit. irricabilitas oculi	18
	5. Cnsensus oculorum	19
	6. Cachexiæ, ut	20
	a) Serosa	ibid.
	b) Scorbutica	21
	c) Purulenta	ibid.
	d) Cancerosa	22
	e) Scrophulosa	ibid.
	f) Syphilitica.	23
CAP. IV.	Procatasticæ causæ	14
	I. Lucubratio nimia	ibid.
	II. Stimulus externus	26
	III. Lætio externa	31
	IV. Ingesta	36
	V. Colluvies in primis viis	39
	VI. Spasmi hyst. hypochond.	40
	VII. Morbi capitis, aurium, den-	
	tium	41
	VIII. Metastases sani morbofi	45
	1. Perspirationis, sudoris	ibid.
	2. Sanguinis	51
	3. Lotii contentorum	54
	4. Exanthematum	55
	5. Inflammatorii stimuli	59
	6. Tumorum	60

7. Ulcerum	61
8. Arthritidis, podagræ	64
IX. Febres	65
1. Catarrhales	ibid.
2. Intermittentes	66
a) Irritatæ emeticis	ibid.
b) Larvatæ	68
X. Contagiumne etiam?	70
CAP. V. Symptomata	74
I. Communia inflammationis	75
1. Rubor	76
2. Tumor	77
3. Dolor	79
4. Febris	81
II. Propria ophthalmiarum	84
1. Cephalalgia	ibid.
2. Spasmi, convulsiones	85
a) Pupillæ	ibid.
b) Palpebrarum	85
c) Musculor. faciei	ibid.
d) Artuum	86
3. Lucis impatientia	86
4. Epiphora	ibid.
5. Anchyloblepharosis	
spuria	88
6. Visus imminutio.	89
CAP. VI. Prognosis.	90
I. Chronicæ raro curabiles	ibid.
II. Effectus duplices :	93
A. Communes inflammat.	97
1. Suppuratio, scil.	ibid.
a) Hypopion	ibid.

b) Abscessus adnatæ	103
c) Ulceratio tarforum	108
d) Ulcera corneæ	109
2. Scirrhus, cancer	ibid.
3. Gangræna	110
B. Proprii ophthalmiarum:	ibid.
1. Leucomata	111
2. Pterygia	ibid.
3. Pustulæ variæ	112
4. Anchyloblepharosis	
vera	113
5. Iris fissæ, staphyloma	113
6. Cataracta	114
7. Amblyopia, amaurof.	ibid.
III. Letalisne unquam oph-	
thalmia?	ibid.
IV. Solvunt eam	116
1. Resolutio benigna	ibid.
2. Crisis, ut	ibid.
a) Hæmorrhagia	ibid.
b) Sudor	126
c) Alvi fluxus	127
3. Metastasis, partim	ibid.
a) Mala, partim	ibid.
b) Bona	133
4. Febris	136
5. Tempus	138

P A R S II.

PROLEGOMENON : curationis suã 147

S E C T I O I.

P H A R M A C A.

CAP. I. Emetica,	149
Cathartica, horum	165
Cautelæ, scil.	169
1. Selectus	ibid.
2. Iteratio	177
3. Contraindicantia	184
CAP. II. Solventia	185
1. Nitrum	ibid.
2. Aquæ minerales	186
3. Lumbric. terr. succus	190
4. Cicuta	ibid.
5. Arnicæ flores	191
CAP. III. Diaphoretica	194
1. Lignorum decoctum	196
2. Phosphorus urinæ	198
3. Auripigmenti sulphur	199
4. Vinum	207
CAP. IV. Cortex Peruvianus,	214
CAP. V. Mercurius	227
CAP. VI. Opium.	241

S E C T I O I I .

C H I R U R G I A .

CAP. I. Sanguinis missio, quam	243
Indicant :	244
1. Plethora	ibid.
2. Phlogistica diathesis	ibid.
3. Principium morbi	ibid.
4. Symptomata gravia	246
Copia quæ demenda ?	ibid.
Delectus vasorum	253
A. Arteria temporalis	ibid.
B. Venæ autem	258
1. Brachii	ibid.
a) Humeraria	259
b) Cephalica	ibid.
c) Salvatella	ibid.
2. Pedis	261
3. Ani, vulvæ	ibid.
4. Juguli	262
5. Frontis , temporum	
occipitis, &c.	266
6. Palpebrarum	271
7. Canthi	276
8. Adnatæ	277
Modi mittendi	284
1. Ferro	ibid.
2. Hirudinibus	285
Contraindicant :	288
1. Morbi levitas	ibid.
2. Humores tenues acres	289

CAPUT II. Enemata , &c.	290
-------------------------	-----

Balnea 291

1. Universalia ibid.

2. Pediluvia 294

3. Capitiluvia 301

CAPUT III. Cucurbitulæ, ac 303

Rubefacientia, in primis 304

1. Urtica urens 307

2. Thymelææ vel ibid.

3. Mezeræi cortices. 310

CAPUT IV. Mucum e capite elicentia 311

1. Errhina 312

2. Apophlegmatismi 314

CAPUT V. Rasura capitis 315

CAPUT VI. Ulcera arte facta 318

Velicantia ibid.

Fonticuli, setacea; 332

1. Loca eorum sunt 334

a) Brachia ibid.

b) Maxilla inferior 335

c) Nucha 338

d) Oculi ibid.

e) Mastoidea apophy-
sis 339

f) Auriculæ, 340

2. Indicantia eorum sunt

a) Recidivæ 442

b) Contumax morbus 347

c) Epiphora acris 353

d) Acrimonia humo-
rum ibid.

3. Cautelæ, ut

a) Vacuationes præce-
dant; 357

b) Fonticulus in late-	
re affecto sit;	358
c) Setaceum non ju-	
vante fonticulo	
sufficiatur;	359
d) Setaceo sanato fon-	
ticulus surrogetur;	367
e) Ulcera hæc diu fo-	
veantur;	369
f) Eadem sanata rena-	
to morbo renoven-	
tur.	371
4. Contraindicantia eo-	
rum	376
Periscyphismus	380
CAPUT VII. Inoculatio	382
1. Gonorrhœæ repres-	
sæ	ibid.
2. Scabiei retrogressæ	384
CAPUT VIII. Ophthalmica	387
1. Simplicia	395
A. Emollientia:	ibid.
1. Albumen ovi	396
2. Lac tepidum	397
3. Mucilagines	399
4. Malvæ flor. decoctum	401
5. Axungiæ	405
6. Gossypiumne ?	407
B. Stimulantia :	408
1. Vapores discutientes	ibid.
2. Echium minimum	413
3. Stercus vaccinum	ibid.
4. Camphora	414

5. Crocus, opium, &c.	415
C. Attenuantia :	ibid.
1. Acetum	416
2. Pomi pulpa	ibid.
3. Mulla	418
4. Urina	419
5. Aqua Rulandi	420
D. Repercutientia	ibid.
1. Aqua frig. nix, gla-	
cies	421
2. Aquæ soteriæ	425
3. Spiritus vini	426
a) Simplex	ibid.
b) Galbanatus	427
c) Camphoratus	ibid.
4. Alumen	429
5. Vitriola	431
a) Cœruleum	ibid.
b) Album	432
6. Tutia	436
7. Zinci flores	438
8. Saturnina	439
E. Mercurialia	455
F. Electricitas	461
II. Composita e prioribus	462
1. Aquæ ophthalmicæ :	463
a) Amati	ibid.
b) Foresti	464
c) Gerbezii	465
d) Gherlii	466
e) Grülingii	ibid.
f) Heisteri	469
ff) Hoffmanni	471

g) Janini	472
h) Lahmii	ibid.
i) Ridley	474
k) S. Yvesii	ibid.
l) Sydenhami L. L.	ibid.
m) Thoneri	487
n) Vienn. dispensato- rii	489

2. Unguenta ophthalmi- ca

a) Nihili albi	ibid.
b) Frauendorfferi	491
c) Janini	492
d) Penoti	493
e) S. Yvesii	ibid.
f) Sloani	496
g) Willii	497

Cautelæ in horum usu : 500

1. Tempus ea adhibendi ibid.

2. Modus iis utendi : 501

a) Calidene an fri- gide ?	ibid.
b) Terrea lævigatissi- ma funto	505
c) Adhæsiō ne sit ar- cta	ibid.
d) Supinò capite ex- cipienda	ibid.
e) Vasculis contenta applica	506

3. Delectus eorumdem; ut inde

a) Pelluciditas oculi
non pereat. ibid.

b) Dispositio ad reci-
divas tollatur. 507

• CAPUT IX. Stimuli externi ablatio 508

I. Tumores extirpandi 510

II. Illapsa eximenda per 512

a) Collyria 513

b) Globulosa cor-
pora 519

c) Magnetem 520

d) Anthelmintica 524

e) Instrumenta 526

III. Phalangosis evellen-
da &c. 530

• CAPUT X. Extirpatio oculi. 535

S E C T I O III.

D I A E T A. 540

• CAPUT unicum :

1. Queis corporis et animi
ibid.

2. Alimenta 541

3. Aer 543

4. Stimuli vitatio 544

*

*

*

Historiæ selectæ septemdecim :

1. Deckeri	548
2. Foresti	551
3. ———	553
4. ———	556
5. ———	560
6. Heisteri	563
7. ———	564
8. ———	566
9. ———	567
10. Hoffmanni	570
11. ———	574
12. Janini	576
13. ———	579
14. Schmuckeri	580
15. ———	583
16. ———	585
17. Sibbernii	589



HISTORIAE OPHTHALMIAE

PARS I

DE NATURA AC VARIETATE
OPHTHALMIAE.

CAPUT I.

DEFINITIO.

§. I.

OPHTHALMIA (ὀφθαλμία ἀπο τῆς ὀφθαλμοῦ ab oculo) non nullis, quos inter etiam JACCHINUS teste P. FORESTO (a) est, genericum prorsus cujus-

(a) Obs. et cur. medic. Lib. II, schol. ad obs. I.

cunque morbi oculos affligentis nomen esse videbatur, ut *ophthalmiam* idem ac *morbum oculi* esse, nec nisi per antonomasiam inflammationi oculorum nomen hoc a Græcis tribui, contenderint. Sed ut ut hæc sint, certum tamen est, ab nemine Græcorum ophthalmiæ nomen ulli alteri ægritudini præterquam inflammationi oculorum fuisse inditum, et id soli quidem inflammationi tunicæ adnatæ, quod ex GALENI (b) verbis colligitur dicentis: „ ophthalmia quidem est inflammatio membranæ, quæ adnata est corneæ, ex accidenti vero est totius oculi morbus,,. Hodierni tamen pathologi nihil hic accidenti dandum esse volunt, statuuntque ab eadem causa, quæ adnatæ inflammationem produxit, eam ceteris quoque perinde oculi partibus ab ipsa conciscisci posse, si modo tanta causæ hujus fuerit intensitas, ut in illas usque suam exserere vim queat. Quæ cum ita sint, *ophthalmia est inflammatio in oculo vel solius adnatæ vel aliarum quoque partium*, ut corneæ, uveæ, &c. vel ut J. PLENCK (c) ait „ est . . . conjunctivæ, vel totius bulbi ocularis inflammatio,,.

(b) De different. morbor. Cap. 13.

(c) Doctrina de morbis oculor. p. 70.

Mirari itaque hicce subit definitionem BOERHAAVII (*d*) dicentis : „ ophthalmia . . . est inflammatio vera tunice adnatæ et corneæ in oculo conspicua „; quasi vero sola adnata citra extraque corneam inflammari non posset, vel eatenus inflammata ophthalmiæ nomine esset indigna.

§. 2.

Latinis ophthalmia dicitur *lippitudo*, ita Græcum vocabulum Latine reddente A. C. CELSO (*e*), ut ut admodum improprie; quandoquidem *lippa* oculorum lemas e materia alba spissa puriformi enatas notat, cujus ope palpebræ spatio noctis ita inter se glutinantur, ut sine molestia dirimi nequeant: hinc fordibus hujusmodi laborantes oculi *lippi*, ipsaque hæc affectio eorum *lippitudo* nuncupatur; quæ cum ophthalmiæ ut plurimum sit comes, ista hinc apud Latinos nomen traxit, quod aptius ad id vocabulum haud suppeteret. Cum autem sæpenumero accidat, ut in leviori oculorum Xerophthalmia nihil id genus sordium colligant

(*d*) l. c.

(*e*) De medicina L. 2, C. 1. & L. 6. C. 6.

oculi; suapte natura liquet, quam absque Xerophthalmia (*f*) *lippitudo arida* dicatur (*g*).

CAPUT II.

G E N E R A.

§. 3.

Ophthalmiam varii pro modulo pathologici sui systematis varias in classes dispescunt, generaue hujus ægritudinis admodum numerosa condunt, adscitis huc etiam causis cum proegumenis tum procataceticis; quas cum ego a generibus morborum nunquam non sejungere consueverim, ophthalmiam quoque ad 5 tantummodo genera cogendam putavi, quæ suppeditant

1. Sedes
2. Gradus inflammationis
3. Duratio
4. Habitus
5. Causæ. Quapropter

(*f*) Vide §. 6. No 1.

(*g*) CÆLSUS l. c. L. 2. C. 1.

§. 4.

I. SEDES *ophthalmiæ* cum alteruter aut uterque oculus esse soleat, ac porro cum inflammatio jam extimam oculi tunicam adnatam jam intimiorem uveam choroidemve afficere observetur; erit *ophthalmia*

I. *Monocula*, quæ alterutri oculo tantummodo infesta est. Per decursum hujus libelli non paucos videre erit, *ophthalmiam* aut dextri tantum oculi, ut ALIXII (*b*) adolescenti accidit, aut sinistri, ut AMATI (*i*) erudito evenerat, perpeffos, adeo ut cum cl. OEHMB (*k*), et PEZOLDI (*l*) juvenis, et ROMMELII (*m*) puella complures *ophthalmiæ* recursus fuissent perpeffi, illa alternis jam dextrum jam sinistrum tantum oculum invaserit. „ Pannificis . . . filia 13 anno-
 „ rum (narrat ille) ab aliquot jam an-
 „ nis serosis et acribus destillationibus
 „ et defluxionibus obnoxia singulis annis
 „ tempore vernali, præsertim circa æ-
 „ quinoctium, *ophthalmia* gravi corri-

(*b*) Vide §. 77.

(*i*) Vide §. 72. I. D. No 6.

(*k*) Vide §. 48. No 4.

(*l*) Vide §. 65 No 3. c).

(*m*) Misc. nat. cur. dec. 3. ann. 2. obs. 211.

„ pitur cum doloribus inflammatoriis ma-
„ ximis, tumore, rubore, tantaque vi-
„ sus imminutione, ut vix diem a nocte
„ discernere, lucem non tolerare, ea-
„ que etiam, quæ oculo admoventur,
„ visuique objiciuntur, minime cognosce-
„ re possit, non sine periculo omnimo-
„ dæ facultatis videndi ablationis, quia
„ pupilla quasi velamine obducta con-
„ spicitur. Hæc annuatim revertens oph-
„ thalmia subinde tam pertinax fuit, ut
„ per aliquot, imo quandoque plures
„ septimanas, vix compescibilis exstite-
„ rit, ægramque continuis doloribus ex-
„ cruciarit atque defatigarit; quamvis
„ præter Væ S. et seraceum nullum reme-
„ diorum genus omissum fuerit, et juxta
„ universalia medicis dicta, omnia alia
„ in tali affectu in et externe ad et ex-
„ hiberi solita, capiti, fronti, vertici,
„ nuchæ, scapulis, oculis ipsis, brachiis,
„ pedibus, &c. applicata; collyria, ca-
„ taplasinata, ungenta, pulveres, &c.
„ pentacula et amuleta varia varie usur-
„ pata et appensa sint. Hactenus tamen
„ semper . . . continuatis alias usitatis
„ collyriis, et interne cerebrum et visum
„ corroborantibus, etiamsi de visu recu-
„ perando aliquoties jam desperatum sit,
„ denuo reconvaluit, visusque integre
„ restitutus fuit. Quod in hoc casu no-

„ tatu maxime dignum mihi videtur, est,
„ quod hæc anniverfaria ophthalmia non
„ femper unum eundemque oculum vel
„ ambos fimul, fed fingulis annis unicum
„ duntaxat oculum, modo dextrum mo-
„ do finiftrum, alternatim affligat, et in
„ eodem tyrannidem fuam exerceat.
„ Præterito tamen vere præter hæcenus
„ obfervatum ordinem denuo oculum fi-
„ niftrum invafit; cum tamen, fi con-
„ fvetum typum obfervaffet, hac vice
„ dextrum corripere debuiffet. Sed ...
„ hac etiam vice valetudini reftitutus eft.
„ Reliqui etiam liberi iftiusmodi deflu-
„ xionibus ad oculos valde obnoxii funt;
„ fed mitius ab iisdem habentur. Quid
„ in pofterum futurum, et utrum com-
„ parentibus fuo tempore catameniis ea-
„ dem iterum fit reverfura, tempus do-
„ cebit,,.

2. *Utriusque oculi*, idque aut fimul
ac femel, aut inflammatione ex uno o-
culo fenfim in alterum quoque obrepente;
cujus utriusque rei exempla poftmo-
do paflim occurrent.

3. *Interna* porro ophthalmia eft, quæ
iridem, uveam, choroideamve tenet.
Hæc *phlegmone oculi*, ab non nullis voci-

tatur, *ophthalmites* vero ab R. A. VOGELIO (n) est appellata.

4. *Externa* denique est, quæ tunicam adnatam, ac interdum corneam quoque, pro sede nacta est. Atque hæc omnium est frequentissima; quæ ab non nullis bifariam rursus dirimi solet, diciturque

a) *Totalis*, dum omnem adnatæ superficiem infedit; secus partialis, speciatimque

b) *Angularis* ab SAINT-YVESIO (o) memoratur, dum in alterutro tantum oculorum cantho est conspicua.

§. 5.

II. GRADUS *inflammationis* non ubique idem est; quandoquidem *ophthalmiæ* sunt, non omnia, sed aliqua tantum, inflammationis phænomena exhibentes, aliæ contra toto ejusdem charactere conspicuo præditæ. Hæ non abs re *perfectæ*, illæ *imperfectæ* vocari possunt: atque sic anxietas illa, quam aliqui e difficultate oph-

(n) De cogn. et cur. præcip. C. H. affectionib.
§. 178.

(o) Von denen Krankheiten der Augen 2 Th.
4 Cap. 5 art. p. m. 178.

thalmiam rigore dialectico definiendi conceperunt, evadet curabilis. Huc itaque pertinent

1. *Taraxis* (τάραξις) seu oculi *perturbatio*, i. e. ophthalmia imperfecta sive (ut aliis præplacet, atque in idem recidit) inchoata, in qua proinde solennia inflammationis phænomena nec omnia semper nec nisi leviori in gradu præsto sunt, ut alibi (p) enucleatius visuri sumus. P. AEGINETA (q) id insuper taraxi peculiare esse voluit, quod a manifesta tantum causa (ut sole, fumo, pulvere, vino, esu acrium, ictu, &c.) oboritur: „ experientia tamen, inquit „ P. FORESTUS (r), constat, non raro „ ab interna excitari „. Atque hæc ratio est, cur taraxis ab non nullis *ophthalmia spuria* fuerit compellata (s).

2. *Chemosis* (χημωσις) vero est gravissima oculi inflammatio (proinde ophthalmia perfecta, in qua non modo omnia inflammationis phænomena manifeste adsunt, sed simul vehementiori in gradu,

(p) Vide §. 25. sqq.

(q) Lib. 3. Cap. 22.

(r) Observ. & curat. med. Lib. II. schol. ad Obs. I.

(s) Ibid. & GUERIN Versuch über die Augenkrankh. I Th. I Abschn. §. 1. p. 9.

ita ut adnata oculi insigniter rubeat, tumeat, doleatque cum febre) cum tanto adnatæ tumore, ut intra illum cornea veluti in fossa aut fovea quadam videatur esse locata. Unde nomen etiam traxisse mihi videtur; etenim *χιμν* et conchæ marinæ hiantis nomen est, et mensuræ cavæ apud Atticos, conchæ forte dictæ capacitatem æquantis, quarum cavum oculi chemosis æmulari est visa. Singula chemoseos symptomata pro magnitudine sua non multo post (t) recensentur. Chemosis certe fuit, quam perpeffi sunt ægri 4 JANINI (u), 5 SCHMUCKERI (x), femina RICHTERI (y), matrona S. YVESII (z), adolescens TILLINGII (a), vir SCHUSTERI (b), ac mater cum prole apud Vratislavienfes (c).

(t) Vide §. 25. sqq.

(u) Vide §. 55 B. No 8. et §. 34 No 1. a).

(x) Vide §. 35 No 5. §. 54. & histor. 14. 15. 16.

(y) Obs. chirurg. Fasc. 1. Cap. 13. Obs. 5. p. 135.

(z) Vide §. 22. No 5.

(a) Vide §. 72. I. A. No 2.

(b) Vide §. 64.

(c) Vide §. 72. I. D. No 7.

§. 6.

III. HABITUS *ophthalmiæ* duplex
duo quoque ejusdem genera suppeditat,
estque ophthalmia

1. *Sicca*, Græcis *Xerophthalmia* (ξη-
ροφθαλμία) dicta, five oculi inflammatio ci-
tra ullum simultaneum ex eodem humorum
effluvium, qualem descripsit L. HEISTER-
RUS (d); quæ si majorem bulbi palpebra-
rumque duritiem, dolorem, siccitatemque
præ se ferat, *Sclerophthalmia* (σκληροφθαλ-
μία) vocatur: sin minus, tunc CELSO (e)
notante „ sub hoc (ophthalmiæ genere)
„ neque tument, neque fluunt oculi,
„ sed rubent tantum, et cum dolore quo-
„ dam fere levi ac prurigine graves sunt,
„ et palpebræ citra duritiem ullam no-
„ ctu prægravi pituita inhærescunt „.
Unde id genus xerophthalmia ad taraxin,
sclerophthalmia vero ad chemosin verget.

2. *Humida*, HIPPOCRATI (f)
ὀφθαλμία ῥῶδες dicta, five oculi inflam-
matio cum humoris cujuscumque inde pro-
fluvio. Cum vero humor hic diversæ

(d) Vide histor. 7.

(e) l. c. Lib. 6. Cap. 6. art. 29.

(f) Epidem. L. 1. Sect. 2. Stat. 2. p. m. 942.

indolis (duplicis ut plurimum) esse soleat ; ophthalmia quoque humida est vel

a) *Serosa*, ubi serum lacrymis fervidis mistum ex oculis ubertim profluit. Atque hocce ophthalmiæ genus omnium est longe frequentissimum, ut in plurimis posthac exemplis patebit. Vel vero

b) *Saniosa*, ubi sanies purulenta ex discussis abscessibus aut ulceribus saniosis ad oculos translata, eos inflammat, indeque iisdem prædita dotibus, cum queis aut in abscessu coercebatur, aut ex ulcere patulo profluebat antea, jugiter dimanat. Saniosam id genus ophthalmiam ab exanthemate cutaneo repulso in juvene vidit RIBE (g), ac sæpenumero illis accidit, qui præpostera medicatione gonorrhœam syphiliticam sibi represserunt; enimvero „ biduo vel „ triduo post suppressam gonorrhœam, „ inquit J. PLENCK (b), oritur uberri- „ mus fluxus ex oculo rubente humoris „ puriformis, albo-flavescentis, et ma- „ teriæ gonorrhœicæ ante ex pene stili- „ lanti simillimi. Rubor oculorum fere „ semper in chemosim seu adeo gravem

(g) Vide §. 55. B. No 8.

(b) Doctr. de morbis venereis p. 81.

„ inflammationem abit, ut cornea obscu-
„ retur, et ob enormem membranæ al-
„ buginæ intumescientiam in foveam qua-
„ si depressa appareat „ quod SCHMUCKERI (i) juvenis ante alios est exper-
tus.

§. 7.

IV. DURATIO morbi cum perinde sit admodum varia, ophthalmia quoque sic duplicis erit generis, nimirum

1. *Acuta*, quæ celeriter et cum periculo oculi decurrit: cujusmodi præsertim chemosis est; id tamen peculiare sibi habet gravis hæc ophthalmia, quod sæpius præter morem inflammationum graviorum in longius excurrat tempus. Nam cum 14^{us} dies terminus sit acutorum morborum non usque adeo vehementium, ophthalmiæ acutiores multum sæpe ultra hunc terminum excurrere solent, ut deinceps exempla docebunt.

2. *Chronica*, aliis *habitualis* dicta, quæ vel continenter durans perquam diu detinet, vel crebrius recurrendo in diuturnitatem tendit. Habituales ejusmodi

(i) Vide histor. 16.

ophthalmias sustinuerē ægri BORELLI (k), KIRCHMEYERI (l), rusticus RIVERII (m), puer SIBBERNII (n), feminæ ACRELII (o), LENTILII (p), POUPARTI (q); puellæque binæ GOHLII (r), et cujus NOSE (s) meminit. Est proinde ophthalmia chronica rursus duplex, videlicet vel

a) *Continua*, quam HEISTERI (t) juvenis toleraverat, vel

b) *Recurfans*, eaque

1) *Vaga*, id est incertis temporibus reverti solita, qualem teste HENZE (u) ancilla quædam per 7 annos, alique complures passim postmodo dicendi, diuturno satis tempore pertulerunt, quos inter duo ægri HEISTERI (x) sunt referendi.

2) *Periodica*, quæ statis temporibus reverti observatur, ut quæ

(k) Vide §. 47.

(r) Vide §. 22 No 2 & 6.

(l) Vide §. 59 No 1.

& §. 72, I. D. No 2.

(s) Vide §. 42 No 5.

(m) Vide §. 47.

(t) Medic. chir. u. anat. Wahrnehm. 2 Band No 321.

(n) Vide §. 72. I. D. No 8.

(o) Vide §. 35 No 4.

(u) Vide §. 76. e).

(p) Vide §. 65. No 3. b).

(x) l. c. I Band No 298, 301.

(q) Vide §. 72. I. D. No 8.

GOHLII (y) judæo ita exstitit molesta, et quæ singulis mensibus PEZOLDI (z) puellæ, virgini WOLFFII (a), monacho ZACUTI (b), speciatim vero omni plenilunio REIMANNI (c) puero, revertebatur. Alios ex annuis interval-
 lis affligere consuevit, ut OEHMBIUM (d), et septuagenarium LAHMII (e), ac BIERLINGII (f) mulierem, quam trimestri semper detinebat. Per vicenos annos HOFFMANNI (g) Principem Junio quovisprehendit, in 6 semper hebdomadas durans; feminæ vero ejusdem (h) quolibet Octobri reversa menses aliquot affligebat. RIVERII (i) puellam quolibet autumno invadens tota deinde hyeme vexabat; ROMMELII (k) vero puellam quovis vere corripuens non nisi post aliquot semper hebdomadas conquiescebat. Aliquando autem sub his ophthalmiis periodicis febris intermittens latet (l).

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| (y) Vide §. 42 No 2. | (f) Vide §. 65 n. 3.f). |
| (z) Vide §. 22 No 4. | (g) Vide §. 59. n. 2. |
| (a) Vide §. 37 n. 2 a). | (b) Vide §. 42. n. 2. |
| (b) Vide §. 54. | (i) Vide §. 41 n. 2. |
| (c) Vide §. 65 n. 3 f) | (k) Vide §. 4. n. 1. |
| (d) Vide §. 48 n. 4. | (l) Vide §. 43 n. 4. |
| (e) Vide §. 72 L. No 1. h). | |

§. 8.

V. CAUSA denique inspectata, uti plurimi alii morbi, ita ophthalmia quoque duplex est, scilicet

1. *Protopathica*, quæ ab nullo aut prægresso aut præsentente morbo, sed a solo commisso in 6 rebus non naturalibus errore, oboritur, v. g. ab illapsis acribus, immodica lucubratione, potu, &c.

2. *Deuteropathica*, quæ morbo alteri five prægresso (v. g. variolis) tanquam effectus, five præsentente (v. g. cancro, scrophulis, &c.) velut symptoma supervenit, variamque pro diversitate morbi, a quo proficiscitur, curationem exposcit: id quod maximam in praxi therapeutica exigit attentionem.

CAPUT III.

PROEGUMENAE CAUSAE.

§. 9.

1. *ÆTAS*, *sexusve* nihil hic discriminis habent; potior juxta ac sequior *sexus* malo huic est objectus, nec ulla etiam *ætas* quemquam ab eodem vindicat; a cunis ad annos usque decrepitos vagatur

vagatur morbus. RIVERII (*m*) sane infans recens natus erat, et 14 dies habuit SCHMUCKERI (*n*) puella, et J. C. A. THEDENII (*o*) pufio non dum aniculus erat, dum ophthalmia laborarunt; septuagenarii autem fuerunt ægri GENSELII (*p*), HILDANI (*q*), LAHMII (*r*), LIMPRECHTI (*s*), ac RIEDLINI (*t*), hoc ipsum ægritudinis genus perpeffi.

§. 10.

2. GENTILITIA *labes* ad harum caufarum claffem non immerito accenferi poterit; fiquidem puellæ ROMMELII (*u*) cafu id edocemur.

§. 11.

3. IDIOSYNCRASIA quoque interdum fubeffe videtur, quæ ophthalmias

(*m*) Vide §. 72. I. A. No 6.

(*n*) Vide §. 54.

(*o*) Bemerk. u. Erfahr. zur Bereicherung der Wundarz. I Th. 25 Abfchn. p. 172. fq.

(*p*) Vide §. 62 No 2.

(*q*) Vide §. 33.

(*r*) Vide §. 72. II. No 1. h).

(*s*) Vide §. 33.

(*t*) Vide §. 18. et §. 41. No 1.

(*u*) Vide §. 4. No 1.

identidem movet. Unum hanc in rem exemplum V. RIEDELINUS (x) memoriae prodidit, nempe „juvenis quidam „24 annorum, horologioptæus, in pueritia quidem catarrhis sat gravibus obnoxius, ex illo tamen tempore, ex quo pueritiæ annos prætergressus fuit, . . . bene valuit, nisi quod interdum ophthalmia correptus fuerit: in cuius causam cum ipsemet attentius inquisisset, notavit, quod quotiescunque . . . cerevisiam (fuscā dictā) bibat, eadem statim subsequatur; cum ab altera cerevisia non habeat, quod metuat, quin et vinum oculis omnino salvis bibere possit. Inde et hunc potum per bene longum temporis spatium omnino seposuit, oculis interea semper integris usus; at cum nuper in gratiam sodalium non integram mensuram denuo evacuasset, altero die consuetum malum rediit,,

§. 12.

4. LAXITAS *irritabilitasve oculi* iusto major, quam præsertim ophthalmia aut vehementior aut sæpius jam prægres-

(x) Lin. med. ann. 3. Octobr. 25. p. 722.

sa post se relinquere solet. Sic DOBSONI (y) ægra, ubi post contusionem oculi in ophthalmiam incidisset, deinde a solo catarrho eandem denuo contraxit. Quod plurimis quoque aliis evenisse passim deinde videbimus. Neque minus huic malo obnoxii sunt, quibus systema nervosum irritabilius obtigit cum insigni solidorum laxitate, velut succenturio GEACHII (z).

§. 13.

5. CONSENSUS *oculorum* mutuus, quo fit, ut alteruter gravius diutiusve inflammatus haud ita multo post alteri quoque eandem labem communicet, quemadmodum accidit in ægris DELII (a), GOHLII (b), HEISTERI (c), HILDEBRANDII (d), LAYARDI (e), RIDLEY (f),

(y) Vide §. 39.

(z) Vide §. 48 No 2.

(a) Vide §. 72. I. B. No 1.

(b) Vide §. 22. No 6.

(c) Vide §. 49 No 2.

(d) Vide §. 46.

(e) Vide §. 79.

(f) Vide §. 41. No 1.

SAINT-YVESII (g), SAUNDERI (b),
SCHUSTERIQUE (i).

§. 14.

6. CACHEXIAE variæ, in primis vero
a) *Serosa* acris, qualis adfuit in casu
G. W. WEDELI (k), nempe „ pistor 50 cir-
„ citer annorum quoddam velut diluvium
„ patiebatur feri scorbutici acris et falsi
„ in capite. Fluxio seu catarrhus na-
„ sum occupabat, postquam diu hæte-
„ nus odorari non potuerat; unde de-
„ plus mentum in primis superius ex-
„ ulcerabat cum crustis insignibus (men-
„ tagram dixisses aptissime); oculos ve-
„ ro utrosque ophthalmia gravissima cum
„ summa et tantum non flammea rube-
„ dine. Ichorosa materia ex auribus
„ quoque affectabat exitum, et in occi-
„ pite scaturiebat eadem cum fœtore.
„ Applicata ad abarcendum morbum quæ-
„ cunque generosa excogitari poterant,
„ purgantia, antiscorbutica, vesicatoria,
„ collyria, aliaque; sed frustra omnia.
„ Adeo enim invaluerat feri vitium, ut
„ humores vitales oculorum et domestici
„ suppurationem subirent, destruerentur,

(g) Vide §. 22 No 5.

(b) Vide §. 37 No 2. a).

(i) Vide §. 64.

(k) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 2, obs. 183.

„ et conciderent. Unde cum machina
„ oculi utriusque exacta una alteraque
„ hebdomade deturpata viseretur, actum
„ esse de iisdem ediximus, nulla arte
„ reparabili visu „.

b) *Scorbutica*, a qua gravissimam
ophthalmiam et ALISCHERI (l) puella,
et L. HEISTERI (m) centurio est perpes-
sus. Ita et C. F. PAULLINI (n) scribit
„ de vetula decrepita tota scorbutica,
„ multis annis horrenda ophthalmia cru-
„ ciata cum lachrymis fere perpetuis,
„ summo pruritu, et notabili inflamma-
„ tione; aderat simul aliquando sputum
„ verminosum: tandem notati sunt pusil-
„ li acori excreti visum fere efflu-
„ gientes „.

c) *Purulenta*, dum nempe pus
acre ulcerum resorptum et ad oculos de-
latum eos inflammat. L. HEISTERI (o)
Consul ulcus antiquum pedis e gangræna
frigus consecuta ortum passus aliquando
in utriusque oculi incidit ophthalmiam
cum vehementi febre, quæ relicto oculo
dextro sinistrum diutius torfit, qui du-

(l) Vide §. 65 No 4.

(m) Vide §. 35 No 2.

(n) Obs. med. phys. Cent. 4. Obs. 11.

(o) Med. chir. u. anat. Wahrnehm. 2. Band
No. 200.

plo major naturali factus durus admodum evasit cum rubore ac tumore adnatæ, qualis in chemosi obtinet, atque ultra palpebras foras prominebat. Istæ quoque admodum inflammatae usque adeo tuebant, ut oculus aperiri haud potuerit.

d) *Cancrofa*, a resorpta nempe materia cancrofa, quæ haud raro glandulas MEIBOMII petere easque inflammare solet, pessimo semper omine, ut J. L. SCHMUCKERUS (p) pluribus observatis ostendit. Non hujus itaque, sed alterius prosapiæ videtur fuisse ophthalmia, quam V. RIEDLINUS (q) in vidua 65 annorum e cancro mammarum jam moribunda in dextro oculo obortam sola aqua rosarum cum pauxillo vitrioli ocyus profligavit.

e) *Scrophulosa*, ophthalmiarum oppido contumacium feracissima, quali bini FOTHERGILLII (r) pueri, et puella, cujus NOSE (s) meminit, laborarunt. HEISTERO quoque duo ejusmodi ægri obtigerunt curandi, matrona (t) nempe,

(p) Chirurg. Wahrnehm. 2. Th. II Beobacht. p. 174. sqq.

(q) Curar. medicar. millenar. No 555.

(r) Vide §. 48 No 3.

(s) Vide §. 42 No 5.

(t) Vide histor. 8.

et infans 2 $\frac{1}{2}$ annorum (*u*), cui ophthalmia sæpe revertebatur.

f) *Syphilitica*, quæ ubi toto jam corpore diffusa est, oculis quoque labem infert, excitatque chronicas ophthalmias, noctu præsertim graves, sub auroram vero remittentes, quæ interdum dolores osteocopi nocturni sunt comites. Hujus præsapia fuit ophthalmia in viris BREYERI (*x*), GEACHII (*y*), WEIKARDI (*z*), ZACUTIQUE (*a*), et in puella HEINRICI (*b*), pueroque THONERI (*c*). Unquamne etiam externo contagio recta oculis applicato excitari potest? „Chirurgus Monspeliensis de „cumbendo supra pulvinar ptyalismo syphilitici conspurcatum illam contraxit „teste F. SAUVAGES (*d*). Factum sane admodum ambiguum!

(*u*) l. c. No 131.

(*x*) Vide §. 49 No 3.

(*y*) Vide §. 50.

(*z*) Vide §. 49 No 3. et Vermischt. med. Schriften 4 St. 2 Abschn. p. 121. sq.

(*a*) Ibidem.

(*b*) Ibidem.

(*c*) Vide §. 65 No 2. b).

(*d*) Nosol. meth. T. 3. P. 1. Cl. 7. Ord. 2. art. 14. No 11.

CAPUT IV.

PROCATARCTICÆ CAUSÆ.

§. 15.

I. LUCUBRATIO *immodica* haud infrequenter ophthalmiam post se trahit, quam inde et BLOCHII (e) literatus retulit, et C. A. BERGENII (f), „judæus 15
„ annorum, temperamenti cholericus,
„ qui studiis dicatus totam sæpius noctem
„ in perlegendo et scrutando Talmudo
„ consumpserat, hincque vires corporis
„ non leviter debilitaverat, 14 abinde
„ diebus de dolore oculorum querebatur
„ pungente, inque dies adeo ingrave-
„ scente, ut lectum petere cogeretur,
„ neque diurnam lucem nec ignis lumen
„ ferre posset. Quem ego cum invise-
„ rem, atque ex pulsu nullam adesse fe-
„ brim cognoscerem, in capite tamen
„ et fronte siccum deprehenderem æstum,
„ dum interea appetitus satis adhuc vi-
„ gebat, neque alia præsto erant sym-
„ ptomata; exinde levem subesse suspi-

(e) Vide §. 59 No 3.

(f) Commerc. Nor. T. 5. A. 1735. hebd. 26.
No 3, p. 203.

„ cabat inflammationem oculi tunica-
„ rum, præsertim choroideæ vel magis
„ retinæ, quam ex nimia atque studiosa
„ lectione sibi contraxit. Venam idcir-
„ co incidendam svasi . . . quod paren-
„ tes renuebant: proinde sanguisugas
„ temporibus applicandas iussi, pedilu-
„ via ordinavi, datis interne pulveribus
„ temperantibus et propinatis potionibus
„ extemporaneis diapnoicis pro stasi hac
„ inflammatoria resolvenda atque discu-
„ tienda. Sed malum in dies augebatur,
„ pulsus fiebat febrilis, æger continuo
„ æstu fervebat, dolorque lancinans ad
„ aures et nucham usque extendebatur,
„ neque tamen ab eo in oculis remitte-
„ bat. Alius in consilium simul vocatus
„ Medicus morbum hunc feri stagnatio-
„ nem et gravedinem esse judicabat,
„ malumque ex perruptione materiæ se-
„ rose iri sublatum. Quem in finem ef-
„ fectiæ catarrhales præscribebantur,
„ nullo autem levamine secuto; quippe
„ æstus quotidie crescebat, ægerque
„ per 24 horas delirabat: quibus acce-
„ debat paralytis dextrum latus atque lin-
„ guam corripuens, ægrumque exani-
„ mans,,. Anatome non est concessa.

§. 16.

II. *STIMULUS externus* seu chymicus seu mechanicus oculis applicatus, eosque irritans. Sic Baroni GERBEZII (g) tantillum aquæ fortis oculo illapsum ocyus ophthalmiam excitavit, quam KAEMPFI (b) et KALTSCHMIEDII (i) pueris calx viva in oculos injecta perinde causavit. C. F. PAULLINI (k) narrante mulier quædam „e nundinis aliquando domum reversa, infans, tem famelicum subito lactatura juxta parietem in vestibulo ædium suarum confidet, et fessa interim ab itinere parumper obdormire cœpit Pusio in ulnis maternis ita supinus jacens excit forte dextro oculo sterco a columba supra caput ejus in angulo parietis nidulante, a quo gravissima inflammatio, subsequente demum omni visus abolitione „. Cloacarum exhalationes foricariis, teste B. RAMMAZZINO (l) ruborem oculorum dolorifi-

(g) Vide §. 72 I. D. No 8.

(b) Ibidem No 3, b).

(i) Vide §. 35 No. 4.

(k) Obs. med. phys. 122 in Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 5. append. p. 76.

(l) De morbis artificum Cap. 13.

cum cum cœcitat̃is periculo accersere solent. Et quantum acriora collyria importune adhibita mali sæpe accerant, postea (m) videbimus. Idem quoque fumi acres oculis admissi efficiunt: Lapponibus, Finnis, Norwegis SCHEFFERO (n) narrante frequentes sunt lippitudo et ophthalmia, unde non raro cœcitas evenit; in causa est, quod a prima ætate in fumo versari cogantur, quo tuguria illorum æstate et hyeme abundant. Ab ejusmodi fumo gravissimam ophthalmiam in puero observavit J. MUYS (o). Fuci quoque, queis mulieres ornare faciem assolent, si acrioribus consent, ophthalmias teste GENDRON (p) inducunt. HOFFMANNI (q) viro succus acer in oculum illapsus ophthalmiam intulit gravissimam cum visus deperditione. Lux quoque intensior, præsertim a candidis corporibus in oculos reflexa, morbo huic favet, quod J. H. FÜRSTENAUII (r) „ expertus est venator mediæ ætatis, li- „ quorum ardentium abusui deditus, qui

(m) Vide §. 68.

(n) Descript. Lapponiæ Cap. 7.

(o) Vide §. 72. I. D. No 5. b).

(p) Des maladies des Yeux T. 2.

(q) Vide histor. 11.

(r) Act. nat. cur. Vol. 6. Obs. 112.

„ occasione frigoris M. Novembri . . .
„ præmature ingruentis febre acuta epi-
„ demica correptus, et paucorum spatio
„ dierum ad se redire visus, aere sereno
„ et terra nivibus cooperta iter faciens,
„ aciemque oculorum radiis solaribus in
„ adversum sibi nitentibus, intendens,
„ domum hinc redux aurium, mox ocu-
„ lorum dolore et rubore correptus est,
„ quibus neglecto regimine conveniente
„ et debitorum præsidiorum usu mirum
„ quantum adauctis aliorum svasu . . .
„ chirurgi castrensis opem imploravit,
„ qui . . . oculum jam inflammatum tu-
„ midumque scarificationis ibidem insti-
„ tutæ, itemque setacei trajecti, quin et
„ ipsius lapidis infernalis sæpius appositi
„ ope, concessa simul imo imperata diæ-
„ ta rudi et spirituosâ, paucisque ac pla-
„ ne incongruis exhibitis internis reme-
„ diis, id effecit, ut oculus omni sensu
„ successive exutus pugni magnitudinem
„ fere horrido adæquaret intuitu, ipse
„ vero æger febre lenta tabidaque sensim
„ confectus extremis vitæ diebus extir-
„ pationem oculi admitteret, . . . bre-
„ vique post vita functus fuit „. Sic
etiam ophthalmiæ meminerunt a scintilla
oculo infantis illapsa BÜCHNERUS (5),

(5) Vide §. 72. I. A, No 1.

a pulvere pyrio accenso pueri oculos contingente Medici Silesiæ (t), ex ambustione POUPART (u), ab ala mulcæ in oculum involantis eidem adhærescente MORGAGNIUS (x), a paleis frumenti sub trituratione oculos invadentibus GOHLIUS (y), a pilis vulpinis GOERITZ (z), a phalangosi ALIX (a) a ligni ramentis oculo illisis GUERIN (b) et J. KANOLD (c), et FÜRSTENAU (d) „ in futuro, qui poliendis basibus calcei „ ligneis nimium intentus, oculosque „ eisdem propius admovens, ramentis „ ligneis subtilissimis in oculum sinistrum „ illabentibus dolore rubore ardore ejus- „ dem et perpetuo materiæ acris stillicidio correptus variis ex arte suggestis „ præfidiis ophthalmicis internis et externis diligenter usus, sed perpetuum „ materiæ purulentæ profluvium neque

(t) Vide §. 55 No 5.

(u) Vide §. 72. I. D. No 8.

(x) Vide §. 76. e).

(y) Vide §. 72. I. B. No 1.

(z) *Annal. Vrat. Tent.* 30 A. 1724 Octob. Cl. 2. art. 3. §. 3. p. 383.

(a) Vide §. 77.

(b) Vide §. 76. e).

(c) *Annal. Vrat. Tent.* 28. A. 1724, Jun. Cl. 4. art. 14. p. 638. sqq.

(d) l. c. Vol. 8. Obs. 44. p. 152.

„ hæc neque instrumentum acutum pro-
„ vide applicatum aut impedire aut eo
„ dirigere valuerunt, ut oculus illibatus
„ permaneret, et visui sua constaret in-
„ tegritas; quin hoc fere penitus ablato
„ manifesta cicatrix in tunica cornea re-
„ maneret: æger tamen ab omni reliquo
„ incommodo immunis lætus ad sua re-
„ diret negotia. Sed biennio post, cum
„ in aere verno horrido diutius versare-
„ tur, Væ Se et scarificatione, cui utri-
„ que allivetus est, oscitanter neglecta
„ affectum pristinum eadem scena iis-
„ demque symptomatibus in eodem ocu-
„ lo sinistro redire animadvertit, ma-
„ teria acri viscida non sine rubore et
„ dolore prævio ex eodem oculo sinistro
„ ejusque foramine pristino per aliquot
„ septimanas emanante, eademque tra-
„ ctatus ratione oculum integrum, sed
„ eadem cicatrice deformatum, et qui-
„ dem notabiliter imminutum, retinuit,
„ cujus tamen incrementum et justam
„ bulbi magnitudinem temporis succes-
„ su eo certius exspectat, quo major
„ ipsi spes facta est, humorem aqueum,
„ cujus magnam partem perpetuo illo
„ acris lymphæ profluvio perdidit, so-
„ lius ope naturæ sensim reparari, quo
„ collapsi bulbi parietes iterum exten-
„ dantur, oculusque ad pristinam magni-

„tudinem redeat,,/ A mica denique lithanthracum in oculum infiliente ophthalmiam suscitata HENZE (e), et ab excrefcentiis intimam palpebræ superficiem tenentibus, oculumque perpetua frictione irritantibus eandem ad omnia remedia contumacem perstantem MÜZZELL (f), obfervarunt. A fcoriis perinde ferri in oculos illapfis ophthalmias, folo pene magnete curandas, nafci non ignotum eft (g).

§. 17.

III. LÆSIO *externa* gravior bulbi aut vicinorum, ut contufio, vulnus, frictio oculi improba, &c. Sic ab immoderata oculorum prurientium frictione ophthalmiam femel iterumque fibi DECKERI (b) juvenis caufavit. „Infans 3 hebdomadarum . . . nescio, inquit T. BARTHOLINUS (i), an per incuriam humi prolapfus tantam oculorum inflammationem concepit, ut non tantum invifibiles nobis fuerint occlu-

(e) Vide §. 76. e)

(f) Vide §. 7c.

(g) Vide §. 76. c):

(b) Vide hiftor. 1.

(i) Act. med. Hafnienf. Vol. 5. Obf. 19. p. 74.

„ sis palpebris, sed humor crystallinus
 „ ex altero effluxerit instar albuminis
 „ ovorum. Interea suppurati, copia
 „ puris ingenti quotidie effluente. Acta
 „ a Medicis . . . quæ in hujusmodi casu
 „ agi solent. Tandem aqua ophthalmi-
 „ ca ex succo chelidonii majoris aliis-
 „ que impletus quidem finita suppuratio-
 „ ne oculi humore crystallino vacui bul-
 „ bus, sed sine visu „. Perinde J. D.
 G O H L I I (k) „ bajulus . . . ictu dex-
 „ trum oculum graviter læserat, ut ex
 „ oborta inde gravi inflammatione inte-
 „ riores humores conturbati, imo tra-
 „ ctus vasculi sanguiferi per transversum
 „ humoris crystallini apparerent, et sic
 „ una cum abolitis doloribus et visiva
 „ facultas defecerit „. Ita etiam F. H O F F-
 M A N N I (l) „ juvenis sanguineus in
 „ palæstra gladiatoria æstuans acceperat
 „ forte inter pugillandum ictum cum gla-
 „ dio palæstrico (quem vocant ein Rap-
 „ pier) in oculum finistrum, subsequen-
 „ te mox rubore ac dolore. Ille tamen
 „ pensi hæc habens vesperi largiter in-
 „ gurgita.

(k) Act. med. Berol. dec. 1. Vol. 5. sect. 2.
No. 7. p. 21.

(l) Med. rat. syst. T. 4. P. 1. S. 2. C. 11.
Obs. 1.

„ gurgitavit vinum, rixas quoque acres
„ cum sodalibus movit. Inde die post
„ magnus tumor oculum ejusque vicinas
„ partes occupavit cum dolore pulsato-
„ rio, cephalalgia, præcordiorum anxie-
„ tate ac pulsu celeri. Chirurgus advo-
„ catus non adeo magni momenti esse
„ putans applicuit collyrium frigidum,
„ quo symptomata adeo exacerbata, ut
„ somnum abigerent omnem. Hinc Me-
„ dicus in consilium vocatus, qui san-
„ guinem mittere, et pedibus bursam
„ pastoris admove-re jussit; sed in cassum.
„ Inflammatio potius abiit in suppura-
„ tionem, et 5^o ab inflicto ictu die in-
„ gens puris quantitas ex oculo fluxit,
„ quam ipsi humores secuti, et sic ocu-
„ lus cum omni visu periit. Quin post-
„ ea summa cura enitendum fuit, ne
„ hæc inflammatio et exulceratio in spha-
„ celum degeneraret; quod etiam a Me-
„ dico applicatione $\sqrt{\text{V}}$ camphorati cum
„ essentia croci, et data interius TR^a
„ bezoardica præstitum est,,. J. A. G O E-
R I T Z I O (*m*) oblatus est curandus homo,
qui postrema bachanalium nocte ebrius
cum sedili inverso ludens partem e for-

(*m*) Annal. Vratisl. Tent. 27. A. 1724, Martij
Cl. 2. art. 3. §. 4. p. 270.

nacis corona decussit, quæ oculum ejusdem magnopere contudit, doloremque causavit; lusu tamen in mediam noctem producto, lucisque admissu et crebriore oculi frictione dolor crevit, ac somnum arcuit. Postero die ruberrimus fuit oculus, et e pupillæ regione pustula aderat. Vocatus auctor insignem oculus e mediana sanguinis copiam eduxit, oculoque emulsionem camphoratum cum aquis ophthalmicis demulcentibus adhibuit, interne vero bis quotidie præbuit pulverem cephal. A. cum nitr. depur. mixt. vetito simul vino ac cerevisia, imperataque obscuro in conclavi quiete. Atque sic intra 14 dies ophthalmia decessit, superstitite pustula dicta. Eadem ratione HETTERI (n) adolescenti lapidis fragmentum, alteri(o) vero flagellum, ac virgini vestali (p) lignum oculo impactum ophthalmiam excitavit, quam DOBSONI (q) quoque ægra oculo januæ alliso, HOMINI (r) vero miles a contusione gladio palæstrico facta, et KANOLDI (s) sar-

(n) Vide §. 72. II. No 1. e).

(o) Vide histor. 6.

(p) Vide histor. 9.

(q) Vide §. 39.

(r) ROUX Journ. de Medéc. &c. T. 38. Juill. A. 1772. p 30.

(s) Vide §. 16.

tor e segmine ligni in oculum ruente, contraxit. Eadem quoque vulnerum est ratio, variarumque operationum chirurgicarum in oculis susceptarum. Sic „ci- „ vi Hafnienſi, referente T. BARTHOLINO (t), ſiniſter oculus poſt ablata „ chalazii dextræ palpebræ inflammatus; „ in tantum vero crevit ophthalmia, ut „ de viſu periclitaretur. Magno moli- „ mine tentata omnia, Væ So, pilulæ „ cephalicæ, cucurbitulæ, collyria, ve- „ ſicatoria, fontanella in nucha; quibus „ tandem ſedata inflammatio, et junctus „ tumor ſubſedit, viſusque poſtliminio „ rediit; ſed in cornea relictum eſt tu- „ berculum album, iridem inferiore par- „ te obvelans, et cryſtallinum humorem „ ibidem obſcurans, ſed ſine manifeſto „ viſus nocumento „. Perinde poſt de- „ preſſam, ac multo magis poſt extractam, cataractam haud raro ophthalmiæ obori- ri ſolent, ut feminæ L. HEISTERI (u) evenit, quas præ primis ægri ejusmodi commiſſo graviore quodam in regimine errore ſibi accerſunt, veluti duobus JANINI (x) ægris accidit.

(t) Hiſtor. anat. rar. Cent. 6. hiſt. 5.

(u) l. c. 1 Band No 676.

(x) Vide §. 55, B. No 8. §. 83.

§. 18.

IV. INGESTA vel acria vel idiosyncrasiae (y) adversa, vel spirituosâ humores rarefacientia, vel cacochymiam cachexiamque inducentia, haud raro ophthalmiis occasionem præbent. Sic „per-
 „fica in lippitudinem fecunda prodit
 „curiose doctus J. HEURNIUS (z), quod
 „in memet ipso, inquit J. RHODIUS (a),
 „apud Germanos expertus ob humi-
 „ditatem et acrimoniam fortassis eo
 „loci majorem; in Italia enim tale ni-
 „hil sum passus, tametsi iis plusculum
 „indulserim,,. Nihil vero ex ingestis
 ophthalmias crebrius faciliusque movet,
 quam potus spirituosâ sanguinem exagitan-
 tes. Ita GRIGNON (b) curandum na-
 ctus est puerum 7 vel 8 annorum, sa-
 nis genitum parentibus, et a sana nutri-
 ce lactatum, qui ipse semper ante sanis-
 simus, variolas non dum passus, ex ali-
 quo tempore habituali ophthalmia ad om-
 nia remedia contumaci laborabat. Pal-

(y) Vide §. 11.

(z) De morbis oculor. Cap. 3.

(a) Observ. medic. Cent. 1. Obs. 80.

(b) ROUX Journ. de Medec. T. 26. A. 1767
 Mars. p. 236.

pebræ quovis mane conglutinatæ reperi-
bantur, limbique earum rubri erant ac
tuberculosi, bulbos inflammatio tenuit
citra insignem dolorem, queis parvæ
cœperant innasci maculæ, quas tamen
pupilla dirimebat. Visus erat debilis.
Causa morbi fuit, quod puer usque adeo
allivefactus fuerit potui Caffée, vini, ac
liquorum stillatitiorum spirituosorum, ut
et alimenta prius capere, quam liquo-
rem spirituosum de more haussisset, recu-
saret, et sub prandio levem contraheret
crapulam. Interdictis autem deinceps
hiscæ potibus, solaque aqua potui con-
cessa, brevi omnis disparuit ophthalmia
citra recidivam. Perinde V. RIEDLI-
NI (c) „ vir quidam fere septuagenarius,
„ facetus quidem, at vini nimio potui,
„ vel quia rem nimium amat, minime
„ deditus, . . . jam per aliquot annos
„ notat, quod si, ut vires reficiat, di-
„ midiam solum vini mensuram bibat,
„ oculi inde nil prorsus damni patiantur;
„ quando vero vel quartam mensuræ
„ partem, aut ut sodalibus placeat, aut
„ et gula sic jubente, huic addiderit,
„ semper sequenti mane ophthalmia cor-

(c) Lin. med. ann. 4. Junii 28. p. 529.

„ripiatur, quod nuper . . . ipsemet
„retulit, et sancte testatus est, se quan-
„do a vino aut prorsus abstineat, aut eo-
„dem modice utatur, ab ophthalmia
„prorsus immunem vivere „. Eodem
quoque malo FORESTI (d) juvenis post
vini acriumque ciborum usum correptus
est; idemque a vino et nocturno hyemis
frigore accidit viro I. DIEMERBROE-
CKII (e). Neque hic prætereundum
est pravum nutricum acri cachexia labo-
rantium lac, a quo alumni illarum varias
ægritudines adipiscuntur. L. HEISTE-
RO (f) curandus obtigit nobilis juvenis
20 annos natus, qui ab nutrice ulcera
femorum scabiemque passa lactatus jam
inde a teneris ophthalmiæ crebrisque
tonfillarum tumoribus ac scabiei fuit ob-
noxius; quæ mala cum nullis remediis
radicitus præcaveri tollique possent, ac
paullo ante rursus cum ophthalmia vehe-
mens tum insignis quoque tonfillarum
tumor eum invasissent, prior Væ Se pe-
dis et cathartico depulsa est, tumor ve-
ro superstes sequentibus est oppugnatus:

(d) Vide histor. 3.

(e) Medic. hist. 17. Opp. med. pract. p. m.
827.

(f) l. c. 2. Band No 211.

℞. Extr. fumariae
—— lign. fallacr.

℥ ii dulc. aa ʒj

Sulphur ☉ ʒ ii ʒ ij

Efs. iuccini q. f. F. pil. No 40
deaur. Sumat m. et v. No j.

℞. Spec. pro decoct. lign. c. herb.
sapouar. M. ij. Harum cochlear j coquat
in aquæ ʒbj, et m. ac v. hora 5^a inde
bibat.

℞. TRæ ʒ ii tartaris. ʒj.

Sumat quovis vespere gtt. 50 cum potu
priori.

℞. Rad. tormentill.

—— bistortæ aa ʒss

Flor. sambuc.

—— malvæ aa M. j. coq. in

▽æ simpl. q. f. Colat. ʒbj add.

Mell. rosat. ʒj. M. D. pro gar-
garismo 3^a quaque hora usurpando. Ab
his remediis sanguine depurato juvenis
prorsus convaluit.

§. 19.

V. COLLUVIES *humorum pravorum*
aut *vermium* primis in viis perinde oph-
thalmias interdum excludit. „ Putabatur,
„ inquit LUCILLUS PHILALTHÆUS

„ apud J. SCHENCKIUM (g), mulier
 „ laborare ophthalmia vera, et immine-
 „ re etiam suffusionem; cum tamen ve-
 „ re et per se hi morbi non essent; sed
 „ e vermium ascensu ad os ventriculi
 „ atque jecur tollerentur vapores ad
 „ caput, et facerent videri oculum al-
 „ terem inflammatione rubere, atque
 „ suffusionem imminere „ Quod vero
 ad pravam humorum primas vias inun-
 dantium colluviem attinet, ejus investi-
 gandæ memoria nunquam est deponen-
 da; quandoquidem fordibus „ his solis
 „ vehementes oculi inflammationes ali-
 „ quando deberi iterum iterumque ob-
 „ servavit „ A. G. RICHTERUS (h):
 et cum eas complures causæ producere
 queant, facillime fere ex animi pathe-
 matibus colliguntur (i).

§. 20.

VI. SPASMI *hysterici*, *hypochondriaci*;
 qui enim alterutro hoc malo laborant,
 iis aliquando, teste J. G. BRENDelio (k)

(g) Observ. medic. Lib. I. p. m. 154.

(h) Observ. chirurg. Fascic. I. Cap. II. p. 104.

(i) Ibidem p. 105.

(k) Opusc. math. et med. argum. P. 3. Diss. 16
 (de valetud. ex hypochondriis) §. 6. p.
 52.

„ diuturna epiphora sive palpebrarum
 „ cum immodica illacrimatione rebellis
 „ lentaque inflammatio, quæ de nocte
 „ invalescit, permolesta est „. Novit
 quoque R. WHYTT (l) feminam sensibili-
 ores oculos noctam, cui nunquam aut
 nausea aut molestior stomachi dolor acci-
 dit, quin caput simul afficeretur, et vel
 palpebræ vel oculi aliquatenus inflamma-
 rentur. Atque hujus etiam loci est ma-
 trona, cujus in mea amauroseos historia (ll)
 commemini, quæ ex hypercatharsi in
 insignem incidit ophthalmiam, haud ali-
 unde utique, quam quod cathartico spa-
 smi abdominis moti uberiores sanguinis
 copiam versus superiora compulerint.

§. 21.

VII. MORBI *capitis, narium, dentium*,
 haud raro ob vicinitatem organorum oph-
 thalmiam sibi adsciscunt, vel in eandem
 migrant. Sic a diuturna cephalæa GON-
 LII (m) vidua, HEISTERIQUE (n) vir, et

(l) Beobacht. über die hypochondr. u. hyster.
 Zufälle I Cap. No 11. i.), p. m. 201. sq.

(ll) §. 39 c) p. 225.

(m) Vide §. 42 No 2.

(n) Vide §. 55. No 1.

ab hemicrania homo SCHUSTERI (o), ophthalmiam sunt consecuti. S. YVESII (p) huc ophthalmia catarrhalis est referenda: „tertium (inquit ille) ophthalmiæ genus est, quod acrem in oculo pruritum excitat cum humoris craffi ac sabulosi, oculos noctu subinde glutinantis, excretionem; ægritudo hæc est sæpenumero sequela catarrhi e cerebro, estque omnium curatu facillima. Coryzæ certe frequenti obnoxius ante fuit, quam ophthalmia laborasset, HOFFMANNI (q) juvenis, et DOBSONI (r) quoque ægræ a catarrho revocata fuisse videtur ophthalmia. Multo autem frequentius morbis dentium junctam videre est ophthalmiam. J. G. PIETSCH (s) rebellis meminit ophthalmiæ a tribus cariosis dentibus ortum trahentis, quæ evulsis demum his dentibus cariosis conquievit. Nempe puer ad 12 annos natus ophthalmiam ultra 8 menses utriusque oculi perpeffus est, oculo dextro præ lævo gravius affecto. Cum

(o) Vide §. 64.

(p) l. c. art. 3. p. m. 176.

(q) Vide §. 59. No 2.

(r) Vide §. 37.

(s) ROUX l. c. T. 36. Decembre 1771 p. 535.

que nulla procatarctica morbi causa sci-
fcitando detegi pollet, ore inspecto re-
perit Auctor postremum inferioris ma-
xillæ molarem finistrum ad radicem usque
cariosum, ejusque in medio fungosam
excrefcentiam figura et magnitudine me-
diocris cerasi. In superiore quoque ma-
xilla dextri duo postremi molares fuere
cariosi. Evulso igitur sinistro primum
dente carioso, imperatisque idoneis ad
ophthalmiam remediis, intra biduum tu-
mor ruborque oculi lævi magnopere de-
crevit: idcirco reliquis etiam duobus ca-
riosis dentibus ocyus eductis puer intra
8 dies sine ullo adhibito e præscriptis re-
medio prorsus convaluit. FORESTI (t)
quoque cognata ex præpostera odontal-
giæ medicatione in gravissimam incidit
ophthalmiam. Et quoties non difficili
dentitioni se se associat ophthalmia? Docu-
mento hic sunt BOENNEKENII (u) puellus
puellaque RIEDLINI (x), ac simili pla-
ne modo A. WESTPHALII (y) „ infans
„ 7 circiter mensium communi alias et
„ ut plurimum usitato more admodum

(t) Vide histor. 4.

(u) Vide §. 37 No 2. a).

(x) Ibidem.

(y) Act. nat. cur. Vol. 8. Obs. 66.

„ difficili dentium sic dictorum canino-
„ rum in maxilla superiore perruptione
„ laborabat. Complures jam jam noctes
„ diesque plane insomnes transegerat,
„ doloresque adhuc magis augebantur,
„ accedente utriusque oculi inflammatio-
„ ne. Varia a parentibus jam jam adhi-
„ bita erant remedia ad promovendam
„ hujus inflammationis discussionem,
„ dentiumque simul adjuvandam perru-
„ ptionem; quæ etiam in tantum profe-
„ cerant, ut dens caninus finistri lateris
„ a vehementia sua notabiliter remise-
„ rit; ast dexter caninus dens his
„ non obstantibus quasi immobilis in-
„ tra gingivas hærens nullo modo ulte-
„ rius promoveri poterat: indeque eve-
„ niebat, ut inflammatio totius oculi
„ dextri non solum valde augetetur, sed
„ etiam bulbus ipse ex orbita usque adeo
„ prominere, ut quasi exinde propul-
„ sus videretur, concurrente simul co-
„ piofa feri lacrymalis profusione, et
„ atrocissimis indefinenter continuantibus
„ doloribus. Sub his itaque circum-
„ stantiis cum meum quoque parentes
„ implorarent auxilium, locum illum
„ gingivarum, sub quo dens perruptu-
„ rus adhuc latitabat, lanceola leniter
„ incidebam, hocque facto 3^o die non
„ solum dens iste absque ulteriori diffi-

„cultate prodibat, sed omnia illa mo-
„do commemorata symptomata in totum
„quoque evanescebant,,.

§. 22.

VIII. METASTASES *fani vel morbofi*
ingentem ophthalmiarum numerum sup-
peditant, pro varietate nempe materiæ
multiplicis metastatice ad oculos tra-
jicientis, ut est

I. *Perspiratio*, sudorve cohibitus
aut imminutus, tempestate in primis ven-
tosa vel ex humido frigida, aut simili
cujuspiam loci in atmosphæra. „Recor-
„dor ait J. LANZONUS (a)... merca-
„toris, qui a suppresso sudore in oph-
„thalmiam contumacem incidit, et ab
„hac tandem in cœcitatem sine ulla
„spe visionem recuperandi,,. Sic mu-
lier BLOCHII (b) quavis nocte juxta
humidum parietem somnum capiens oph-
thalmiam contraxit ad omnia rebellem,
donec a pariete hoc remotior cubare
cœpisset. Ita etiam mater cum prole

(a) Misc. nat. cur. Cent. I. Obs. 65:

(b) Vide §. 82.,

apud Vratislavienses (*b*) a turbine venti idem mali genus nata est. HOFFMANNI (*c*) quoque militi nocte pluvia ac ventosa excubanti ophthalmia accidit, quam Princeps quoque ejusdem (*d*), quod nudipes mane obambulando perspirationem artuum inferiorum cohiberet, uti et vir alius (*e*) capite ventis perfrigerato, sibi accivere. Denique ophthalmiam a perfrigeratione et DECKERI (*f*) juvenis expertus est, et ESCHENBACHII (*g*) matrona. Hinc vero intelligere est, cur tempestates anni frigidae ac pluviae aut ventosae simul ophthalmias invehant epidemicas. Etenim observante HIPPOCRATE (*b*) „ siquidem hyemis „ plus æquo sicca et aquilonia fuerit, „ ver autem valde pluvium et austrinum, „ febres acutas et lippitudines et intestinorum difficultates ad æstatem oriri „ necesse est, præcipue vero in mulieribus et viris natura humidioribus. At

(*b*) Vide §. 34 No 1. b).

(*c*) Vide histor. 10.

(*d*) Vide §. 59 No 2.

(*e*) Ibidem.

(*f*) Vide histor. 1.

(*g*) Vide §. 37 No 5.

(*b*) Sect. 3. aphor. 11. 12. 13. 14. et de aere locis et aquis p. m. 287. sq.

„ si hyems austrina et valde pluvia et
 „ placida fuerit , ver autem plus iusto
 „ siccum et aquilonium. . . . difficulta-
 „ tes intestinorum et lippitudines aridæ
 „ oriuntur . . . Si vero æstas plus æquo
 „ sicca et aquilonia, autumnus vero . . .
 „ aquilonius fit et sine pluviis, iis qui-
 „ dem , qui natura sunt humidiores et
 „ mulieribus commodus , reliquis autem
 „ lippitudines erunt siccæ , et febres
 „ acutæ diuturnæ, non nullis vero etiam
 „ melancholiæ ,. Ceteris autem paribus
 lippitudines cōs ad magnas anni sicci-
 tates refert (i), atque ideo illas pro
 morbo æstatis agnoscit (k), quales in
 statu secundo Thasi (l) describit „ pri-
 „ mum itaque (inquiens) lippitudines
 „ fluentes cum dolore , humentes et
 „ crudæ abortæ sunt , sordes in oculis
 „ concretæ (quas lemiæ vocant) parvæ
 „ nec sine difficultate multis erumpe-
 „ bant; quæ cum plurimis revertissent ,
 „ tandem ad autumnum reliquerunt ,.
 Hæc vero HIPPOCRATIS observata
 pulchre cum posteriorum quoque tempo-
 rum observatis congruunt. „ Ophthal-

(i) Ibidem aphor. 16.

(k) Ibidem aphor. 21.

(l) Epidem. L. 1. S. 2. statu 2. §. 2. p. m.
 943.

„ mia . . . epidemica , inquit F. HOFF-
 „ MANNUS (n), enascitur certis anni
 „ temporibus a diuturna humida et fri-
 „ gida aeris constitutione , post quam
 „ ophthalmicum morbum plures invadere
 „ sæpius observavi „ Ita „ vigen-
 „ te divite autumno satis temperato
 „ 1560 magna pars populi ophthalmia...
 „ oppressa fuit, pro qua curanda raro
 „ medici accersebantur, etiamsi difficilis
 „ esset; ita enim hominibus communis
 „ jam et familiaris morbus evaserat . . .
 „ Perduravit autem lues hæc unum vel
 „ alterum mensem „ narrante AMA-
 „ TO (o). Porro quinquennio inde post,
 „ observante P. FORESTO (p), seu „ A.
 „ 1565 tribus integris mensibus nempe
 „ Octobri Novembri et Decembri, cum
 „ constitutio austrina permansisset, mul-
 „ tæ inflammationes oculorum cum ru-
 „ bedine et ophthalmiæ non veræ po-
 „ pulariter grassatæ sunt, et palpebrarum
 „ pruritus, adeo ut integras familias in-
 „ star morborum epidemiorum occupa-
 „ rent; quibusdam vero et acres cum
 „ lachrymis urentibus et dolore : et plu-
 „ rimis hæ affectiones diuturnæ admo-
 „ dum

(n) l. c. thes. pathol. §. 4.

(o) Curat. medic. Cent. 7. cur. 80.

(p) l. c. Obs. 4.

„ dum erant „. Perinde frequens erat ophthalmia Vratislaviæ mense Septembri 1699, quem duo alii præcellerant pluvii ac frigidi(*q*). Ibidem etiam teste C. PEZOLD(*r*) 1713 et sequente ob creberrimas pluvias ac ventos grassabantur. Ejusmodi quoque ophthalmiam Eperjesini hyeme A. 1720 epidemice grassantem J. A. REIMANNUS(*s*) observavit; fuit autem taraxis, ruri præsertim degentes mensibus Februario ac Martio sine discrimine ætatis, sexus, temperamenti, ac vitæ invadens adeo, ut eandem incolentes domum aut omnes aut plerisque certe velut contagione pervagata sit, solis lactentibus infantibus, qui in liberum aerem haud efferebantur, intactis relictis. Pruriebant primum oculi, dein æstum, ruborem, exiguumque tumorem concipiebant, plerumque citra epiphoram, vixque aliquibus notabilis palpebrarum conglutinatio accidit. Unde plurimi quoque sine Medici ope, vitato solummodo aere ac intensiori luce, cujus oculi erant im-

(*q*) Histor. morbor. Vratisl. p. m. 60.

(*r*) Obs. med. chir. select. 80. p. 166.

(*s*) Annal. Vratisl. Tentam. II, A, 1720. Mart. cl. 2. art. 3. y. 4. p. 298.

patientes, intra 14 dies aut citius seriusve convalescebant. Ita etiam Varšaviæ A. 1720 mense præ primis Julio ophthalmiæ, referente C. H. ERNDTELIO (t), fuerunt admodum populares, ac non nullis in ægris in cataractas degenerantes, velut regio satelliti (u) accidit. Plures id genus epidemias ophthalmicas videre est in J. HUXHAMO (v), VALENTINO (x), atque in Annalium Vratislaviensi in

Tentam. 25 A. 1723 Julii cl. 2. art. 3. §. 1.

p. 33.

———— 26 A. 1723 Oct. cl. 2. art. 2.

p. 370.

———— ————— Dec. cl. 2. art. 3. §. 5.

p. 617.

———— 29. A. 1724. Jul. cl. 2. art. 3. §. 4.

p. 40.

———— ————— Aug. cl. 2. art. 3. §. 1.

p. 149.

———— 35. A. 1726. Jan. cl. 2. art. 1. §. 2.

p. 39.

———— ————— art. 3. §. 1.

p. 46.

———— ————— Mart. cl. 2. art. 3. §. 2.

p. 300.

(z) Ibidem Tent. 14 A. 1720 Novemb. cl. 2 art. 2. §. 6. p. 518.

(u) Vide §. 34. No 1. a).

(v) Opp. medic. Tom. 1. p. 202. 207. 214. 216. sq.

(x) Mife. nat. cur. dec. 2. ann. 3. obs. 85.

2. *Sanguis* sponte arteve stasis vicibus vacuari solitus, nunc retentus: hinc consuetæ Væ Ses aut scarificationes neglectæ, et hæmorrhagiæ solennes aliarum vel hæmorrhoidum, &c. non succedentes. Ita W. GABELCHOVERI (y) Pastor a neglecta brachiorum ope cucurbitularum scarificatione consuetæ ophthalmiam est perpeßus. Ejusdem (z) puella 20 annis major ob menses nunquam adhuc fluentes incidit demum in lippitudinem cum dolore circa præcordia. Alterius quoque puellæ 19 annorum J. D. GOHLIUS (a) meminit, quæ partim e variolis partim e catameniis suppressis chronicam patiebatur ophthalmiam cum pannis inde enatis. Perinde a mensium suppressione lippitudinem nactæ sunt puellæ JANINI (b), LENTILII-que (c), ac WOLFFII (d), tum HOFFMANNI (e) femina, BOEHMERI (f)

(y) Curat. et obs. med. Cent. 4. cur. 38.

(z) Ibidem Cent. 3. cur. 61.

(a) l. c. dec. 1 vol. 5. sect. 2. No 44. p. 61.

(b) Vide §. 37 No 2. a).

(c) Vide §. 72. l. A. No 3.

(d) Vide §. 37. No 2. a).

(e) Vide §. 42 No 2

(f) Vide §. 37 No 2. a).

uxor saponarii, et SAUNDERI (g) ægra. Ad harum censum procul dubio referenda est puella decennis (ut ut infra menstruantium ætatem) S. PAULI (b), cui ab aliquot annis circa plenilunia superius labium intumescebat, hujusque e fissura mox insecuta velut ex incisa arteria sanguis profiliebat. Ex cohibita autem olim hac hæmorrhagia enascebatur ophthalmia periodica. Idem quoque mali genus suppressæ hæmorrhoides post se trahere sunt visæ. F. HOFFMANNI (i)

„ Princeps annum agens quinquagesimum,
„ sanguineo-cholericæ constitutionis, na-
„ turæ alias bene valentis et robustæ,
„ immoderatori vini potui et cerevisiæ va-
„ lde saturatæ ac spirituosiori per omnem
„ vitam assuetus, multis jam annis circa
„ æquinoctia fluxum cum euphoria hæ-
„ morrhoidalem expertus est. Evenit
„ aliquando, ut per frigoris vehemen-
„ tiam subito hic fluxus substiterit. Se-
„ quebantur mox cum ventris dorsique
„ doloribus et hemicrania et cardialgiæ,
„ quibus acris ad oculos fluxio superve-
„ niebat. Per V^x Sem in pede remitte-

(g) Ibidem.

(b) Hist. morbor. Vratisl. A. 1701. p. m. 249.

(i) l. c. T. 4. P. 4. Cap. 5. Obs. 4.

„ bant quidem hæc mala ; sed remansit
„ dolorifica cum rubore in oculis fluxio,
„ cum Serenissimus pocula in seram uf-
„ que noctem protrahere, et mane sub
„ tempestate aeris humida et frigida ve-
„ nationibus indulgere, quam immutato
„ vitæ regimine consveto oculos a fri-
„ gore defendere, mallet. Hinc . . .
„ factum est, ut malo subinde aucto o-
„ culi naturalem suam constitutionem,
„ colorem, figuram, magnitudinemque
„ et claritatem in dies magis magisque
„ amiserint, insequente postea plenaria
„ visus privatione; cui removendæ a ce-
„ leberrimis undique medicis et artifi-
„ bus remedia, sed frustra, hætenus
„ sunt requisita „. Perinde spontaneæ
narium hæmorrhagiæ aut præpostere co-
hibitæ aut suapte natura subsistentes lip-
pitudinem ex facili accersunt. Sic Vra-
tislaviæ (k) mense Januario A. 1699
„ erant, qui ophthalmia vexarentur.
„ Non tantum oculos urgebat inflamma-
„ tio cum dolore, tensione acriore et
„ rubedine, . . . sed et dolor capitis
„ gravativus molestus erat, iis potissi-
„ mum, in quibus oculus circa nervum
„ opticum patiebatur. Quotquot openi

(k) Histor. morbor. Vratislav. p. m. 13. sq.

„ D. HELWICHII implorarunt, interro-
„ gati, an hæmorrhagiam narium in præ-
„ terlapsis annis crebro experti fuissent,
„ fere omnes se quondam ei allvetos fuisse
„ affirmarunt „. G. E. STAHLIUS (1)
meminit sexennis puellæ, quæ ex cre-
bris a 4^o fere ætatis anno in faciem lapsi-
bus hæmorrhagiæ narium ita evasit obno-
xia, ut postmodo e leviori etiam capitis
manu percussione eandem magnopere pa-
teretur. Quæ ubi, ne in habitum abi-
ret, fuisset cohibita, puella cœpit in-
terdum vehementes capitis dolores per-
peti cum gravi oculorum pressione, ardore,
imo lancinationibus, tandemque in-
flammatione, rubore, insignique oculo-
rum calore.

3. *Lotii contenta.* Perquam rarum
hanc in rem exemplum habet V. RIED-
LINUS (m): „ feminā quædam in ju-
„ ventutis adhuc annis constituta, ele-
„ gantis formæ, et cetera morbonæ in-
„ sultibus rarius exposita, per aliquot
„ tamen annos urinam tam foetentem ex-
„ crevit, ut matula non protinus remota
„ in cubiculo ipsamet vix subsistere po-
„ tuerit: quod malum in principio qui-

(1) Colleg. casual. magn. casu 40 p. 415.

(m) Lin. med. ann. 4. Martii 5. p. 186.

„ dem neglexit prorsus; at cum postea
„ et aliis molestus fieret tantus fœtor,
„ et quibus magis curæ cordique erat
„ ejusdem sanitas, metuerent, ne mali
„ quid portenderet, ego propterea in
„ in consilium vocatus fui. Ubi licet
„ variis contra hunc fœtorem pugnave-
„ rim medicamentis, et semper ea quo-
„ que, quæ alias svaveolentem reddunt
„ urinam, addiderim, oleum tamen et
„ operam perdidici: unde præterquam
„ quod . . . lapidum canceri usum com-
„ mendavi, a reliquis medicamentis fe-
„ riari eandem jussi. Quod factò post
„ aliquot menses omnem fœtorem non
„ consuetum amisit; at successit . . .
„ ophthalmia . . . non solum dolore
„ molesta, verum et visum impediens,,.

4. *Exanthema* chronicum vel acu-
tum retroversum. Sic J. LANZONI (n)
„ lapidida . . . annorum ætatis 47, bi-
„ liosæ temperiei, pertinaci impetigine
„ laborabat, ob cujus curationem multa
„ adhibuit remedia, inter quæ ∇^a calcis
„ vivæ applicata fuit ex consilio cujus-
„ dam circumforanei; et paulo post in
„ ophthalmiam ingentem amborum ocu-

(n) Act. nat. cur. Vol. 1. obs. 67.

„ lorum incidit cum suffusione : et ita
 „ brevi cæcus factus est „. Perinde a
 repressa crusta lactea LENTILII (o)
 mulieri, a scabie depulsa RIEDLINI (p)
 viduæ, et A. COMPARETTII (q) mu-
 lieri, ab exanthemate simili retropulso
 RIBEI (r) juveni ophthalmia accidit. Ita
 etiam C. PEZOLDI (s) „ puella . . .
 „ post male curatum ulcerosum caput
 „ medicamento quodam topico in oph-
 „ thalmiam incidit, quæ postea semper
 „ singulis mensibus menstrua antevergens
 „ his prodeuntibus iterum recedebat.
 „ Menstruo fluxu vero emanente phthi-
 „ sica anno ætatis 19^o obibat. Pariter
 „ sutoris filia 10 annorum ophthalmiam
 „ incurrebat, postquam mater ulcera ca-
 „ pitis externo remedio inconsulte ag-
 „ gressa fuisset, quibus per diaphoreti-
 „ ca et balnea revocatis ophthalmia ite-
 „ rum cessabat „. F. HOFFMANNUS (t)
 „ vidit . . . suppurationem excidente

(o) Vide §. 67. No. 3 b).

(p) Vide §. 41. No. 1.

(q) Occursus medici de vaga ægrit. infirmit.
 nervor. §. 4. p. 187.

(r) Vide §. 55 No. 8.

(s) l. c. obs. 22.

(t) l. c. T. 4. P. 1. S. 2. C. 11. thes. pathol.
 §. 2.

„ lente cryſtallina . . . a tinea capitis
 „ inveterata ſubito externis ſiccata „
 Et alibi (u) „ obſervavi (ait) hunc affe-
 „ ctum ex retropulſis in facie puſtulis
 „ per medicamentum externum adſtrin-
 „ gens ; a tinea capitis reperiſſa ex-
 „ terno remedio olim in milite conſpe-
 „ xi intenſiſſimam oculi inflammatio-
 „ nem cum ſuppuratione et ſubſequenti
 „ cœcitate „ . Verum frequentiſſime
 omnium hic morbus a varioloſa materia
 in corpore ſuperſtite ortum capit ; ut ut
 non nulli, quos inter et ODHELIUS et
 ROWLEY (x) eſt, varioloſas has ophthal-
 mias non tam a metaſtaſi quam potius im-
 pedito acrium lacrymarum effluxu, dum
 nempe a tumentibus palpebris oculi ſub
 decurſu varioloſi morbi aliquamdiu clauſi
 manent, negligiturque iterata palpebra-
 rum diductio facienda pro acrium la-
 crymarum effluxu inde conciliando, re-
 petant, ab acribus ita lacrymis ibi ſta-
 gnantibus oculos inflammari aſſerentes.
 Verum lacrymæ , recte notante c. G.

(u) Schol. ad P. POTER. inſign. curat. Cent.
 2. Cap. 22.

(x) Atheaſiſe on the princip. diſeaſes of theſe
 Eyes.

LUDWIGIO (*y*), clausis etiam oculis lacrymalem in saccum resorbentur, neque unquam illo tempore variolosos ophthalmia, nisi acribus remediis (ut fieri a plebe solet) oculi vexati fuerint, sed aliquo primum post superatas jam varicellas tempore elapso (v. g. post 2. 3. hebdomadas) aggredi observatur; quod non aliunde utique, quam a reliquiis morbi ad oculos depositis repetendum esse ipse etiam A. G. RICHTERUS (*z*) tuetur, observans has ophthalmias malignarum in primis variolarum esse progeniem, queis nec debita purgatio 4^o in stadio, nec perspiratio promota, vires fregit, maturiorque carni esus concessus est; id quod etiam confirmant observata in HILDANI (*a*) ægra, BAEUMLEINII (*b*) muliere, juvene HEISTERI (*c*), puellisque BIERLINGII (*d*), BOETTICHERI (*e*), GULBRANDI (*f*), et HORSTII (*g*), et J. D. METZGERI (*h*).

(*y*) Adversar. med. pract. Vol. 1. P. 4. p. 473. sqq.

(*z*) Commentar. nov. Gotting. T. 4.

(*a*) Vide §. 65. No 2. d).

(*b*) Vide §. 34. No 1. a).

(*c*) Vide §. 49. No 2.

(*d*) Vide §. 37. No 3 b).

(*e*) Act. nat. cur. Vol. 8. obs. 7.

(*f*) Vide §. 63 No 2. d).

(*g*) Vide §. 64.

(*h*) Advers. med. P. 2. Spec. 1. Sect. 4. §. 3. p. 165.

5. *Inflammatorius stimulus* loco motus, et ad oculos depositus, ut J A N I N I (i) ægro accidit, qui ad validam anginam inflammatoriam resolvendam cathartico sumpto ab eadem mox liber in chemosin oculi dextri continuo incidit. Perinde s. Y V E S (k) matronæ meminit, quæ iter equo faciens a magna pluvia perfrigerata in pleuritidem incidit, quam neglecta Væ So mutavit in oculi unius chemosin, indeque natum abscessum. Die inde 20^o alter quoque oculus eodem corripiebatur malo pari cum vehementia; sed huic remedia adhibita visum conser-
varunt: ille autem pessumdatus jam nihil pro se spei admisit. Ejusdemmodi quoque est o. BORRICHII (l) historia:
„ ministri Evangelii . . . filia 6 anno-
„ rum (narrat ille) digitum annularem
„ sinistrum mihi ostendit male mulcta-
„ tum tumentemque, quem dum etiam
„ ulceratum adverto, prosequor inquisi-
„ tionem, et tandem spina ventosa . . .
„ misere vexatum conspicio, et os sub-
„ jectum magnam partem carie exesum.
„ Adjiciebat sollicita mater, digitum il-

(i) Vide §. 55. B. No 8.

(k) l. c. Cap. 4. art. 9. §. 3. p m. 181. sq.

(l) Act, med. Hafniens, Vol. 5. Obs. 51.

„ lum non semper dolere, sed per in-
„ tervalla; enim vero quotiescunque
„ oculus ejusdem lateris rubore et dolo-
„ re affligeretur, nullum in digito sen-
„ tiri dolorem, sed quiescente oculi ma-
„ lo digiti dolores esse exquisitissimos,
„ quod et ipsum plorans puellula testaba-
„ tur, et cum sæpe post ad me ventita-
„ ret, . . . re ipsa notabam „.

6. *Tumores subsidentes*, materiamque contentam ad oculorum vasa transferentes, quemadmodum in BAEUMLEI-
NII (m) puella est observatum. Alia quoque apud J. D. GOHLIUM (n) „ puel-
„ la 4 annorum . . . in prima statim in-
„ fantia, ubi lacte adhuc nutriebatur,
„ dextram malam semper habebat infla-
„ tam, cui nulla adhibebatur medicatio.
„ In ablactata talis congestio locum mu-
„ tabat, et in sinistrum dirigebatur ocu-
„ lum cum gravi per periodos recur-
„ rente inflammatione. Cui malo cum
„ ante biennium per famosi ophthalmia-
„ tri EISENBARTHII remedia obviam
„ irent, malum inde exasperatum in dex-
„ trum etiam tendebat oculum, ut hinc
„ binis oculis adhuc inflammatis, nebu-

(m) Vide §. 37. No 3. b).

(n) l. c. Dec. I. Vol. 7. Sect. I. p. 53.

„ lisque in pupilla notatis, ad fontem
„ accellerit, curaque more consveto ibi
„ adhibita in admodum meliorem statum
„ constituta . . . discesserit,,. A. CHE-
NOT (o) perinde vidit buboni repul-
so plerumque successisse ophthalmiam.

7. *Ulcera exarescentia* aut sponte aut arte, quæ vel critica vel antiqua jam erant. Sæpe enim eorum materia oculos tum petere consuevit, ut iis evenire solet, qui fonticulos diu gestatos coire finunt. Sic „ accessit me, inquit v. „ RIEDLINUS (p), . . . judæus qui- „ dam, referens quod pater suus arthri- „ ticus jam per aliquot dies laboret oph- „ thalmia tam molesta, ut nec oculum „ quidem aperire possit; et dum in cau- „ sas inquiero, retulit, eum diu in bra- „ chio sinistro aluisse fonticulum, hunc- „ que diu quidem primo nil fere mate- „ riæ exstillasse, jam vero exaruisse pe- „ nitus et coaluisse: hincque se metue- „ re, ne materia peccans olim hic eva- „ cuata ad oculos translata iisdem jam „ tantum insidietur,,. Eo quoque fa- „ cilius a fonticulis consanatis ophthalmia oboritur, ubi hujus causa illi olim fue-

(o) Tractat. de peste C. 3. p. 78.

(p) Curar. medicar. millenario No 167.

runt excitati (q). Huc vero præsertim pertinet ophthalmia gonorrhœæ syphiliticæ præmature cohibitæ succedens. De hac ita S. YVES (r): „decimum (ait) „ ophthalmiæ genus eundem fere, quem „ chemosis, præ se fert habitum, nisi „ quod tumens conjunctiva dura carnosaque esse videatur. Occipit mox ab „ uberi continuoque materiæ e subflavo „ albidæ ex oculis egressu. Raro obvenit hic morbus, nec nisi e syphilitide „ nascitur, quo affectos complures mihi „ videre obtigit, ac plerisque eorum „ biduo post gonorrhœam suppressam „ supervenit, facta nempe materiæ ad „ oculos metastasi, ex quibus profluebat „ humor lintea eodem tingens modo, ac „ dum per urethram prodibat „. Magis etiam graphice hanc ophthalmiam depingit C. H. ERNDTELIUS (s): „aliæ nobis (inquiens) non semel obvenerunt „ ophthalmiæ, quæ venereæ dici possunt „ commode. Accidit enim non nullis ab „ impura venere gonorrhœam passis, ut „ dum balsamicis et adstringentibus fortioribus malum curare satagunt, subi-

(q) Vide §. 65 No 3. f).

(r) l. c. art. 10. p. m. 182. sq.

(s) Warfaviæ phys. illustratæ Cap. 6. p. 193 sq.

„ to metastasis fiat exsiccatō hoc fonte
„ humoris ferini ad oculos, ubi interio-
„ ra oculi non saltem turbat et vehe-
„ mentius affligit idem, sed inducta si-
„ mul per totum bulbum inflammatione
„ acerrima excrescentiam quamdam cir-
„ ca corneam transparentem format, quæ
„ nisi cito per incisionem chirurgicam
„ auferatur, subito in suppurationem
„ properat, atque ipsam corneam per-
„ forando, turbatis jam atque infectis ab
„ intra humoribus, ad effusionem tota-
„ lem viam parat. Solet autem tunc
„ prius quidem per vulnusculum illud
„ materia gonorrhœæ prorsus similis ex-
„ cerni; sequuntur tandem et aquosus et
„ crystallinus colliquati, et quod omni-
„ um pessimum atque irreparabile, ipse
„ vitreus humor. Nihil hic juvant
„ Væ Sæs, nihil purgationes, nihil æli-
„ um et panacearum decantatarum inter-
„ nus nius; nisi enim carnosa illa ac fe-
„ rinæ indolis excrescentia auferatur pri-
„ mis statim, atque apparet, diebus,
„ perforatio sequitur corneæ tunicæ hu-
„ morumque effusio sine ulla visum re-
„ cuperandi spe. Unde ab omni tem-
„ pore frequentes ex suppressa gonor-
„ rhœa cœcitates observatæ fuere, nul-
„ lumque remedium malo inventum, us-
„ que dum (uti Galli gloriantur) ante

„ decennium et quod excurrit , D. S.
 „ YVES . . . hoc malum penitius in-
 „ spexit, atque unicum remedium in in-
 „ cisione et extirpatione carnosæ illius
 „ excrescentiæ invenit, pluribusque o-
 „ ptato cum effectu applicavit „. Probe
 itaque duo ophthalmiæ venereæ genera
 sunt distingvenda , unum illud nempe,
 quod a miasmate venereo vel in totum
 jam corpus serpente vel extus oculis ap-
 plicato exoritur, de quo jam superius (t)
 dictum est, alterum vero longe gravius
 (chemosis nempe venerea), quod a sup-
 pressa gonorrhœa inducitur, velut in
 juvene SCHMUCKERI (u) est obser-
 vatum.

8. *Arthritis*, *podagra*ve oberans
 vel ob anomaliam vel retrocessionem,
 unde ophthalmiam enatam observavit F.
 HOFFMANNUS (x), in femina ex
 phrenitide arthritica GOHLIUS (y), in
 centurione GULBRANDUS (z), in Co-
 mite HEISTERUS (a), et in se ipso
 MORGAGNIUS (b).

§. 23.

(r) Vide §. 14. f).

(u) Vide histor. 16.

(x) Med. rat. syst. l. c. §. 5.

(y) l. c. Dec. 2. Vol. 6. Sect. 1. No 5. p. 24.

(z) Vide §. 65 No 3. d).

(a) Vide §. 49 No 2.

(b) Vide §. 59 No 2.

§. 23.

IX. FEBRES quoque interdum ophthalmias invehere solent, exque duplicis fere generis, nempe

I. *Catarrhales*, quæ ophthalmia aut critice (per modum metastaseos) aut symptomatice supervenire est observata. Criticam in se ipso expertus est J. H. FÜRSTENAU (c) : „ talem (inquiens) humorum et sanguinis in primis decubitus ad oculum dextrum in proprio corpore cum maximo valetudinis commo-
bis expertus sum; febre enim catarrhali benigna aeris partim humidi A. 1739, partim frigidi nimis et horridi A. 1740 vitio contracta cum symptomatibus consuetis laboranti die morbi 7^{mo} semel atque iterum tumor ruborque oculum, absque tamen dolore notabili, accessit, et ad diem usque 4^{um} et decimum, remediis duntaxat diaphanois cum simili regimine usurpatis, constanter persistit: hinc demum rubore omni et tumore sensim evanescente pristinam sensim redire corporis alacritatem animadverti „ Symptomata vero ac rheumaticæ indolis fuit,

(c) Act. nat. cur, Vol. 6, Obs. 112.

quam cum febre catarrhali rheumatica passa est Consulis uxor apud G O N - L I U M (d).

2. *Intermittentes* vero duplici ratione ophthalmiam producunt, nimirum

a) *Emeticis irritatæ*. „ A vomitiis in febribus intermittentibus exhibitis se sæpissime staphylomata et ophthalmias observasse, mihi inquit M. LANGE (e), communicavit Cel. BOEHMER Halæ Professor „. Oppido rarum certe M. ETTMÜLLERUS (f) hanc in rem profert exemplum: „ vir corripiebatur febre 3^{na} intermittente scorbutica; quam cum bina vice sustinisset, die intermissionis 2^a Junii ordino pulverem purgantem ex \square vitriolat. &c. qui crebrius sed sine levamine purgavit; nam insequente die 3 Junii eadem paroxysmi ferocia: hoc singulare erat in eo, 1) quod urinæ fuerint obscure rubræ, quasi sanguine essent tinctæ; sed ad latus aspectæ tenues sine contentis; albidus apparebat liquor: non ergo erat sanguis, qui prodibat. 2) dum paroxysmus urge-

(d) Vide §. 37 No 3. a).

(e) Diss. de ophthalmia §. 6. p. 17.

(f) Opp. T. 2. P. 2. Obs. 143.

„ ret , gravissimi dolores crurum eum
„ corripiebant in regione tiliarum, ut
„ exinde misere ejularet ; sed evanescentem
„ te paroxysmo et dolores hi penitus
„ remittebant, eo die intermissionis nihil
„ sentiente. Post aliquot paroxysmos die 7
„ ordino cum Θ* die intermissionis capiendum ; cum vero semper
„ ante paroxysmum per horas 3 vel
„ 4 gravissimas anxietates præcordiorum
„ sentiret, die 8^a Junii ante paroxysmum
„ ordino vomitorium blandum, cuius usu et omnes
„ anxietates remiserunt, et paroxysmus non rediit hac
„ nocte ; sed die 9^a oculus sinister inflammatus cum
„ intenso dolore conspicitur. Die 10^a nocte hora 2^a rediit
„ paroxysmus cum frigore et æstu insigni stipatus ;
„ dolor crurum mediocris vel nullus ; oculus mane
„ etiam dexter admodum inflammatus et acerbè
„ dolens conspicitur. Ob id vocato chirurgo utrinque
„ vesicas in nucha excitandas jubeo ; quibus copiose
„ plorantibus die 12^a Junii nocte, cum expectaretur
„ denuo paroxysmus, nullus rediit, saltem appetente
„ mane æstus per aliquot horas mediocris, hinc et
„ sudor, sed nullus rigor vel horror, nullus dolor,
„ mediante scilicet vesica his ita evanescentibus. Die 14^a Junii a meridie

„ hora 4^a gravissimi dolores oculorum
„ redeunt, nocte insequente cessantes;
„ supervenit appetente mane paroxysmus
„ levis. Die 16^a hora 5^a vespertina denuo
„ oculi acerbe dolent usque ad median
„ noctem, et appetente mane redit pa-
„ roxysmus. Die 18^a ut præcaverentur
„ dolores oculorum, jussi, acciperet si-
„ napi semen, hocque contundat, et
„ cum ∇ irrorando in forma pulticulæ
„ carpis applicet utrisque pro revulsio-
„ ne: cuius usu factum, ut nulli dolo-
„ res percepti fuerint nocte sequente,
„ et mane paroxysmus exilis denuo red-
„ iret. Sed cum medio sinapisini ocu-
„ lorum affectus ante paroxysmum cessa-
„ rent, factum fuit, ut hinc post paro-
„ xysmum iidem redirent. Ob id sem-
„ per mane et vesperi sinapisinos appli-
„ candos jussi; quorum usu non amplius
„ redierunt oculorum pathemata: inter-
„ nis vero fixis pedetentim febris eva-
„ nuit,,.

b) *Larvata*, dum videlicet sub
ophthalmiæ habitu delitescentes ægrum
per paroxysmos statim temporibus repe-
tentes affligunt, quarum exempla haud
pauca inferius (g) memorabuntur, et

quale L. HEISTERUS (b) etiam literis prodidit de viro, cui mane quovis hora primum 9^a postmodo vero 11^a dolor in oculo dextero (anno vero ante in sinistro) cum pandiculationibus obortus per 2 aut 3 horas vehementer crescebat, quoad oculus inflammatus serum quoque profunderet, quo tempore cephalalgia simul aderat, quasi quis malleo clavum trans caput adigere vellet: atque ubi ita dolor 2. 3. horis desævisset, per alias 2. 3. horas ita rursus decreſcebat, ut hora inde 5^a vel 6^a nec veſtigium jam illius superſuerit. Appetentia nihilominus vigebat. In Anglia primum æger potu fontis Pyrmontani ab hac ægritudine liberatus trajecto mari in Gallia recidivam nactus est. Supervenit diarrhœa, qua durante ophthalmia conticuit, illa vero remittente denuo revertit. Cum æger malum neglectæ Væ Sni ac sanguinis rarefactioni tribueret, vetito in aliquot dies vino carniūque esu dati pulveres refrigerantes levamen attulere; quod alias etiam ab usu salis communis pediluviiſque aquæ simplicis mane ac vesp̄ri usurpatis est expertus. Consultus itaque HEISTERUS antipyreta

(b) l. c. 2 Band No 144.

cum temperantibus præscripsit, videlicet

℞. Salis absinth. ℥j

‡ In vitriolati gr. vij. M. F. ♂ D. in 8plo S. quovis mane doses ij, unam hora 7^a, alteram hora ante invasionem scil. 10^a, ex aqua sequenti:

℞. ∇^x flor. paralyf. ℥bj.

—— cinnamom. f. v. ℥ij. M.

Porro a prandio ac vesperti datæ essentia gtt. 45:

℞. Essent. Cort. Peruv.

—— Valerian. aa ℥iij. M. D. pro dosi gtt. 45 cum vino. Præterea imperata V^x S^o in pede, ac deinceps tepida pediluvia cum flor. chamomillæ M. ij parata; potui concessum vinum aqua Selterana dilutum, monitusque æger, vino et carnibus sobrie uteretur. Exitus ignoratur.

§. 24.

X. CONTAGIUM ne etiam in censum causarum admittendum? Haud utique defunt, qui hic ei dandum aliquid censuerint. H. BOERHAAVE (i) „ siquis

(i) Prælect. acad. de morb. nerv. T. 2. p. m. 512.

„ (ait) subito videat hominem, cujus
 „ limbi palpebrarum sunt inflammati, coc-
 „ cineo colore fulgentes, et oculi simul
 „ tales sunt, et lacrimæ inde destillant,
 „ ejus oculi etiam inde læduntur, nec
 „ ullus est, qui hoc sentiat „. Doctrina
 „ autem hæc de contagio per intuitum
 „ oculorum ophthalmia laborantium propa-
 „ gato usque adeo vetus esse videtur, ut
 „ quo tempore occeperit, haud pro certo
 „ dixeris. Romanis opinionem hanc vul-
 „ gatissimam fuisse ex P. OVIDIO (k) di-
 „ scimus canente:

Dum spectant læsos oculi, læduntur et ipsi,

Multaque corporibus transitione nocent.

Et PLUTARCHUS (l) „ cum maxime
 „ (inquit) cum facillime ophthalmiæ
 „ contagium proserpit ad una degentes;
 „ tam acrem habet vim visus afficiendi
 „ alterum „. Neque vero Medici ea
 „ tempestate ab his aliter sensere, quos
 „ inter GALENUS (m) de evidentibus com-
 „ munibusque febrium causis disserens rem
 „ hanc velut in vulgus jam notam nullique
 „ ambiguitati obnoxiam affirmat dicens :
 „ pestilenti morbo laborantium conver-

(k) De remed. amor. v. 615.

(l) L. 5. Symp. 7.

(m) De different. febr. L. 1. C. 2.

„ fatio periculosa , ne inde contagium
 „ contrahatur, quem ad modum ex scabie
 „ et lippitudine „. Et Rabbi MOYSES
 (n): „ qui primo videt ophthalmia la-
 „ borantem, statim ipsi oculus conturba-
 „ tur; quod si adhuc intente aspiciat,
 „ non solum conturbatur, verum etiam
 „ ophthalmiam contrahit „. Neque ipsa
 etiam exempla desunt, quæ opinioni
 huic suffragantur. I. DIEMERBROE-
 CKII (o) matrona Aprili magna ac do-
 lorifica oculorum inflammatione laboran-
 te post biduum duæ etiam illius ancillæ
 ac famulus eandem ex aspectu dominæ
 contraxere. Purgatis vitellus ovi ad
 duritiem assus et cum lacte muliebri
 subactus per noctem oculis applicabatur;
 postea bis terve per diem una alterave
 sequentis collyrii guttula oculis immissa
 intra triduum sanavit hos ægros:

R. ∇^x plantag. ʒij

— rosar. ʒj

Sacch. candi ʒj

Vitriol. alb. ʒj. M.

Hujusmodi etiam ophthalmiæ contagio
 ab uxore in virum crebriori aspectu mu-

(n) Aphor. 24 part.

(o) Obs. et cur. med. 55. Opp. med. pract.
 p. m. 670.

tuo communicatæ exemplum proponit V. RIEDLINUS (*p*). Et G. W. WEDELIIUS (*q*) „ novit . . . uno infante ophthalmia longa correpto alterum fratrem minorem natu per contagium tale eosdem passum manes, ut utrique conjunctim diu molestia tali afficerentur,,. Imo integræ id genus epidemiæ etiam fuere observatæ; nam P. FORESTUS (*r*) de epidemica ophthalmia superius (*s*) memorata scribens „ erat „ autem (ait) hæc ophthalmia quasi contagiosa, ut si quis ophthalmicos istos intueretur, mox eodem malo corripere peretur,,. Id ipsum J. LANZONUS (*t*) et extra epidemiam „ pluries observavit, „ et præsertim A. 1722, dum maligna „ quædam influenza ophthalmiarum . . . „ Ferrariæ oborta fuit, ita ut ex uno „ tantum, qui lippitudine laboraret, ejus „ tota familia brevi ophthalmica facta „ fuerit; imo non tantum familiares et „ cives, sed extraneos etiam ac hospites

(*p*) Curar. medic. millenar. obs. 187.

(*q*) Diss. de ophthalmia (4 Jenæ 1684 Resp. A. REHME) §. 23. p. 12.

(*r*) l. c.

(*s*) Vide §. 22. No 1.

(*t*) Act. nat. cur. Vol. I. obs. 41.

„ affecerat , ut peregrinos per solam
„ noctem in hospitio morantes sæpe in-
„ vaserit , et qui sanus venerat , lippus
„ discesserit „ Præsertim vero irrita-
biliore oculi hominum animo mobilium
huic contagio patere credebantur ; siqui-
dem SENECA (u) „ imbecilles oculos
„ esse scias (inquit) , qui ad alienam
„ lippitudinem et ipsi suffunduntur „.
Facta attuli , judicium ac theoriam hujus
rei aliis relinquo.

CAPUT V.

S Y M P T O M A T A .

§. 25.

SYMPTOMATA *ophthalmiæ* binas in
classes ita tribui possunt , ut in priorem ,
quæ cuilibet inflammationi communia sunt
(nempe febris , rubor , tumor , dolor ,
&c) , in posteriorem vero , quæ ex fa-
brica oculorum , eorumque cum vicinis
partibus nexu soli *ophthalmiæ* sunt pro-
pria , referantur.

(u) De clement. 2.

§. 26.

I. *Communia* ophthalmiarum sympto-
mata ex inflammationis natura pendentia
id universim hic notatu necessarium sup-
peditant, quod pro ratione duplicis oph-
thalmiæ a duplici inflammationis gradu
petitæ (x) scilicet *taraxeos* et *chemoseos*
numero ac intensitate ita varient, ut in
taraxi, quam pro inchoante atque im-
perfecta oculorum inflammatione haberi
dictum est, nec omnia semper adsint, sed
pro majore minoreve inchoatæ hujus ac
non dum adultæ inflammationis gradu jam
plura jam pauciora emergant, nec quæ
adsunt, magnæ admodum sint vehemen-
tiæ: in chemosi vero (in quam taraxis
ipsa vel ex se vel ob pravam medicatio-
nem adolescere quandoque solet), utpo-
te perfecto veræ inflammationis statu,
non modo omnia adsint, sed vehementia
etiam. Quæ idcirco seorsim pro ratione
duplicis hujus ophthalmiæ breviter erunt
expendenda.

(x) Vide §. 5.

§. 27.

1. *Rubor* oculi ita se ut plurimum habet, ut in taraxi pro varia ejus magnitudine sit varius, minor tamen semper, quam in chemosi; nam in taraxi neque corneam tingit, neque ultra adnatam oculi procurrit, sed huic tantummodo ita inducitur, ut radiatim quasi albam ejus superficiem discriminet, nec omnem ejus albedinem aboleat, sed rubentia in illa vasa discerni se se ab invicem patiantur; qualis in AMATI (y) juvene fuit: contra vero in chemosi tantus rubor esse consuevit, quantus in erysipelate vel phlegmone, omnisque adnata oculi ita erubescit, ut omnis ejus albedo exstincta sit. Non modo autem adnata rubet, sed sæpenumero etiam, J. L. SCHMUCKERO (z) teste, uvea et choroidea, imo aliquando (ut ut rarius) ipsam quoque corneam pellucidam rubuisse GENDRON (a) observavit; sæpius tamen SCHMUCKERO (b) notante in graviore chemosi cornea evadit solito crassior, al-

(y) Vide §. 53. No 2.

(z) l. c. 1. Th p. 433.

(a) l. c.

(b) l. c. p. 500.

bida, et opaca, albuginemque ostentat: procul dubio ob vala sero phlogistico turgentia.

§. 28.

2. *Tumor* autem in taraxi aut nullus aut modicus certe adnatam tenet, dum in chemosi phlegmones in modum insignis semper observatur: „conjunctivam „ait SCHMUCKER (c), ab accumulato „sanguine usque adeo tumuisse observa- „tum est, ut 3. 4. pluresve lineas cras- „sa fuerit „. Quo fit, ut hujusmodi tumor undique circum circa corneam velut in aggerem elevetur, intra quem cornea ac pone hanc locata pupilla velut intra foveam quamdam depressæ videantur. Et quoniam adnata non modo anteriorem bulbi faciem investit, verum ad interiorem quoque palpebrarum superficiem reflectitur, huc etiam se se inflammatio ejusdem diffundit, ac palpebras in tumorem, quem P. FORESTUS (d) φίμωσιν appellat, attollit; atque tunc palpebræ ad se coeuntes oculum ita tegunt, ut solo voluntatis arbitrio aperiri neque-

(c) Ibidem p. 484.

(d) l. c. schol. ad Obs. I.

ant, quemadmodum in BARTHOLINI (e) infante, ESCHENBACHII (f) matrona, FORESTI (g) cognata, binis FOTHERGILLII (h) pueris, GALENI (i) œconomo, et succenturione GEACHII (k) est animadversum. Interdum autem tumidæ sic palpebræ adeo limbis suis introrsum vergunt, ut de tarsis ciliisque nihil omnino videatur, velut duobus in pueris Norimbergensis Commercii literarii (l) accidisse refertur. Utroque autem hoc tumore, bulbi nempe ac palpebrarum, præsentē tantæ sæpe molis oculus esse videtur, ut eum FORESTUS (m) in sua cognata ovo gallinæ, FÜRSTENAU (n) vero in venatore pugno, et HEISTERUS (o) in Consule duplo sani oculi volumini, æqualem repperint. Quin imo solus aliquando bulbus tam enormem in molem attollitur, ut limbos palpebrarum, tumentium li-

(e) Vide §. 17.

(f) Vide §. 37 No 5.

(g) Vide histor. 4.

(h) Vide §. 48 No 3.

(i) Vide §. 54.

(k) Vide §. 48 No 2.

(l) Vide §. 34 No 1. b.

(m) Vide histor. 4.

(n) Vide §. 16.

(o) Vide §. 14. c).

cet, ad se se mutuo accedere non patiatur, sed extra eosdem protuberet, velut in quodam JANINI (*p*) ægro, versis extrorsum tarsis quasi retorridis ectropion causet, quemadmodum VICAT (*q*) in puero quodam septenni ex ophthalmia male mulctato observavit. LAYARDI (*r*) vero adolescenti bulbus tantopere tumuerat, ut extra orbitam emotus in superius usque labium propenderet. Neque vero inflammatorius hic tumor modo dictis limitibus contentus semper est; subinde plures quoque vicinas partes corripit, ut accidit FISCHERI (*s*) matronæ, CONSTRITI (*t*) filiæ, GAUTIERI (*u*) ægræ, et HILDANI (*x*) pictori, cui tota etiam sinistra faciei pars inflammatione affecta erat.

§. 29.

3. *Dolor* perinde in leviori taraxi aut nullus est, aut levis, ut in GRIGNO-

(*p*) Vide §. 55. B. No 8.

(*q*) Delect. Obs. pract. ex diar. clinic, Obs. 2.

(*r*) Vide §. 79.

(*s*) Vide §. 72 I. D. No 5. b).

(*t*) Ibidem No 8.

(*u*) Ibidem.

(*x*) Vide §. 33.

NI (y) puero ; sæpeque ejus loco pruritus adest , quem præter monachum PLATERI (z) vetula præsertim PAULLINI (a) intolerandum perpeffa est. Aliis, ut HEISTERI (b) Comiti , ardor tantum est molestus. Verum in chemosi pro magnitudine morbi dolor acutus oculum affectum tenet, ac sanum quoque oculum interdum in consensum trahit, velut in adolescente SIBBERNII (c). Quantus is in matrona FISCHERI (d), ægra DOBSONI (e), ac satellite ERNDTELLII (f) fuerit, adjuncta docent : qui cum ut plurimum continuus esse soleat, noctesque reddat insomnes; non nullis tamen ex intervallis vel renascitur , ut LENTILII (g) puellæ, quam noctu semper laceffebat, vel exacerbatur, ut GEACHII (h) succenturioni, cui ad lucem oculis admissam pene ad delirium increfce-

(y) Vide §. 18.

(z) Observ. medic. Lib. 2. p. m. 357. fq.

(a) Vide §. 14. b).

(b) Vide histor 7.

(c) Vide histor. 17.

(d) Vide §. 72. I. D. No 5. b).

(e) Vide §. 39.

(f) Vide §. 34 No 1. a).

(g) Vide §. 72. I. A. No 3.

(h) Vide §. 48 No 2.

increſcebat. Vehemens id genus dolor plerumque pulſatorius eſt, qualem ſe F I S C H E R I (i) matrona, juveniſque H O F F M A N N I (k) ſentire querebantur.

§. 30.

4. *Febris* denique in taraxi haud raro omnis abeſt, ut in A M A T I (l) juvene, præſertim ſi externæ cauſæ debetur morbus, ut in ancilla H E N Z I I (m). Ubi vero taraxis captis incrementis in chemofin adoleſcit; febris initio nulla poſtmodo emicat; quemadmodum in B E R G E N I I judæo (n) et adoleſcente S I B B E R N I I (o); contrarium vero accidit in ophthalmiis operationi cataractæ ſupervenientibus; nam teſte A. G. R I C H T E R O (p) hoc in caſu „ febricula, quæ ori- „ tur, fere ſemper inflammationem ocu- „ li præcedit; ita ut illam non ab in- „ flammatione, ſed potius inflammatio- „ nem a febricula oriri dixeris, in pri- „ mis cum mitiori huic vel vehementio-

(i) Vide §. 72. l. D. No 5. b).

(k) Vide §. 17.

(l) Vide §. 53 No 3.

(m) Vide §. 76. c).

(n) Vide §. 15.

(o) Vide hiſtor. 17.

(p) Obſerv. chirurg. Faſc. 1. Cap. 11. p. 101.

„ ri plerumque subsequens inflammatio
„ respondeat mitior vel vehementior.
„ Noctu plerumque ægrum corripit fe-
„ bricula, et prima nocte levis, secun-
„ da paulo vehementior, tertia insignis
„ est cum dolore oculi, calore, et an-
„ xietate. Et sic quidem non nisi post
„ tertium febris paroxysmum apparet in-
„ flammatio oculi. Aliquando primam
„ statim febriculam vehemens sequitur
„ oculi dolor. Sed hæc tamen vario
„ modo contingunt, et magni momenti
„ non sunt. Et cum in graviore che-
„ mosi febris ut plurimum sit continua
„ continens, in ophthalmia inter taraxin
„ et chemosin veluti ambigente, continua
„ remittens haud raro, imo intermittens
„ etiam, esse solet, qualis ОЕНМБ I O (q)
„ quavis vespere renascebatur, typumque
„ alterutrum tunc vel maxime observat,
„ quando a collecta primis in viis ob tur-
„ batum systema nervosum præsertim ex
„ animi pathematibus saburra operationem
„ cataractæ sequitur. „ Certe quo plura
„ et graviora affecti generis nervosi fi-
„ gna statim post operationem apparent,
„ eo vehementiorem febrem et oculi in-
„ flammationem plerumque sequi obser-

(q) Vide §. 48 No 4.

„ vasse midi videor , inquit RICHTE-
„ RUS (r); ut itaque qui hanc febrem
„ et inflammationem prævertere vult ,
„ has nervorum turbas cavere vel cito
„ tollere debeat . . . Observavi (s) ali-
„ quando in ægro ad 5^{um} post operatio-
„ nem diem oculi dolore et inflammatio-
„ ne penitus libero omnium rerum tam
„ bene huc usque gestarum faciem 6a
„ post operationem nocte subito muta-
„ tam esse, ita ut febre et dolore oculo-
„ rum valde excruciatu æger somno pe-
„ nitus caruerit. Obfiluerunt mane hæc
„ symptomata, versus noctem vero re-
„ cruduerunt cum majori vehementia ,
„ oculorum insigni inflammatione, appe-
„ titu prostrato , et sapore oris amaro
„ et nauseoso. In causam horum sym-
„ ptomatum inquirens reperi , terrori
„ vehementi, quo æger incendio in ur-
„ be oborto perculsus fuit , tribuenda
„ illa esse. Evanuerunt autem illa post
„ largum Ω ^{us} vitrioli usum, ita ut post ali-
„ quot dies abitum æger pararet. Ita sæ-
„ pe plures aliæ ophthalmiæ latentes in
„ præcordiis sordes causas agnoscunt, ut
„ qui harum rationem non habet, fru-

(r) l. c.

(s) Ibidem p. 106 & Cap. 13. obs. 3. p. 127. seqq.

„ ſtra ſalutem exſpectet ab aliorum me-
„ dicamentorum virtute „.

§. 31.

II. *Propria* autem ophthalmiarum ſymptomata ſunt fere ſequentia:

I. *Dolor capitis*, ut plurimum pulſatorius, aut punctorius, ut in GEA-CHII (*t*) ſuccenturiōne; HEISTERI viro (*u*) et ſcrophuloſa muliere (*x*), HENZII (*y*) ancilla; HOFFMANNI (*z*) juvene; JANINI (*a*) ægro; binisque SCHMUCKERI (*b*) puellis; ac SIBBERNII (*c*) adolescente; qui interdum inflammationi præludere aliquamdiu ſolet, velut JANINI (*d*) in ægro: iis autem, qui unius tantum oculi ophthalmia laborant, plerumque hemicrania e latere oculi affecti accidit, ut HEISTERI (*e*)

(*t*) Vide §. 48 No 2.

(*u*) Vide §. 23 No 2. b).

(*x*) Vide hiſtor. 3.

(*y*) Vide §. 76. e).

(*z*) Vide §. 17.

(*a*) Vide §. 55 B. No 3.

(*b*) Vide §. 54 & hiſtor. 15.

(*c*) Vide hiſtor. 17.

(*d*) Vide hiſtor. 12.

(*e*) Vide §. 49 No 2.

Comiti arthritico, centurionibus GULBRANDI (f) ac PLATERI (g), nec non VOGELII (h) mulieri.

2. *Spasmi, convulsiones, variarum partium, ut*

a) *Pupillæ myosis*, quæ in quodam JANINI (i) ægro tanta fuit, ut ne vestigium quidem pupillæ reliquerit, artificialemque pupillam efficere fuerit necessum. Alias vero ob inæqualem fibrarum iridis spasmum non myosis sed aliena pupillæ figura inducitur, ut in ægra DEMOURSII (k) et HOINI (l) milite.

b) *Palpebrarum*, ut in ARNOLDI (m) juvene a secta utriusque pedis vena accidit.

c) *Musculorum faciei*, qui sinistro præsertim in latere apud SIBBERNII (n) adolescentem viscebantur.

(f) Vide §. 65 No 3. d).

(g) Ibidem No 2. b).

(h) Vide §. 72. I. C. No 2.

(i) Vide §. 55 B. No 8.

(k) Vide histor. meam amauroseos P. I. §. 44.
p. 264.

(l) Vide §. 17.

(m) Vide §. 41 No 2.

(n) Vide histor. 17.

d) *Artuum* omnium horribiles convulsiones cum sensuum abolitione suo in juvene vidit TOUTANT (o).

3. *Lucis intolerantia* tam commune est ophthalmiis paulo gravioribus symptoma, ut non facile ægrum reperias, cujus oculi lucem citra dolorem ferrent, ut passim deinde in exemplis visuri sumus; imo teste RICHTERO (p) „ plerumque „ diu satis post inflammationem dissipata, „ tam tanta oculi remanet sensibilitas, ut „ lucem vix ferant ægri, parum vel „ confuse videant in loco lucido, melius „ in obscuriori „: velut SCHMUCKER (q) puellæ accidit.

4. *Epiphora* seu humoris aut saniosi aut serosi ex oculis inflammatis profluvium, unum e præcipuis ophthalmiæ symptomatibus, a quo illa, ut superius (r) dictum, humida audit, et ceteris morbi speciebus est frequentior. Serum ex oculis ita manans fervidum est, ac tantæ sæpe acrimoniæ, ut partes, quas alluit humectatque, excoriet et erodat, velut

(o) Vide §. 72 I. D. No 8.

(p) l. c. Cap. 11. p. 116.

(q) Vide §. 54.

(r) Vide §. 6. No 2.

in FORESTI (s) juvene, GEACHII (t) succenturione, HILDEBRANDI (u) viro, puero SIBBERNII (x), puellae trimula H. SMETII (y), quæ „ utriusque „ oculi lippitudine, præsertim vero dextri, jam per biennium vexabatur cum „ tanta lacrymarum acrimonia, ut genas, „ malas, labrumentum exulceraret „ : imo genas ad ossa usque erosas inde fuisse cuidam infanti meminit BÜCHNERUS (z). Profluvium hoc aut mox occipiente morbo, aut serius etiam aliquando, oboritur ; non nullisque est continuum, aliis vero tum solummodo accidit, dum palpebræ oculum clausum tenentes aperiuntur, quod in DOESONI (a) ægra obtinuit. Aliquando copia quoque illius est incredibilis. C. T. BIERLINGII (b) aurifaber 30 annis major ophthalmiam e cephalalgia a ☿ ii fumo hausto cum virium

(s) Vide histor. 3.

(t) Vide §. 48 No 2.

(u) Vide §. 46.

(x) Vide §. 72. I. D. No 8.

(y) Miscellan. medic. Lib. 10. p. 535.

(z) Vide §. 41 No 2.

(a) Vide §. 39.

(b) Adversar. curios. Cent. 1. obs. 90. p. 232.

debilitate, anorexia, vigiliisque concitata nactus est cum tanto feri limpidi ex oculis per intervalla profluvio, ut per 3 vel 4 horas illud velut e gutturnio fluens vasis colligi potuerit: quoad catharticum, V. S. vesicans, diaphoreticum, demumque repercutientia collyria, morbum intra octiduum sustulerunt.

5. *Anchyloblepharosis* spuria seu palpebrarum ciliorumque ope materiæ spissæ puriformis e glandulis MEIBOMII exsudantis ad se mutuo coalitus, qui oculis noctu somni tempore, vel interdiu ob tumorem palpebrarum continenter clausis accidit, ut in DOBSONI (c) ægra, GOHLII (d) vidua, GRIGNONI (e) puero, GULBRANDI (f) ac MUYSII (g) puella, juvenibus HEISTERI (h) et REIMANNI (i), viroque HILDEBRANDII (k).

(c) Vide §. 39.

(d) Vide §. 42 No 2.

(e) Vide §. 18.

(f) Vide §. 65 No 2. d).

(g) Ibidem b).

(h) Vide §. 49 No 2.

(i) Vide §. 65 No 3. c).

(k) Vide §. 46.

6. *Visus imminutio*, cujus efficiendæ complures hic reperire est causas, ut sunt

- a) Epiphora (*l*)
- b) Myosis completa (*m*)
- c) Palpebræ clausæ (*n*)
- d) Cornea opacata (*o*)
- e) Lucis intolerantia (*p*), &c.

H. BOERHAAVIUS (*q*) „ multos ægros
 „ curavit, et animum accurate attendit,
 „ vidit oculum vehementer inflamma-
 „ tum sæpe magis protuberare quam
 „ alias, sed sedata inflammatione tumo-
 „ rem subsidere, et oculum pristinam
 „ figuram recipere; tumque paululum
 „ obscurius videbant ægri, sed restitu-
 „ to nitore et pelluciditate redibat visus.

(*l*) Vide præced. No 4.

(*m*) Vide præc. No 2. a).

(*n*) Vide §. 28.

(*o*) Vide §. 27.

(*p*) Vide præced. No 3.

(*q*) l. c. §. 53 p. m. 42.

CAPUT VI.

P R O G N O S I S.

§. 32.

I. CHRONICAE *ophthalmiæ raro ex integro sunt curabiles*;—e plurimis, quæ W. ROWLEYO (r) curandæ obtigerant, non nisi 5 radicalem admiserunt curationem: adeo sæpe indolem habent contumacem, ut heroica etiam præsidia eludant. „ Præclarum hujus rei exemplum „ nobis, ait P. G. SCHACHER (s), præ- „ bet vir temperamenti sanguinei, qui „ aliquot annos lippitudine, et posthinc „ excoriatione et levi exulceratione „ palpebrarum laborans non modo fontic- „ culum diu gestavit, et etiamnum ge- „ stat, sed et selectioribus topicis, an- „ nuiis Væ Sbus, thermis, decoctis ligno- „ rum cum regimine sudorifero, et abs- „ tinentia a potu consveto ciboque, ac „ tandem salivatione separatis tempori- „ bus est usus; a quibus vero omnibus

(r) l. c.

(s) Diss. de fonticulo §. 16 p. 14 (4 Lipsiæ 1722 Resp. G. DOERINGIO)

„ parum vel nihil solaminis sensit, hunc
 „ usque in diem inveterato hoc malo ve-
 „ xatus, ut ut ceteroquin vegetus satis
 „ sit atque incolumis „. Similem quo-
 que ophthalmiam siccam in vidua ob-
 servavit F. LOSSIUS (t). Nihilo mi-
 nus tamen in suscipienda hujusmodi oph-
 thalmiarum cura animus neutiquam est
 abjiciendus; quandoquidem non paucos
 hocce libello visuri sumus, qui a diutur-
 na et habituali ophthalmia variis reme-
 diis fuere liberati. Nam ut de aliquot
 mensium ophthalmiis, quas GOULAR-
 DI (u) ac RIVERII (x) infantes, puella
 SALCHOVII (y), vitricus WILLII (z),
 juvenisque ZACUTI (a), sustinuerunt,
 percuratis dicam nihil, annosas ophthal-
 mias fuisse sanatas constat. Sic sanatæ
 fuere, queis laborarunt

anno 1 ZACUTI (b) æger,
 annis 2 HILDANI (c) filia,

(t) Obs. med. L. I. obs. 35.

(u) Vide §. 72 L. D. No 8.

(x) Ibidem A. No 6.

(y) Vide §. 37. No 4.

(z) Vide §. 72 II. No 2. g).

(a) Vide §. 55 B. No 1. c).

(b) Vide §. 49 No 3.

(c) Vide §. 65 No 2. d).

annis 2	JANINI (<i>d</i>)	puella,
—	HEINRICI (<i>e</i>)	puella,
annis 3	ALIXII (<i>f</i>)	adolescens,
—	HOFFMANNI (<i>g</i>)	femina,
—	RIVERII (<i>h</i>)	puella,
annis 4	PAULLINI (<i>i</i>)	mulier
—	5 LE ROY (<i>k</i>)	puellus
—	8.9. TILLINGII (<i>l</i>)	puella,
—	9. HEINRICI (<i>m</i>)	puella,
—	pluribus ACRELII (<i>n</i>)	ægri,
—	— GOHLII (<i>o</i>)	studiosus,
—	— MUYSII (<i>p</i>)	puella,
—	— PAULLINI (<i>q</i>)	puella,
—	— POELLERI (<i>r</i>)	mulier,
—	— RUCKERI (<i>s</i>)	virgo,
—	— SALCHOVII (<i>t</i>)	puella,

(*d*) Vide §. 37 No 2. a).

(*e*) Vide §. 49 No 3.

(*f*) Vide §. 77.

(*g*) Vide §. 42 No 2.

(*h*) Vide §. 41 No 2.

(*i*) Vide §. 47.

(*k*) Vide §. 61 No 2.

(*l*) Vide §. 41 No 2.

(*m*) Vide §. 49 No 3.

(*n*) Vide §. 35 No 4.

(*o*) Vide §. 42 No 2.

(*p*) Vide §. 65 No 2. b).

(*q*) Ibidem.

(*r*) Vide §. 72. I. D. No 2.

(*s*) Vide §. 65 No 3. e).

(*t*) Vide §. 72. I. D. No 8.

&c. Quæ cum ita sint, haud abs re suspicari licet, non paucas id genus ophthalmias diuturnitatem noctas læpenumero aut præpostera medicationi deberi, aut negligentia ægrorum, qui malum vel nequaquam tanti faciunt; vel debitis remediis ob aversionem erga eadem oppugnari haud sinunt; quos inter forte referenda est ophthalmia 15 annorum a M. LANGE (u) in femina visa.

§. 33.

II. EFFECTUS *ophthalmiæ* vehementis vel crebræ vel diuturnæ vel perperam tractatæ gravia sæpe oculorum mala sunt; interdum tamen, si mediocris præsertim sit; alias oculorum ægrotudines abolet, præsertim vero amblyopiam ab humorum decubitu ad vasa ophthalmica, eorumque infarctu, retinam in functione sua impediēte, aut ipsos etiam humores aliquatenus opacante pendentem, quem superveniens ophthalmia tollit. Duos ejusmodi casus G. F. HILDANUS observavit, nempe (x) „ nobilis quidam „ a multis annis afflictus singulis ma-

(u) Diff. de ophthalmi. §. 45. p. 80 Notā (a).

(x) Obs. et cur. med. chir. Cent. I. Obs. 27.

„ tutinis diebus abluere faciem et ocu-
 „ los aqua frigidissima : hinc paulatim
 „ debilitatus et obfuscatus est visus.
 „ Tandem . . . ophthalmia utriusque
 „ oculi correptus me advocandum iussit.
 „ Cessit ei hoc malum in maximum com-
 „ modum; curatus enim ab ophthalmia,
 „ et aqua nostra visum corroborante ad
 „ tempus usus, lotioneq̃ue aquæ frigidaë
 „ rejecta, visus acutior quam ante sa-
 „ ctus est „ Porro (y) „ septuagena-
 „ rius . . . pictor et sculptor excellens
 „ cum . . . in ipsis canicularibus oph-
 „ thalmia gravissima oculi sinistri afflige-
 „ retur . . . in consilium me adhibuit.
 „ Inflammatio autem, quæ ingens et ma-
 „ gna erat, non solum oculum ipsum
 „ verum etiam palpebras mediamque par-
 „ tem faciei occupaverat. Apparebat
 „ præterea extuberantia quædam fabæ
 „ magnitudine in ipsa cornea versus can-
 „ thum majorem et e regione iridis. Do-
 „ lor quidem totum caput infestabat, cir-
 „ ca tuberculum vero maximus acutus
 „ et pungens erat. Cum itaque propter
 „ doloris vehementiam, inflammationem,
 „ et affluxum humorum in corpore ca-
 „ cochymo abscessum oculi metuerem,

„ ea qua fieri potuit diligentia humorum
 „ impetum ad oculum defluentium ut im-
 „ pedirem, et ad alias corporis partes
 „ averterem, simul et evacuarem, ope-
 „ ram dedi. Quapropter instituta opti-
 „ ma victus ratione, refrigerante scili-
 „ cet et aliquomodo tenui, sequentes
 „ pilulas exhibui:

℞. M. P. aurear. ʒj

—— lucis major. ʒij

Trochiscor. Alhandal et

Diagrydii aa gr. iij

Ol. fœniculi grt. vj. cum

Syrupo ros. solut. composito cum

„ rhab. agarico et fenna fiant pilulæ viij,
 „ involvantur ʒ^e cinnamomi. Purgato
 „ corpore venam in brachio sinistro in-
 „ cidi; oculo vero sequens collyrium in-
 „ stillavi:

℞. ∇^x rosac.

— plantag.

— fragar. aa ʒij

Sem. cydonior. contus.

— fœnigræci aa ʒj. M. maneant-
 que in infusione hor. 4,
 in expressione dissolve

Tutizæ ppt.

C. C. usti et ppt. aa ʒi

Caphuræ ʒss. M. F. collyrium, et

„ instilletur, et applicetur calide qua-
 „ ter aut quinquies in die. Sedata in-

„ inflammatione loco aquæ fragariæ et
 „ plantaginis aquam fœniculi et euphra-
 „ siæ collyrio admiscui. Sequenti die
 „ post sectionem venæ cucurbitulas cum
 „ magna flamma applicare jussi; deinde
 „ iterum præscriptas pilulas exhibui, et
 „ secundo venam incidi; cucurbitulas
 „ quin etiam iteravi. His per dies ali-
 „ quot adhibitis remediis; et observata
 „ optima victus ratione tuberculum pau-
 „ latim subsedit, et oculus feliciter con-
 „ valuit, visus quoque ita restitutus
 „ fuit, ut nunc acutior sit; quam fuit
 „ ante; præcipue oculi sinistri; cum
 „ enim ante morbum ultra annos 20 per-
 „ spicillis usus fuisset æger, nunc clauso
 „ dextro oculo sinistro etiam minutissima
 „ discernere; legere, ac pingere potest,
 „ idque sine perspicillo; Huic non
 „ absimilem casum narrat J. A. LIM-
 „ PRECHT (2): „ A. 1724. . . . Medi-
 „ cus quidam; qui ætatem suam ad finem
 „ anni 73 fere perduxerat; crescente au-
 „ tumno vehementissima corripitur oph-
 „ thalmia, qua topicis magis quam in-
 „ ternis assumptis medicamentis curata
 „ sensim visus ipsi redditur acutior, ita
 „ ut

(2) Act. nat. cur. Vol. 2. Obs. 47.

„ ut senex iste, qui ultra 15 annos per-
 „ spicillis visui succurrere coactus fuit,
 „ jam per hos ipsos 11 menses oculis nul-
 „ lo modo armatis literas caractere
 „ etiam minore expressas, modo lumen
 „ solare aut lux artefacta ipsi sufficiat,
 „ absque ulla hæsitazione legere, et ut
 „ olim in annis juvenilibus prompte scri-
 „ bere valeat „. Fuit itaque tribus his
 ægris tanti habuisse ophthalmiam; at hu-
 jusmodi casus perquam sunt rari; infini-
 tiesque plura numerare est mala, quæ
 oculis ophthalmia consciscere solet, ea-
 que duplicis generis; videlicet aut quæ
 generationem graviolem quamvis inflamma-
 tionem consequi solent; aut quæ oculi
 ob fabricam sibi peculiarem facile inde
 contrahunt. Utrorumque breviter speci-
 mina hic dare seorsim juvabit.

§. 34.

A. *Communes inflammationis effectus*,
 nempe

I. *Suppuratio*, in quam non nisi che-
 mosis fere abit. Hac vero semel orta
 pus vel in cameris oculi vel inter bul-
 bum et adnatam colligitur: hinc

a) *Hypopion* efficitur (seu puris
 pone corneam in primis cameris colle-
 ctio), quod sæpissime oculum pessumdat,

dum coacervatum ac mora et calore acre factum erosio corneæ lamellis patulam humoribus oculi ad foras elabendum præbet viam, nisi mature resorptum e corpore eliminetur: quod C. H. ERNDTELIUS (a) cuidam prætoris cohortis equestris satelliti evenisse refert. Ita etiam narrat BÆUMLEIN apud A. E. BÜCHNERUM (b) mulierem ophthalmiæ inde a variolis obnoxiam; ubi in tenebris oculo in mariti cubitum impegisset, gravi continuo ophthalmia cum vehementi dolore fuisse affectam; cui cum collyrium acre ex vitriolo Cyprio adhibitum esset, aucta inde inflammatio hypopion invexit; quod nihil opitulantis Væ Sæ, catharticis, diaphoreticis, externis solventibus, visum prorsus perfundedit. Perinde P. SALMUTHI (c) tubicen dum navi veheretur, surgente vento commota arena oculos ejus obruit, graviterque læsit, gravius ille etiam eosdem dolentes fricando. Præscripsit nescio quis fotum calidissimum, qui aliquoties applicatus ophthalmiam cum febre aliisque gravissimis symptomatibus causavit:

(a) Warsav. physice illustrat. p. 235.

(b) Miscell. phys. med. math. A. 1729 Jun. Cl. 2. art. 4. p. 356.

(c) Observ. med. Cent. 3. Obs. 9.

unde utraque pupilla et toto oculo suppurato periit visus. Apud J. JANINUM (*d*) fabro ferrario vehemens lævi oculi chemosis cum magna cephalalgia, vomitu; vigiliisque naturæ relicta corneam cum visu destruxerat, superstite etiam tum uberi lacrymarum profluvio, et magna adnatæ inflammatione citra tumorem, iridequæ tota aeri patente vasisque ejus adeo turgidis, ut ruberrimæ carni esset similis. Pupillæ sua mansit cum figura tum diameter, sed immobilis erat: fibræ iridis et circulares et radiales multo clarius, quam in oculo bubulo, fuere conspicuæ. Diaphana corpora nil opacitatis ostendebant; fundusque oculi nigerrimus visebatur. Hocce in statu primum medicam opem poscenti ægro Auctor superstitem inflammationem prorsus discussit: quo facto lens ejusque capsula opacabantur, istaque uveæ adeo arcte accrevit, ut in continuitatem abiisse viderentur cum tanta firmitudine, ut palpebrarum affricui resisteret. Iris pristinum recepit colorem, at paulo obscuriorem, quam sano in oculo erat. Cornea haud amplius regenerata est. Bulbus ita

(*d*) Beobacht. über das Auge u. dessen Krankheiten p. 303. sq.

concidit, ut dimidium nativi sui voluminis amiserit. Haud secius P. FORESTI (e) „rusticus clava ictus visum perdidit, oculi ulcere superveniente; at cornea perrupta liquor oculi cum emanallet, a cœcitate curari non potuit. Ita etiam C. TRIOEN (f) „me (ait) „convenit . . . mulier, 4 circiter hebdomadam puerpera, petens examinationem infantis sui ophthalmia laborantes oculos: cui examini cum me accingerem, illa religationis paratum solveret; pusilli oculo excidit lens crystallina integerrime diaphana, in quam ob rei infrequentiam penitus inquisivi; vix enim mihi persuadere valebam, corneam . . . sine prævia suppuratione, læsione externa, casu; aut infortunio rupturæ obnoxiam, quam nihilo secius fissam experiebar; bulbumque oculi in orbita defossum. Quapropter sententiam rogatus casum lugubrem per se insanabilem ac de visu actum, nec pusillum ulla arte a cœcitate istius oculi adserendum renunciaavi. Apud F. PLATERUM (g) „vitriarius quidam

(e) l. c. Obs. 18.

(f) Observ. medic. chirurg. p. 98.

(g) Observ. medic. Lib. 1. p. 108.

„ cum peste laboraret A. 1564, inter a-
„ lia symptomata capitis dolore vehe-
„ menti atque ophthalmia afficiebatur,
„ quæ adeo invaluit, ut in tumorem o-
„ culo elevato suppuratoque crySTALLINUS
„ humor una cum aliis humoribus subito
„ ex oculo erumperet, et in barbam il-
„ lius flueret. Quod cum in uno oculo,
„ 10^o fere post primam pestis invasio-
„ nem die, factum esset, 14^o postea,
„ dum in agone mortis esset, ex altero
„ quoque eodem modo humores effluxe-
„ runt „. Eadem ratione elapsis ex o-
culo rupto humoribus cœgitatem in femi-
na quadam secutam vidit PARÆUS (b),
quod ipsum in F. J. HEIMREICHII (i)
etiam casu evenerat: „ femina (refert
„ ille) 40 circiter annos nata eo, quo
„ mensium fluxum patiebatur, tempore a
„ bove cornu suo pudenda ejus feriente,
„ et levem contusionem inferente, subi-
„ to perterrita mensium nullo per 8
„ hebdomadas indicio se se prodentium
„ suppressionem experiebatur. Horum
„ fluxum ut promoveret, quartam men-
„ suræ vini partem in ollam cupream in-
„ dit, et elapsis 24 horis illam epotat;

(b) L. 16. C. 13.

(i) Act. nat. cur. Vol. 2. Obs. 11.

„ quo facto menstrua nimium fluere in-
„ cipiunt, sed procedente tempore im-
„ minuuntur, et tam quantitatis et qua-
„ litatis quam temporis ratione vitium
„ ostendunt, et feminam valetudinariam
„ reddunt. Nam vitiosum sanguinis mo-
„ tum versus caput observat, et de va-
„ riis ex sanguinis accumulatione ortis
„ symptomatibus conqueritur: tandem
„ inflammationem oculi patitur, ad quam
„ depellendam balneator quidam cata-
„ plasma ex repellentibus et actu frigi-
„ dis paratum oculo imponi jubet. Fe-
„ mina morem gerit; statim vero dolo-
„ res exacerbatos, et paulo post majo-
„ rem oculi tumorem et ex orbita pro-
„ minentiam sentit, nihilo minus tamen
„ remedii applicationem; meliora spe-
„ rans, patienter continuat, donec præ-
„ terlapsis fere viginti et quatuor horis
„ cum maximo terrore doloribusque
„ gravissimis rupturam oculi cum frago-
„ re distincto et notabili expèritur, et
„ effluentibus statim humoribus aqueo
„ crystallino et vitreo, tunicisque dis-
„ ruptis concidentibus et versus caput
„ recedentibus, visu plene privatur „
Sic quoque suppuratio oculum visum-
que pessumdedit in alio JANINI (k)

(k) Vide §. 83.

ægro, infante BARTHOLINI (l), puero FORESTI (m), FÜRSTENAUII (n) futuro, HOFFMANNI juvene (o), milite (p), viroque (q), SAINT-YVESII que (r) matrona; SCHMUCKERUS (s) autem non sine magnis conatibus effecit, ne hypopion in puella, cui medicinam fecit, eundem exitum sortiretur.

b) *Abscessus* adnatæ, pure sub ipsa in cellulosa collecto. Minus ab hocce statu imminet oculo discriminis; nam vel sponte rupto extrorsum abicellu vel incisione facta educto pure, adhibitisque idoneis remediis oculi integritati consulitur, velut in FORESTI (t) femina et adolescente SIBBERNII (u) eventus docuit. Juvat hic disparem duplicis ophthalmiæ in suppurationem versæ exitum ex Annalibus Vratislaviensium (x) addu-

(l) Vide §. 17.

(m) l. c. schol. ad obs. 5.

(n) Vide §. 16.

(o) Vide §. 17.

(p) Vide §. 22 No 4.

(q) Vide histor. 11.

(r) Vide §. 22 No 5.

(s) Vide §. 54.

(t) Vide histor. 5.

(u) Vide histor. 17.

(x) Tent. 11. A. 1720 Mart. cl. 4. art. 6.
§. 1. p. 326. sq.

cere, nempe vespere diei 23 Martii 1720 mulier cum puella annicula itineri se dat; obortus autem vehementissimus venti turbo ita eam prolemque male excepit, ut mater primum non multo post, quam se in pagum vicinum recepit, ingentem vertiginem pateretur, postridieque domum redux immanem syncipitis oculorumque dolorem punctorium et ardorem eorundem sentiret. Octiduo post proles quoque ex eodem malo laborare cœpit; et cum ambæ hæ ægræ omnem rei eventum naturæ commisissent, accidit, ut post aliquot dies oculi puellæ pus interius collegerint: unde pupilla dextra eorugata profundius retrocesserat; lævus autem oculus turbidus pureque inflatus extrorsum protuberavit, amboque ita oculi visu privati. Mater contra decedente sensim ophthalmia pristinam recuperavit visus aciem. Interdum vero tanta puris spissi inter bulbum ac palpebras tumore clausas copia intercedit, ut omnem bulbum conspicuum obtegendum inspicientis visui subducatur, puteturque totum orbitæ cavum pure esse refertum; donec illo educto bulbus illæsus rursus in apicum emergat. Duos insignes hujus rei casus Anonymus qui-

dam (y) literis mandavit, unum pro miraculo venditatum, alterum ab se visum. Utrumque, ut exstat, huc traducam.

„ Infans 3 annorum et aliquot mensium
„ visum perdiderat inde a 6 septimanis
„ ab inflammatione oculorum, eos omnino
„ non claudente, et per complures dies
„ multum materiæ et puris ab iisdem
„ expellente, ita ut inde crusta facta
„ non solum oculos verum quoque integram
„ faciem infantis obduceret.

„ Tandem crusta illa purulenta decidit
„ quidem, sed oculi tamen manebant
„ prorsus clausi et ita in orbitam oculorum
„ retracti, ut vix ac ne vix quidem
„ tarsi ciliis muniti in conspectum
„ venirent, atque cum mater . . . interdum
„ palpebras erigeret et diduceret, loco
„ oculorum nihil amplius quam aliquid
„ albi coloris in conspectu erat, ita ut
„ oculos periisse firmiter ipsi persuasum
„ fieret. Mater . . . opem pharmaco-
„ pœorum quorundam imploravit, quorum
„ unus emplastrum ipsi dedit, quod etiam,
„ irritum tamen adhibuit effectum. Svasu
„ dein matronæ cujusdam Patrem quemdam
„ Oratorii

(y) *Commerc. Nor.* T. 5. A. 1735 hebdomada 14.
p. 110. sq.

„ CELORON dictum adiit, eumque, ut
„ oculis infantis sui purificatorium ap-
„ plicaret, rogavit. Pater ille petitis
„ annuens, precibus sat longis ad DE-
„ UM missis, et reliquiis et purificatorio
„ et corporali . . . tribus distinctos vi-
„ cibus oculos infantis male affectos ap-
„ plicuit. Neque ita multo post audita,
„ ut Pater præceperat, missa, mater in-
„ fantem domum reportans, aliisque ne-
„ gotiis postea vacans, vocatur, nuncio-
„ que illo læto infantem optime videre
„ exhilaratur. Hæc jam historia licet
„ miraculi speciem aliquam præ se ferat,
„ tantum tamen abest, ut Auctori (illi
„ anonymo) miraculosa videatur, ut po-
„ tius dicat simili prorsus exemplo se
„ evincere posse, quod non obstante
„ morbi violentia et gravissimis jacturæ
„ indiciis oculorum tamen corpora suam
„ servare integritatem non solum que-
„ ant, verum etiam in similibus casibus
„ nunquam non soleant. Observavit au-
„ tem . . . in puello bimulo omnem o-
„ culorum figuram, qualis clausis palpe-
„ ris superesse solet, harum partium
„ satis magno, non tamen transparente,
„ tumore periisse, et simul hæc oculo-
„ rum opercula marginibus introactis,
„ inibique ob adhæSIONem in angulis
„ suis firmiter detentis, ita fuisse redu-

„ plicata , ut de tarso ciliisque nullibi
„ quidquam in conspectum veniret, ne-
„ que oculi citra summam et haud fe-
„ rendam violentiam aperiri possent, præ-
„ fertim cum hic palpebrarum coalitus
„ satis densa crusta ex pure resiccato ob-
„ ductus atque munitus esset. Retule-
„ rat præter hæc mater, malum pede-
„ tentim ex inflammatione non admo-
„ dum notabili ortum incrementaque
„ sumpsisse, interdum autem et per vices
„ magnam copiam materiæ fluidæ flavæ
„ ex angulis oculorum majoribus impetu
„ quodam profilire. Hinc ergo ut ob-
„ viam iretur morbo, interne pulvilli
„ diapnoici et laxantes leniores, externe
„ autem sacculi discutientes, resolventes,
„ et nervini, primum sicci, deinde vi-
„ no incocti et calide applicati, in usum
„ vocabantur. Horum remediorum usu
„ continuato id effectum est, ut tandem
„ pure jugiter adhuc erumpente palpe-
„ bræ tantisper detumuerint, ita ut iis
„ diductis patefceret ad margines illa-
„ rum aditus, simul vero firmissima ci-
„ liorum conglutinatio in conspectum
„ veniret. His tandem etiam ab invicem
„ separatis palpebræ quoque diduci pote-
„ rant, ast non sine copioso puris meri
„ effluxu, adeo ut per 6 ad minimum
„ dies non alia facies rerum post oculo-

„ rum aperturam esset, ac si conchulam
„ humore purulento plenam conspiceres.
„ In tali rerum statu actum de oculis
„ esse A. credebat, præsertim cum ca-
„ vitas præter solitum profunda nullo
„ globoso oculi corpore ad sensum re-
„ pleta, et in fundo plane alba com-
„ pareret. Sed postquam demum præ-
„ eunte ANTONIO collyrium mundifi-
„ cans et abstergens aliquot granis vitrio-
„ li ♂lis acutum oculis instillaretur,
„ factum est, ut opacus corneæ circu-
„ lus se se rursus aliquantisper conspici-
„ endum dederit, sic ut redeunte quo-
„ que motu palpebrarum mox pristina
„ oculorum sanitate puellus gauderet „
His vero binis suppurationis modis non
immerito etiam addi potest

c) *Ulcératio tarsorum*, quam aut
lacrymarum acrimonia erodens (z), aut
pus adaptæ iis applicatum, aut denique
propria palpebrarum ac MEIBOMII
glandularum inflammatio in chemosi in
suppurationem abiens, causat, quamque
L. HEISTERUS (a) in quadrimulo puero
observavit. Hæc vel ex eo prætervidenda
non est, quod alii malo, nempe anchy-

(z) Vide §. 31 No 4. 1

(a) l. c. I. Band No 656.

loblepharosi veræ (b) occasionem præbeat, ni tempestive ei obvietur. Denique

d) *Ulceræ corneæ* huc referenda sunt, quæ perinde vel acres lacrymæ corneam alluentes ac diutius eidem, dum oculi clausi sunt; applicatæ inducunt, velut in DÉMOURSII (c) matrona; vel pus adnatæ illam erodens, vel propria corneæ lamellarum inflammatio in supurationem verâ, efficit, ut in puero, cujus FORDYCE (d) meminit, ac FORESTI (e) femina, nec non fabro JANINI (f) est observatum; vel denique hypopion post se trahit, ut superius (g) dictum est.

2. *Scirrhus, cancer.* „ Sic antè aliquot „ annos miseram vidimus servam, ait D. W. „ TRILLERUS (b), cui oculorum inflammatione vehementissima laboranti „ a temerario nimis chirurgo . . . frigida collyria et adstringentia epithemata crebro applicata fuerant : unde

(b) Vide §. 35 No 4.

(c) l. c.

(d) Vide §. 48. No 3.

(e) Vide histor. 5.

(f) Vide præced. a) et histor. 12.

(g) Vide præced. a).

(h) Opusc. medic. Vol. I. Part. I. Diss. 5. §. 5. p. 139.

„ ipse oculi bulbus . . . in lapideum
 „ quasi scirrhum adeo usque induruerat;
 „ ut ipse oculus pugno fere major ad
 „ horrorem formidinemque visentium
 „ rigidus atque immobilis per plura si-
 „ mul loca fœdissime fissus exstaret.
 „ Quo denique factum, ut ipse nervus
 „ opticus una cum ipso cerebro adeo
 „ affligeretur, ut insultus epileptici et
 „ atrocissimæ capitis collique conquassa-
 „ tiones; artuumque tremores, et diræ
 „ tandem totius corporis contorsiones
 „ nullis prorsus remediis superabiles sub-
 „ sequerentur, donec demum miserrima
 „ illa famula inter terribiles clamores ac
 „ furores animam tot malis sævis fessam
 „ laboriose exprimeret,;

3. *Gangrana* vero utrum unquam in-
 flammationem oculi consequatur, dicere
 haud ausim; quandoquidem nullo id
 exemplo probare mihi sit integrum. Mi-
 rum tamen profecto phænomenon, et
 cujus ratio haud ita in promptu est.

§. 35.

B. *Proprii* autem *ophthalmicæ effectus* e-
 peculiari oculi fabrica propullulant; cu-
 jusmodi sunt vitia cornæ, albuginæ,
 palpebrarum, iridis, humorum, retinæ
 ac nervi optici: hinc

1. *Leucomata*, queis inde affecti erant GOHLII (i) judæus, ejusdemque (k) ac HEISTERI (l) puella, studiosus (m) item, et ejusdem (n) ac GRIGNONI (o) puer, GOULARDI (p) infans; rusticus J. L. ODHELII (q), centurio PLATERI (r); ac TILLINGII (s) adolescens.

2. *Pterygia* (qua ungues, qua panni), ut in viro DELII (t) et ESCHENBACHII (u) matrona; et quæ observantur O. ACREL (x) in ancilla, J. D. GOHLIUS in viro (y), puella (z), pistore (a), duabusque feminis (b);

(i) Vide §. 42 No 2.

(k) Vide §. 22 No 6.

(l) l. c. I Band No 509.

(m) Ibidem No 355.

(n) Ibidem No 671.

(o) Vide §. 18.

(p) Vide §. 72 I. D. No 8.

(q) Act. Svec. Vol. 29. Trimestr. 2. art. 7. p. m. 153.

(r) Vide §. 65 No 2. b).

(s) Vide §. 72 I. A. No 2.

(t) Vide §. 72 I. B. No 1.

(u) Vide §. 37 No 5.

(x) Chirurg. Vorf. l'e I Band 21 Fal No 1 p. 97.

(y) Vide §. 72 I. B. No 1.

(z) Vide §. 22. No 6.

(a) l. c. Dec. I. Vol. 7. Sect. 1. p. 53.

(b) Ibidem p. 54. & Vide §. 22 No 2.

HEISTERUS in sutore (c) ac binis centurionibus (d), et in puerpera SALCHOV (e); &c.

3. *Polytænæ*, *perlæ*, *carbunculi*. „ Pustulæ quoque ex inflammationibus „ interdum oriuntur . . . solent etiam „ carbunculi ex inflammatione nasci, „ non nunquam in ipsis oculis, non nunquam in palpebris „ notante A. C. CELSO (f); cujusmodi vitia corneæ BARTHOLINI (g) civis, mercator MERCLINI (h), puerque Medicorum Silesiacorum (i); ex ophthalmia retulerunt.

4. *Anchyloblepharosis* vera; seu palpebrarum in tarsis concretio; quæ eorundem ulcerationem (k) consequitur. Binos illius casus insignes describit O. ACREL (l), tertium C. F. KALTSCHMIED (m) in „ pu-
„ ere

(c) l. c. No 203.

(d) Ibidem 2 Band No 23. 263.

(e) Vide §. 72 l. D. No 8.

(f) De medicina L. 6. C. 6. art. 10 & 11.

(g) Vide §. 17.

(h) Vide §. 65 No 3. c).

(i) Vide §. 55. No 5.

(k) Vide præced. A. No 11. c).

(l) l. c. 17 Fall No 1. 2. p. 84. fqq.

(m) Diss. de pueri 12 annor. anchylobleph. laborante curato. 4. Jenæ 1764. Resp. G. G. G. BARCHWITZ.

„ ero 12 annorum , (cui) ab alio per . . .
 „ petulantiam portio pulveris calcis vi-
 „ væ in oculum sinistrum conjicitur , ut
 „ doloribus ac inflammatione cum febre
 „ obortis vitæ periculum subiret. Mul-
 „ to tamen labore febre , doloribus ac
 „ ophthalmia fugatis palpebræ oculi non
 „ solum ita coaluerunt , ut vix interior
 „ oculi angulus quodammodo apertus
 „ lacrymis exitum concederet , sed et
 „ tunica cornea palpebræ superiori fir-
 „ missime jungeretur „. Post $\frac{1}{2}$ annum
 consultus Cl. Auctor eum operatione fa-
 cta perlanavit.

5. *Iridis fissura , staphyloma.* M. E.
 BLOCH (n) post contumacem , superatam
 tamen , ophthalmiam in iride vidit fissu-
 ram superstitem , quin visui prorsus re-
 cuperto vel hilum officeret. Staphy-
 loma vero iridis ex chemosi fabro JA-
 NINI (o) accidit. Corneæ quoque sta-
 phylomata in juniore ætate interdum post
 chemoses generantur. J. L. SCHMUCKE-
 RUS (p) operationem hujus mali insti-
 tuit in Regii cujusdam servi filia , quæ
 14^o vitæ die vehementem chemosin cum

(n) Medic. Bemerkungen No 1. p. 54

(o) Vide histor. 12.

(p) l. c. I Th. p. 496.

magna suppuratione nacta est. Abhinc staphyloma corneæ coeptum intra 18 annos tantopere increvit, ut illa ultra pollicem coni instar ex omni sua superficie assurgens in apicem extra palpebras prominere:

6. *Cataracta*, quam ex ophthalmia BARTHOLINI (q) CIVIS, BOEHMERI (r) mulier, matrona ESCHENBACHII (s), ac JANINI (t) faber, nec non lapicida LANZONI (u), nacti sunt.

7. *Amblyopia, amaurosis*. „Caligare „ . . . oculi; inquit CELSUS (x), „ non nunquam ex lippitudine . . . con- „ sveverunt „ Sane JANINI (y) anginoso diu post ophthalmiam ingens amblyopia superfuit. Amauroseos vero inde obortæ exempla in historia amauroseos a me data (z) videre est.

§. 36.

III. LETALIS nē unquam ophthalmia?
Sunt, qui nihil ab ophthalmia ex se dif-

(q) Vide §. 17.

(r) Vide §. 37 No 2. a).

(s) Ibidem No 5.

(t) Vide §. 34 No 1. a).

(u) Vide §. 22 No 4.

(x) l. c. art. 32.

(y) Vide §. 55 B. No 8.

(z) Part. 1. §. 44. p. 259. fqq.

criminis vitæ impendere affirment; nisi illa sit gravioris cujusdam ægritudinis, præsertim encephalum obtinentis (v. g. phrenitidis, &c.), symptoma admodum ominosum: atque tunc ut signum, non ut causa; mortis habenda est. Alioquin vero cum nunquam in gangrænam visâ sit abiisse (a); suppûratiô autem etsi oculum sæpe destruat, cum puri exitus continuo patescat; non facile vitæ insidias struit. Neque febris hic, ut ut vehemens, mortem minatur, cum in suppurationem ut plurimum tendere soleat. Interea tamen duos jam letalis ophthalmiæ casus vidimus hæctenus, unum in BERGENII (b) judæo; alterum in TRILLERI (c) serva: nisi forte quis judæo ophthalmiam fuisse symptomaticam contenderit, in serva vero mortem non tam inflammationi quam immani potius scirrho oculi tribuendam esse velit; at scirrhus hic exitialis ophthalmiæ utique prægressæ debet: batür:

(a) Vide §. 34 No 3.

(b) Vide §. 15.

(c) Vide §. 34 No 2.

§. 37.

IV. solvit *ophthalmiam* vel resolutio benigna, vel crisis, vel metastasis, febrisve superveniens, aut ipsa temporis diuturnitas.

1. *Resolutio* benigna sola pene in taraxi locum habere potest, in qua et humor blandus, et motus non usque adeo exorbitans, et impactus non nimius, &c. obtinent.

2. *Crisis* vero in qualibet ophthalmia evenire potest, eaque pro rerum adjunctis varia, ut est

a) *Hæmorrhagia* quæcunque. Sic Julio 1723 Erfurti obtinentes cephalalgias, ophthalmias, odontalgias, otalgiasque ut plurimum vel sudores blandi vel hæmorrhagiæ narium solvebant teste A. E. BÜCHNERO (*d*). Menses quoque, si aut substituerant, aut non dum eruperant, indeque ophthalmiam invexere, supervenientes illam solvere sunt observati. LACHENAL (*e*) meminit feminæ 26 annorum, quæ a continuis teneræ ætatis defluxionibus ad oculos pubertatis

(*d*) Annal. Vratisl. Tentáin. 25 A. 1723 Cl. 2. art. 3. §. 2. p. 37.

(*e*) Gazette salut, A. 1761 No 10 p. 39.

tempore catameniis obortis immunis evasit. Insignem hujus commatis casum refert J. JANIN (*f*) de puella a biennio ex obstructis menstruis ophthalmiam passa non mediocrem cum lucis impatientia et leucomate totam fere corneam tegente visumque relinquente exiguum. Cum frustra haecenus alii artis periti revocandis catameniis impendissent operam, JANINUS admotis ad vulvæ labia hirudinibus ea intra 24 horas prolicuit. Ab hoc vero momento ophthalmia cum leucomate tam celeriter decrevit, ut intra quatrimum citra ulla alia usurpata remedia oculi pristinum recuperarint statum, mensibusque inde rite semper procedentibus puella optime valuerit. Similem quoque observationem J. SAUNDER (*g*) suppeditat, nempe nobilis femina 17 annorum a subsistentibus catameniis incidit in anorexiam, langvorem ac vehementem oculi sinistri ophthalmiam, quæ cum ab æstate ad usque Decembrem neglecta fuisset, dextrum quoque oculum rubore infecit; querebaturque tum ægra de dys-

(*f*) 1 c. p. 307.

(*g*) Medic. Commentar. von Edinburgh 3 Th. 4 Stück 2 Abschn. 1 Art. 12 Fall. p. 440, sqq.

pnœa, anxietate, magnoque amborum oculorum dolore punctorio, languebat admodum, ac præter tumorem digiti glandulas quoque non nullas gestabat induratas. Dextri oculi ophthalmia Væ Se ac vesicante brevi discussa est; at finifter nec aperiri poterat, nec lucem ferebat. Itaque per hyemem usa est cortice, bibit lac asininum, fonticulumque in brachio gestavit, et oculo topica adhibebantur. Nihilò tamen fecius periodicæ exacerbationes abunde docebant, morbum suppressis mensibus deberi, quas matura semper deinceps Væ S^o prævertebat; interea sub continuata eadem medendi methodo ægra viribus habituque corporis profecit; sed cum in tabem pronum esse corpus hyems ac ver edocuisset, sanguisque ejus tanta gauderet diathisi phlogistica, ut ægræ carniū esu potuque fermentatorum liquidorum prorsus fuerit interdicendum, non abs re diffidebatur emmenagogis ♂libus aliisque stimulantibus; quorum loco proinde aptior futura censebatur electricitas. Sepositis itaque tota prius hebdomade remediis, mense inde Martio ad machinam electricam ducta est, quæ triduo adhibita ophthalmiam manifeste emendavit, et 4^o mox die sub ipso electricitatis usu catamenia reversa sunt; quorum cum ni-

mius fluxus ab electricitate metuendus
 haud videretur, isthæc in dies adhibita
 est. Catamenia rite fluebant, ophthal-
 mia plane disparuit, oculus lucis evasit
 patiens sanique similis, præter quamdam
 corneæ opacitatem, quæ vero quotidie
 etiam emendabatur. Quois omnibus e
 voto consecutis ægrota in hebdomadem
 adhuc electricitati vacavit. Non multum
 ab hac observatione discrepat, quod P.
 A. BOEHMERUS (b) refert: „ uxor
 „ saponarii annorum 36, felix mater 4
 „ filiorum, temperamenti sanguineo-me-
 „ lancholici, in 4^o puerperio A. 1742
 „ incipientem in dextro latere, et per
 „ intervalla redeuntem fixum dolorem
 „ cum successivo abdominis augmento
 „ pondereque raro molesto et gravati-
 „ vo sentiebat, posteaquam imperita ob-
 „ stetrix violentam placentæ præternatu-
 „ raliter ipsius utero adhærentis extra-
 „ ctionem frustatim peragere conaretur.
 „ Fluxus lochialis ex parte suppressus,
 „ nullisque accedente febre lochiali,
 „ qua per aliquot septimanas laboravit,
 „ abstergentibus uterinis legitime pro-
 „ motus fuit. Factum inde, ut aliquot
 „ post ablactationis negotium annis pro-

(b) Act. nat. cur. Vol. 9. append. No 3. p.
 61. sq.

„ pter mensium obstructionem , negle-
„ ctas artificiales , impeditasque natura-
„ les excretiones spasmodicis inferiorum par-
„ tium , quæ malum hystericum comita-
„ bantur , agitata , humoribusque ad ca-
„ put translatis , et in adnata utriusque
„ oculi stagnantibus , ophthalmia vera
„ excitata fuerit , quæ ob neglectam cu-
„ rationem ansam præbuit suffusioni mi-
„ tiori et immaturæ , vitio nempe , quo
„ pupillæ amisso naturali transparente
„ colore cinereum contrahere et ex par-
„ te visum impedire videbantur. Ac-
„ cessit ad me , meum sibi expetens au-
„ xilium . . . Itaque repetitis aliquoties
„ largis in pede V. S. interpositis laxan-
„ tibus ☿libus , adhibitisque remediis
„ solventibus , diluentibus , temperan-
„ tibus , nec non instituta periodica cu-
„ ratione , singulis scilicet mensibus de-
„ crescente luna per 6 dies usum abster-
„ gentium uterinorum continuando , ex-
„ terne autem oculis impositis collyriis ,
„ discutientibusque speciebus , effeci , ut
„ fluxus menstruus rediret , et discussa
„ oculorum inflammatione incipiens ca-
„ taracta sensim sensimque imminueretur ,
„ remanente tantum aliqua visus imbe-
„ cillitate . . . Reliqua deinceps conse-
„ cuta neutiquam huius loci sunt. Hisce
vero paulo minus secundus est casus ,

quem J. M. WOLFFIUS (*i*) ad posteros dedit: „ virgo quædam 22 annorum, „ temperamenti sanguineo-cholericæ, gracilioris corporis constitutionis, circa „ 14^{um} ætatis suæ annum ophthalmia humida in utroque oculo corripiebatur. „ Postea quolibet fere mense per aliquot dies in capite aliquo affectu, et quidem aut otalgia aut odontalgia aut cephalalgia aut erysipelate faciei aut ophthalmia laborabat; quæ vero pathemata cum 19^o ætatis anno fluxus menstruus prima vice erumperet, et typum legitimo modo per 2 annos fervaret, cessarunt quidem, sed etiam recurrerunt, cum 21^o anno mense Aprili menstrui fluxus obstructionem eadem pateretur. Quoties enim purgatio menstrua recurrere debuit, toties unus vel alter ex antea adductis affectibus rediit. Tandem mense Octobri ophthalmia acris oculum dextrum occupavit, et brevi tempore ita exacerbata fuit, ut humores oculi turbarentur, cornea tunica corrumperetur, et visus plane periret. Temerarius quidam . . . chirurgus cataplasma calidum, ex variis herbis cum vino coctis paratum, oculo imposuit, adeo

(*i*) Ibidem Vol. 7, obs. 130.

„ sinistro vero cum effectu , ut statim
„ dolor et inflammatio in morboſo oculo
„ incrementum majus ſumeret, et alter
„ quoque oculus ſiniſter omnibus nume-
„ ris ſanus rubore et dolore pariter affi-
„ ceretur. Nihilominus et huic oculo
„ admovit chirurgus idem illud cataplaſ-
„ ma , et interne exhibuit TR^{am} quam-
„ dam ſudoriferam, itemque pilulas Fran-
„ cofurtenſes, quibus omnia in pejorem
„ ſtatum mutavit. Ad alia hinc confu-
„ giebat remedia, inungebat oculo un-
„ guentum quoddam, nuchæ multa veſi-
„ catoria applicabat, bis venam pedis
„ ſecabat, fonticulum in brachio dextro
„ excitabat, dentes aliquot evellebat,
„ oculo varia cataplaſmata et epithema-
„ ta admovebat; interne vero decocta
„ aliaque ſanguinem exagitantia medica-
„ menta adhibebat; quæ omnia tamen
„ plus damni quam levaminis adferebant.
„ Dexter enim oculus maſſit deſtructus,
„ et ſiniſter quotidie ad deſtructionem
„ magis magisque inclinare deprehende-
„ batur. Chirurgus hæc conſiderans ad
„ . . . eſſentiam . . . quamdam emme-
„ nagogam confugiebat, cujus uſu intra
„ 48 horarum ſpatium fluxum menſtru-
„ um . . . in ordinem ſe redacturum
„ pollicitus fuit, . . . quo guttatim aſ-
„ ſumpto ægrota tantis doloribus capitis
„ et in primis oculorum affligebatur,

„ ut iisdem ferendis vix par esset. At-
„ tamen chirurgus optima quæque spon-
„ dens ægrotæ persuasit, ut 2^a 3^a et
„ 4^a vice essentia istius usum repeteret,
„ ut ut semper doloribus acerbissimis,
„ ebullitione sanguinis, aliisque malis
„ toties excruciaetur, quoties illam as-
„ sumperit. Emanavit vero salutaris ille
„ menstruus fluxus, et loco speratæ hu-
„ jus excretionis in oculo sinistro antea
„ bene constituto visus quotidie immi-
„ nuebatur, et tandem essentia ultima
„ vice adhibita, quod 10^a septimana ab-
„ incepta chirurgi curatione eveniebat,
„ prorsus ille peribat. In his ergo an-
„ gustiis constituta ægrotæ meum tandem
„ implorabat auxilium, mihi que osten-
„ debat oculos valde inflammatos, tu-
„ midos, largo simul stillicidio humoris
„ acris, turbatione humorum, et ruptu-
„ ra corneæ afflicto. In sinistri oculi
„ cornea versus angulum majorem tumor
„ apparuit instar pisi. Ex quibus mani-
„ feste apparebat, cœcitatem oculi dex-
„ tri ex obstructione mensium, oculi
„ vero sinistri partim ex illa partim ex
„ chirurgi perversa curatione inductam
„ fuisse. Cum vero structura oculorum
„ nimium quantum jam corrupta mihi vide-
„ retur, . . . de visus recuperatione plane
„ dubitavi. Interim tamen fluxum cata-

„ meniorum, quam primum illud fieri
„ pollet, in ordinem redigendum esse
„ duxi: quem in finem decoctum emme-
„ nagogum, pilulas ad instar BECHERIA-
„ NARUM paratas, et pulverem ex sacch.
„ Canar. cort. Cinnamom. et æthiope mi-
„ nerali, præscripsi, simulque pediluvio-
„ rum usum frequentissimum commen-
„ davi. Quibus remediis adhibitis 12^o
„ die catamenia prodibant, et per 3 die-
„ rum spatium continuabant, infimulque
„ (quod notatu omnino dignum est)
„ omnes dolores capitis aurium oculo-
„ rumque sub usu horum remediorum
„ evanescebant. Licet autem virgo hæc
„ postea singulis vicibus sub continuato
„ usu horum remediorum debito tem-
„ pore fluxum menstruum redire obser-
„ varet, toties tamen oculi inflamma-
„ bantur paululum, quoties appropin-
„ quabat ordinarius hujus excretionis
„ terminus, sub cujus dein succellu in-
„ flammatio una cum dolore et tumore
„ facile iterum evanescebat. Quoniam
„ vero humores turbidi manebant, et
„ ægrota vix lucem a tenebris distingue-
„ re valebat, tandem ad mercurialem sa-
„ livationem confugiendum esse statui,
„ revocans in memoriam observationes.
„ . . . F. HOFFMANNI in variis ejus-
„ dem scriptis adnotatas. Elegi autem

„ tutissimam æque ac jucundissimam methodum salivandi Excell. D. D. TREW(k) descriptam; qua quidem humores oculorum magis pellucidi reddebantur, visus vero restitui nequaquam potuit: ut hinc virgo ista cæca miserrimam vitam adhuc ducat,,. Propria autem huicce morbo solvendo accidere solet hæmorrhagia ex oculorum canthis scaturiens, cujusmodi exemplum prostat in Annalib. Vratislaviensium (l) de puero 14 annorum, hæmorrhagiæ narium alias obnoxio, cui ophthalmia insignis oborta post fluxum sanguinis sinceri e cantho oculi dextri consecutum citra alia remedia conquievit. Ejusdemmodi quoque casum observavit BOENNEKEN (m) senior, videlicet puellus 30 hebdomadam correptus est ophthalmia serosa cum inquieto somno pavoribusque nocturnis. Dentitionem in causa esse consveta ejus indicia liquido docebant, præsertim quod non multo ante duo primores inferioris maxillæ dentes incisorii emerferint, in

(k) Commere. Nor. T. 1. A. 1731 specim. 52.
p. 410.

(l) Tent. 27. A. 1724 Febr. Cl. 2. art. 3. §. 1.
p. 152.

(m) Fränk. Samml. 3 Band 16 St. 3 Bemerk.
p. 319.

præsenti gingivis maxillæ superioris, ubi dentes canini siti esse solent, plus quam alibi elevatis crassioribusque apparentibus: ut proinde hos ipsos dentes moliendo exitum symptomatum dictorum esse causam pateret. Accidit interea, ut 12^a noctis hora infanti ex utroque cantho majore fluidus coccineusque sanguis inopinato erumpens in genas deflueret, fluxumque vagitus puelli augeret; qui, ubi ad chochlear j sanguinis dedisset, sua iterum sponte desit. Abhinc vero infans alacrior hilariorque factus, ophthalmia, æstu, inquiete, ceterisque symptomatibus in dies magis decrefcentibus, habitum ac vires recuperavit. Huc etiam referendus est ARNOLDI (n) casus.

b.) *Sudor*, si ophthalmiam immixta perspiratio, sudorve suppressus causaverat, quod ab humido frigore certis anni temporibus præ primis contingit (o): atque tum obortus blandus sudor morbum solvit, ut paulo ante (p) ex BÜCHNERO vidimus. Hinc pediluvia (q) tantopere hic sæpe profunt.

(n) Vide §. 41 No 2.

(o) Vide §. 22 No 1.

(p) Vide præced. a).

(q) Vide §. 59 No 2:

c) *Alvi fluxus*; nam HIPPOCRATE (r) notante „lippitudine laboranti „alvi profluvio detineri bonum„. Perinde Vratislavienses (s) „id creberri- „ma nos (ajunt) docuit experientia „alvi profluvium sive sponte natura motum sive phar- „macis excitatum ophthalmicis esse admodum utile „.

3. *Metastasis* denique haud secius ac ipsæ crises ophthalmiam solvere quidem allolet, at non pari ubique eventu; nam cum alias materia morbi ad ignobiliora ab oculis loca minori nullove cum discrimine deponatur; aliquando natura velut sui oblita eam in nobiliores impingit partes non sine majore vel periculo vel molestia: ut proinde id genus metastasis bona interdum sit; interdum mala.

ä) *Mala* utique fuit in viro V. RIÉDLINI (t) hypochondriaco, non dum 30 annos nato, temperamenti melancholici, qui cum a nimia lucubratione contractam ophthalmiam fotu ex aqua rosarum cum tutia in pulvem redacta parato, sæpiusque ad oculum affectum applicato, brevi discessisset, in gravem

(r) De judicationib. p. m. 56.

(s) Hist. morb. Vratisl. A. 1701. p. m. 237.

(t) Lin. med. ann. 5. Febr. 12 p. 147.

incidit cephalalgiam, ophthalmia molestiorem, quam demum febris quoque continua, non sine periculo decurrens, est consecuta. Neque melius cessit res mulieri apud A. E. BÜCHNERUM (u), quæ ophthalmiæ ope ∇ camphorati naribus attracti profligatæ loco vehementem clavam hystericum nacta est, a quo demum usus Ω us bezoard. BUSSII cum liqv. anod. miner. et lac saccharatum calidum naribus attractum, eam vindicarunt. Perinde Consulis Freyenwaldensis uxor, J. D. GOHLIO (x) narrante „ex humida totius
 „ corporis, et hoc satis profunde ad cutim usque, perfrigeratione contraxerat
 „ febrim rheumatico - catarrhalem, cui
 „ supervenit sinistri oculi ophthalmia
 „ (uti credebatur). Pharmacopæus loci
 „ consultus varia dat, et tentat in cassum,
 „ donec se meæ offert inspectioni et
 „ curæ. Offendo oculum turgidum et
 „ rubentem, sed non pro more veræ ophthalmiæ in adnata suffulum, nec per
 „ noctes agglutinatum, interim ad lucem
 „ admodum sensibilem, limpidamque a-
 „ quam copiose plorantem. Per inter-
 „ „ venientem

(u) Miscellan. phys. med. math. Ann. 1729.
 April. cl. 2. art. 2. p. 235.

(x) l. c. Dec. 2. Vol. 6. Sect. 1. No 5. p. 25.

„ venientem non spontaneam sed casu
„ concitatum diarrhœam solvebatur.
„ Brevi post prævio horrore more ery-
„ sipelatum invadit ipsam dolor in jun-
„ ctura coxæ dextræ ambulans per genu ad
„ tarsum; quo credo per diaphoretica dissi-
„ pato (pharmacopœum enim iterum
„ consuluerat) occupat dolor iterum
„ oculum cum omnibus pristinis sympto-
„ matibus : inde denuo discussus redit
„ ad artus , quos ante occupaverat.
„ Urserat patiens jam tempestive , ut
„ balnea concederem ; quæ tum non dum
„ quadrabant : urgebat nunc iterum , ubi
„ dolores deferuisse putabat per depo-
„ sitionem materiæ in tumorem ad tarsum
„ dextri pedis. Permittebam itaque in-
„ sessum , quo unica saltem vice admissio
„ dolor transibat ad latus sinistrum. Ni-
„ hilo minus cum observaret dolorum in-
„ vasionem cum horrore et pulsatione
„ in articulis obsessis per dies alternare,
„ continuat proprio motu insessum alter-
„ nis melioribus diebus, sed cum exacer-
„ batione dolorum in articulis, ut meo
„ denuo consilio suspensis balneis deco-
„ ctum BEHRENSII . . . cum aliquo
„ regime diætæque observatione per
„ 15 forte dies potare debuerit. Inter
„ potandum observavit adhuc alternis
„ diebus aliquem horridulæ auræ alla-

„ psum etiam medios inter sudores, et
„ ubi per admittam refrigerationem su-
„ dor interpolabatur, respiratio erat op-
„ pressa, totumque sternum ad clavicu-
„ lam usque rigidus obsidebat spasmus
„ . . . qui se prodebat sub schemate
„ purpuræ albæ miliaris, qua non sine
„ intervenientibus ataxiis superata red-
„ iit ad balnea reliquias morbidas ple-
„ nius elicientia, et nunc maxime salu-
„ taria,,. Haud secius G. HORSTII (y)
Comes 21 annos natus post autumnalem
dysenteriam variis remediis profligatam
in gravissimam incidit ophthalmiam ad-
modum dolorificam, quæ licet vesicatoriis
ad nucham, et collyriis ex succino ppt.
marg. ppt. cum pauxillo croci in aqua
euphrasie, sceniculi et rosarum dissolutis
tandem corrigeretur; tamen ob neglectam
recidivæ dysentericæ metu catharsin ma-
teria non evacuata alio commigravit, ac
primum vagus brachii dolor obortus non
multo post hinc in genu defluxit, tumo-
remque ibi arthritico similem generavit,
qui pure collecto fluctuans causticoque
apertus dolore mox conquiescente mul-
tum in dies puris præbuit, sanatusque
deinceps duritiem quamdam vicinorum

tendinum post se reliquit; quam tamen
fotus decocto pedum vitulinorum cum
herbis emollientibus ac roborantibus etiam
brevi post abolevit. Quod si ejusmodi
metastases in pulmones factæ fuerint, haud
abs re phthisin metuere oportet: unde
non vane M. B. VALENTINUS (z)
„ crebra (inquit) versatissimi medici
„ Francofurtensis D. WESEMIi experi-
„ entia constat, quod ophthalmia in pri-
„ mis serosa intempestive suppressa in
„ phthisin pulmonalem sæpe abeat: Hinc
„ affectibus oculorum chronicis obnoxii
„ si iisdem desubito liberentur, raro ul-
„ trā unius vel alterius anni periodum
„ solent supervivere: quod ex iterata
„ observatione haud ita pridem sincere
„ inecum dividebat vir celebratissimus,,
Et vero quam pronus sit materiæ ab ocu-
lis ad pulmones decubitus; tribus id
constat exemplis: Nempe „ ophthalmia
„ am chronicam, ceteris omnibus fru-
„ straneis, abrasione capillorum capitis
„ sanatam vidit D. PREUSSIUS (a), suc-
„ cedente tamen tussi, quæ ab ipso la-
„ xantibus sublata fuit,, De hac ipsa

(z) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 7: obs. 65.

(a) Histor. morbør. Vratisl. A. 1699. p. m. 64:

etiam re, at deteriore cum eventu, loquitur J. A. REIMANNUS (b) „ quid „ . . . de cura inflammationis oculorum „ chronicæ per abscissionem capillorum „ capitis observaverim (inquiens), referam: idem nempe, quod D. PREUSSIUM . . . observasse scribitur, quod „ tussis successerit ophthalmiæ ita curatæ, quam ille laxantibus sustulit. At „ vero in viro nostro tussis tam contumax „ est, ut sæpius se phthisicum factum „ fuisse metuerit, et præterea pruritum „ totius corporis molestum experiatur. „ . . . Degit tamen adhuc tolerabiliter, „ ex quo V^x Se in pede æquinoctiali „ tempore et infuso laxante uti ex consilio nostro incepit „. Denique „ militis cujusdam filiola, refert V. RIEDLINUS (c), annua aliquot hebdomadis major cum aliquot quidem dentes „ alveolos suos perrupissent, nunquam „ tamen hoc sic contigit; quin inde non „ ita bene se habuisset; dum aut achores successerunt, aut oculus inflammatus fuit, aut alia eandem prostravere „ mala. Cum nuper iterum oculo tantum insidiaretur dentitio, ut hujus usu

(b) Misc. nat. cur. Cent. 9. obs. 46. p. 127.

(c) Curar. medicar. millenario No 888.

„ puellam orbatum iri non ita iniustus
„ subfuerit metus; propterea chirurgum
„ quemdam consulere, qui nescio qui-
„ bus medicamentis oculum priori suo
„ statui sic restituit, ut tantæ ophthal-
„ miæ nec indicium quidem superfuerit:
„ at successit tanta dyspnœa quotidie
„ sub vesperam præcipue incrementum
„ sumens, ut puella inde brevi viribus
„ fere penitus exuta fuerit; cum præ-
„ sertim sic sat diu nullum conveniens
„ eidem opposuissent remedium. Hinc
„ vero licet tandem me vocaverint, et
„ ego medicamenta laudatissima præ-
„ scripserim, nec hæc tamen vel mini-
„ mum profuere; sed puella brevi post
„ in mortis prædā cessit „. Ex his
autem satis liquet, pravas id genus me-
tafastes malæ fere nunquam non medica-
tioni ophthalmiæ deberi. Contra ea

b) *Bona* salutarisque metastasis
censenda est, quam BAEUMLEIN refe-
rente A. E. BÜCHNERO (d) observavit in
puella quinquenni. Hæc sinistro in bre-
gmate prope fontanellam tumorem secum
in lucem attulit, quem litus unguento
nervino ac ♂to cum oleo carvi, saccu-
lique discutientes admoti, maximam par-

(d) l. c. A. 1730 Aug. cl. 2. art. 4. p. 1254.

tem depulere, excreta per lævam narem
 purulenta materia. Cum autem neglecta
 ulteriori remediorum adhibitione tumoris
 aliquid remanserit, semestri inde post
 puella sinistri oculi inflammatione labo-
 rare cœpit, quæ etsi catharticis, usuque
 MR^a ex TR^a ꝯ ii, essentia succini et
 scordii, ac pulverum diapnoicorum ali-
 quatenus minuebatur, haud tamen ante
 prorius desiit, quam in sinistræ manus
 digito annulari ruber tumor fuisset ena-
 tus, nec solventibus nec maturantibus
 tollendus, ac toto post anno circumactō
 ad suppurationem primum perductus.
 Ortus hinc abscessus dum sub usu, ut ut
 non per omnia ordinato, cathartico-
 rum sanguinemque depurantium sanationi esset
 proximus, novus in brachio tumor emer-
 sit, in abscessum perinde abiens; cujus-
 modi alii ex aliis sensim vel in brachio
 vel cubito enascebantur adeo, ut uno ad
 sanationem tendente novi continuo suc-
 creverint, qui si solventibus discuterentur,
 ophthalmiam resuscitabant. Idcirco sub
 idoneo regimine diætetico diapnoico, præ-
 missis et intercalatis catharticis ꝯ lib. da-
 batur per 4 hebdomades mane MR^a e
 TR^a alcalina et scordii, sub vesperam
 autem ꝯ ex æthiope min. C. C. usto ac
 succin. ppt. cum decocto pro potu ex rad.
 scorzon. ononid. bardan. scrophul. poly.

pod. helen. & sem. fœnic. Sicque sub hac curatione abscessus omnes perſanati, quin vel novi emergerent, vel ophthalmia rediret; præſertim cum anno infequente eadem curatio per 14 dies rursus fuiſſet inſtituta, intermedioque tempore verno et autumnali fuiſſent exhibita cathartica. Abhinc puella ſana vixit. Fomiculorum proſecto vices tumores memorati ſuſtinuere. Neque minus hic ſunt ſalutares cutanei morbi chronici, ut achores, ſcabies, in primis ubi eorum præpoſtera retropulſione ophthalmiæ naſcuntur; iis enim reverſis illæ conquieſcere ſolent. Apud C. T. BIERLINGIUM (e)

„ filiola quædam 6 annorum ex variolis
 „ laborans ophthalmia accepit emplaſtrum
 „ veſicatorium ex cantharidibus

(R. Ferment. acerrimi ʒj

Cantharid. rite ppt. ʒj. cum ſ. q.

Aceti F. l. a. cataplaſma) : quo

„ veſicæ excitatæ; ſed a parentibus in
 „ iis conſolidandis juſtum non exſpecta-
 „ tum eſt tempus: propterea natura ſibi
 „ ipſi viam aperuit, et caput puſtulis
 „ multis occupavit, quibus materia pec-
 „ cans revulſa eſt, et oculus aliquomo-

(e) Theſaur. theoret. pract. obſ. 100. p. 1182.

„ do rubedine liberatus „. Ita in futuro filia apud PEZOLDUM (*f*) achores reversi ophthalmiam ab eorum retropulsione ortam sustulerunt. Scabies quoque ab usu thermarum Carolinarum in TILLINGII (*g*) studio efflorescens haud parvi ad ophthalmiæ sanationem erat momenti. Et J. L. ODHELIUS (*) vidit nobilem adolescentem ab ophthalmia contumaci haud prius vindicatum, quam post diuturnum et irritum & lium usum vehementi scabie correptus est; abhinc enim oculi remediis idoneis adhibitis brevi persanati sunt. Eodem quoque modo podagra ingruens ophthalmiam contumacissimam in MORGAGNIO (*h*) exstinxerat.

4. *Febris* quoque teste HIPPOCRATE (*i*) ophthalmiis superveniens interdum eas solvit: „ juvat autem (ait ille) „ succedens febris aut dolor in lumbos „ firmatus „. Interea tamen Vratislavienses (*k*) „ SCHNEIDERUS (*l*) quæstionem illam ventilat (inquiunt), an „ febris ophthalmiam solvere possit? „ Cum HIPPOCRATES ipse doceat,

(*f*) Vide §. 22. No 4.

(*g*) Vide §. 41 No 2.

(*) Act. Svec. Vol. 38 Trimestr. 3 n. 4. p. m. 216.

(*h*) Vide §. 59 No 2.

(*i*) Prædictorum Lib. 2. p. m. 102.

(*k*) Hist. morb. Vratisl. l. c.

(*l*) De catarrhis Lib. ult.

„ quod febris superveniens fit solutio
„ lippienti; neganti nos testimonium per-
„ hibemus: quamvis omnino probabile
„ fit, motu febrili posse humorem in
„ oculis hærentem per metastasin ad alia
„ membra, ad pleuram, jecur, pedes,
„ &c. protrudi,,. Facit huc observatio,
quam U. C. SALCHOV (m) describit, pu-
ellæ 9 annorum semestrem jam ophthal-
miam superveniens acuta febris depulit
quidem; at ob febrem ipsam forte non
ex integro solutam aliquanto post utro-
que in oculo pterygium enatum est, et
pone aures tubera aliquot partim majo-
ra partim minora emergere; intumuit si-
mul abdomen præsertim in sinistro latere.
Porro etiam ulcus in calce pedis dextri,
a pernione effectum, aderat. Opem
quærente pro illa patre præter interna ex-
hibita remedia pro oculis præscriptum est

R. TR^x minii gtt. xij.

℥ rectif. Gallic. gtt. xxjv

∇^x still. rosar. et cyan. aa ʒj.

M. ut agitatum calidumque eluendis se-
dulo oculis adhibeat. Ulceri pedis tu-
beribusque pone aures bis quotidie em-
plastrum Saturninum recens admotum.
Ab his intra octiduum tubera emollita,

(m) Chirurg. Beobacht. 32. p. 129.

ulcus sanatum, oculi quoque aliquatenus emendati: pater itaque cum prole remediisque domum profectus. Hocce in casu febris ophthalmiam metastasi ad colli glandulas facta solville videtur (forte puella scrophulosa diathisi laboravit, quæ ophthalmiam ante febrim, post hanc vero scrophulas et abdominis inflationem produxit); cur autem crisi quoque alias eandem solvere nequiret, haud perspicio.

5. *Tempus* tandem ipsum non nullis ophthalmiis ad remedia quæque contumacibus mederi assolet. Namque C. H. ERNDTELIUS (n) „quam rebelle hoc „ipsum sit malum, propter continuum potissimum atque incredibile humorum „affluxum, aliquando inter alios in „Cellissimo quodam Principe vidit, cui „licet ad divertendum serum etiam decoctum lignorum cum purgantibus ex „rad. asari, fol. sennæ, ꝯ^{io} & ꝯ^{io} acutum fuerit, quod etsi per 3 vel 4 „septimanas et ultra non saltem copiosas quotidie dejectiones serosas per alvum, sed et finito jam decocti usu „speciem coryzæ humidæ diu satis durantis produxerit, his omnibus tamen „non obstantibus ophthalmiam profligare cum acri lacrymarum effluxu haud „potuit; sed diu et per aliquot adhuc

(n) l. c.

„ finita cura menses malum hoc molestif-
„ simum tolerandum fuit „. Luculentior
etiam hanc in rem casus est C. E. ESCHEN-
BACHII (o): „ matrona quædam 40
„ annos nata, plethorica, temperamen-
„ to sanguineo et statura mediocri præ-
„ dita, vitamque amans negotiosam, e
„ perfrigeratione leviori tempore hye-
„ mali ophthalmia corripitur, oculi dextri
„ palpebras potissimum obsidente. Hanc
„ sub initium non curat nimis, sed do-
„ mesticis remediis propugnare anniti-
„ tur. Cum vero malum ex eorundem
„ usu haud tolleretur, quin etiam auge-
„ sceret, medicorum complurium con-
„ silia exposcit, et varia successive me-
„ dicamina adhibet, sicque interna reme-
„ dia et externa, vesicatoria, laxantia
„ reiterata, fons quoque Pyrmontanus,
„ aliaque in usum ducuntur. Ophthal-
„ mia tamen hisce omnibus superior re-
„ stat, oculi bulbum brevi in consen-
„ sum rapiens, nec non corneam trans-
„ parentem aliquo modo obfusans, ac
„ veluti panno leviori obducens, albu-
„ gineam præterea tegens carne noviter
„ accrescente, texturæ cuidam cellulosæ
„ adipe ac quasi glandulis minoribus hinc

(o) Obs. anat. chir. med. rarior. obs. 28. p. 235.

„ inde permixtæ simili; quales etiam
„ glandulæ, eæque magis conspicuæ at-
„ que tumentes in interiori palpebræ
„ inflammatæ ac prætumidæ superficie
„ exsurgunt copiosæ, mucum edentes
„ pure e suppuratis palpebris effluente
„ commixtum, palpebrasque inter se in-
„ vicem conglutinantem matutino in pri-
„ mis tempore. Ad absumendas tam car-
„ nem descriptam in bulbo protuberan-
„ tem quam corneæ maculam svasu Medi-
„ ci cujusdam liquor oculo instillatur
„ causticus, cujus tamen ægrota ne gut-
„ tulam quidem propter maximum exin-
„ de advenientem dolorem, eumque pe-
„ nitus intolerabilem, perferre poterat:
„ unde et post unum alterumve experi-
„ mentum institutum liquor iste rejicitur.
„ Deinde circumforaneus quidam oculi-
„ sta . . . consulitur; qui vero præter
„ suppeditata non nulla consilia vaga mor-
„ bum non tangit. Tandem et ego ac-
„ cerfor, postquam morbus annum cum
„ dimidio duraverat. Oculi conditio
„ tunc erat talis, qualis in præcedenti-
„ bus descripta legitur: palpebræ scili-
„ cet cum rubore insigniter tuebant,
„ in primis superior, quæ digitum me-
„ diocrem crassitie æquans præ pondere
„ nimio dependebat. Glandulæ in illius
„ superficie interna copiosæ aderant, ob-

„ fructæ, protuberantes; pinguedo sive
„ caro prædicta luxurians albugini et la-
„ crymali carunculæ superinducta conspi-
„ ciebatur; bulbus propter inflammatio-
„ nem non rubens modo sed pariter at-
„ que palpebræ coccineus apparebat,
„ muco etiam ac pure illitus; cornea
„ alias transparens nunc semiopaca erat,
„ et in pannum quasi mutata; humor de-
„ nique crystallinus, quantum per cor-
„ neam observare eundem licebat, pel-
„ luciditatem jam jam modo aliquo de-
„ posuerat; adeo ut hujus oculi visus
„ propter concurrentia tot symptomata
„ prava nullus fere superesset. Primam
„ in tali statu dubio intentionem eo diri-
„ gebam, ut inflammationem præsentem,
„ ipsam pro parte tumoris palpebrarum
„ causam, omni mitigarem studio. In
„ quem finem fomentationibus rem ag-
„ grediebar, sub initium e solo lacte
„ bubulo paratis, moreque decenti ex-
„ trinsecus oculo applicatis. Post aliquot
„ dierum decursum lacti addebam aquæ
„ calcis vivæ partem dimidiam, hujusque
„ dosin sequenti tempore gradatim au-
„ geri curabam, prouti scilicet dolor
„ oculum inflammatum vexans gradatim
„ decrescebat. Atque sic porro fomen-
„ tationes successive parabantur e sola
„ calcis vivæ aqua; ex eadem decocto

„ cuidam, lenissime primo, postea for-
„ tius discutiente juncta; e decoctione
„ tali cum vino debiliore facta; e vino
„ sensim generosiori ac ultimo ex adstrin-
„ gente rubro; ex eodem cum aqua vul-
„ neraria sub initium vinoso, ceu mi-
„ tiori, postea spirituoso ac fortiori
„ combinato. Interea quoque resolventia
„ præscribebam, aliaque, quæ et plethoræ
„ et sanguinis ebullitioni atque ad ocu-
„ los congestioni debentur; parciore ta-
„ men singula manu propter aliqualem
„ nauseam, quam diuturna variique ge-
„ neris medela ægrotæ adversus medi-
„ camenta attulerat. Jungebantur præ-
„ terea diætæ conveniens, Væ So, imò
„ et vapores e lacte fervente atque de-
„ coctis leniter solventibus calidis as-
„ cendentes, et in oculum debita cum
„ cautela admissi. Quibus omnibus per
„ tempus sufficiens in usum ductis tan-
„ dem quoque dolor aufugiebat, tumor
„ palpebrarum penitus fere remittebat,
„ ophthalmia mirum quantum mitigaba-
„ tur, et visum recuperandi spes eluce-
„ bat. Ast glandulæ in palpebra in pri-
„ mis superiori tumentes, et caro lacry-
„ mali carunculæ bulboque supercreta,
„ restabant; eamque ob causam error
„ quilibet diæteticus levior palpebræ tu-
„ morem quadantenus revocabat, adhi-

bitis denuo fomentationibus et sacculis ex herbis feminibusque resolventibus paratis domandum. Tandem denique elapsis aliquot mensibus svasor eram, ut post oculum aeri liberiori ferendo pedetentim allivescitum singula rejicerentur externa, nec nisi linteo mundo ante oculum dependente hic contingeretur, quo nimirum patesceret, numne successu temporis et cum usu remediorum internorum solo tam glandulæ gradatim detumescerent, quam sponte abiret caro superflua. Sed ambo hæc in statu semper eodem persistebant: præsens hucusque inflammationis reliduum chirurgiam omnem bulbo carne oblesso admovendam dissuadebat, et quoad glandulas infarctu laborantes præter regulas chirurgiæ sanioris propria me docuerat experientia, tutissimum esse, eas non tangere, quoties (uti in hoc casu) plenaria ac simul facta ablatio perfici nequit. Nil itaque supererat, nisi adstringentium eorum, quæ blanda simul virtute cathæterica pollent, experiri efficiam. Cumque hoc nomine præclarum inter alia sit vitriolum album illius grana duo in infusi cujusdam lenissime resolventis unciis duabus solvi curabam, ejusque MRæ gtt. j alteram-

„ ve mane et vespera instillari. Verum
„ enim vero ne hoc quidem remedium
„ absque inflammationis augmento ex-
„ templo accedente malum perferebat :
„ ut igitur istud quoque removendum
„ esset . . . HEISTERUS . . . in au-
„ xilium vocatus bulbum sectionibus
„ iteratis a carne superflua liberandum
„ esse non judicabat modo ; sed etiam
„ hac methodo se olim ejusmodi morbum
„ sanasse fidem obligabat ; ipseque immissa
„ bulbum inter et carnem in loco, quem
„ albugo occupat, acu filum sericeum
„ trahente carnis portiunculam attolle-
„ bat, sublataque forfice bene scinden-
„ te resecebat ; eundem laborem sæpius
„ repetens : unde revera quædam albugi-
„ nis portio tandem in conspectum ve-
„ niebat repurgatâ. Post singulas ope-
„ rationes hæc infuso foliorum hysso-
„ pi atque euphrasie inter se commixtorum
„ leniendi doloris a sectione residui cau-
„ sa et ad abluendum sanguinem e vasis
„ discissis prodeuntem utebatur ægra. Ad
„ hæc . . . venas ad corneam transpa-
„ rentem diffusas majores parili modo
„ præscindebat ; lacrymalem carunculam
„ lapide infernali modice tangebat ; ac
„ deinde unguentum ex adipe vipérino
„ oleo aliisque detergentibus compositum
„ oculo illinendum imperabat : species
„ simul

simul theæformes e radicibus attenuan-
tibus paratas, idemque Sem , cujus
compositionem parca ¶ ii dulcis portio
intrabat, pro usu interno et quotidiana
no. præscribens. Post Eruditi hujus
abitum eadem methodo ego pergebam
. . . . Ast ne sic quidem morbus vinci
se patiebatur. Quoties enim propter
accedentes tandem in corporis parte
ista præ aliis exquisitum obtinente
sensum dolores paulo majores labori
aliquamdiu inducias dare cogebarur,
toties, idque elapsis diebus paucis,
carnis illius luxuriantis portio æqualis
cum aliis vasis majoribus denuo aderat
in bulbo; præsertim vero tanta sem-
per brevique propullulabat lacrymalis
carunculæ pars, quantam lapis adime-
bat infernalis, adeo ut oleum operam-
que perdi animadvertens ab omni me-
dela manuali; dolores ægrotæ inutiles
adducentē; ultimato abstinere, so-
lum internorum usum aliquamdiu ad-
huc continuandum svadens; licet me
haud fugeret, eorundem virtutem
nunc quoque extirpando funditus ma-
lo minime esse parem: id quod even-
tus etiam probavit. Post aliquem
enim temporis decursum et interna
quævis erant seponenda, solique natu-
ræ totum sic negotium relinquendum;

„ nisi quod oculus linteo a frontis re-
„ gione ante illum dependente et abs-
„ conderetur, et contra liberum clario-
„ ris lucis aliorumque corporum irritan-
„ tium accessum defenderetur. Quo
„ ipso aliquot annorum spatio non modo
„ dolor evanescebat totus, sed et tu-
„ menti palpebræ naturalis pedetentim
„ redibat status; caro luxurians granula-
„ ta augeri desinebat, atque oculus sat
„ prope accedebat ad conditionem soli-
„ tam, cum visus tamen, propter obfu-
„ scatam lentem crySTALLINAM et pupillæ
„ constitutionem aliquo modo præterna-
„ turalem, deperditione irreparabili,,.



*HISTORIAE**OPHTHALMIAE**P A R S II.*

DE METHODO MEDENDI
OPHTHALMIAE.

PROLEGOMENON.

SUMMA CURATIONIS CAPITA.

§. 38.

Omnis ophthalmiae curandae ratio tria illa in vulgus nota capita respicit; nimirum indicans, indicationes, et indicata, ita ut, ni pro eo ac par est, sollicita priorum duorum ineatur ratio; tertium in perniciosam saepe exorbitet empyriam, in ophthalmiae praë primis therapia nunquam satis vitandam. Unde ubi morbi magnitudo rite fuerit aestimata, ejusque causa patuerit, neque alia, quae porro huc faciunt, fuerint praetervisa, non dis-

facilis erit res operæ summa curandi statuere capita. Cum enim sit

I. INDICANS ipsa ophthalmia; erit

II. INDICATIO eandem tollendi: proinde est ejusdem

1. *Causa* summovenda: hinc stimulus

a) Obtundendus,

b) Loco movendus,

c) Eliminandus.

2. *Vasorum infarctus* p. n: tollendus,

a) Vi contractili eorum adaucta:

b) Vi distendente liquidi immi-

nitutä, scilicet

α. Lentore subacto,

β. Copia imminuta,

γ. Motu averso aliorum.

3. *Symptomata* urgentia mitiganda,

4. *Effectus* futuri præcavendi, præsentis tollendi.

5. *Recidiva* præpedienda, causis nempe

a) Procatarteticis vitatis,

b) Proegumena ablata.

III. INDICATA denique erunt præsidia qua diætetica, qua pharmaceutica, qua chirurgica; ope quorum indicationibus est satis faciendum. Atque hæc in præsentì veniunt expendenda;

S E C T I O I.

PHARMACEUTICA REMEDIA.

CAPUT I.

EMETICA, CATHARTICA.

§. 39.

I. EMETICA quamquam nemo Veterum, vetustatisque sequacium in ophthalmia danda censuerit; sunt nihilo minus casus, ubi vitare usum eorum nequeas: dum nempe prava humorum colluvies primas obsidet vias, nullis inde aliis remediis everrenda. Atque tunc „ lenia purgantia, largus ^{ous} vitrioli usus, vel si hæc non sufficiunt, lene vomitorium magnum doloris et inflammationis lenimen adferre observavit „ A. G. RICHTERUS (p). Egregie id confirmat singularis plane R. DOBSONI (q) observatio: matrona 22 annorum, teneri habitus, vitæque sedentariæ, exeunte

(p) Observ. chirurg. Fascic. I. Cap. II. p. 105.

(q) Medic. Commentar. von Edinburgh 3 Th.

4 Stück 2 Abschn. 2 Bemerk. p. 444. 499.

A. 1773 dextro oculo prorsus cæca evasit, idque subito. Adnata totusque bulbus admodum fuit inflatus, atque adnatam numerosa tegebant vasa rubra perquam inflammata. Corneam distendebat spissa lentaque materia, gelatinam referens, et lens crystallina ob adauctam suam molem eo usque extra pupillam propulsa erat, ut corneæ fuerit contigua, figuram præ se ferens angulosam et inæqualem. Tumbant palpebræ, simulque ex anchyloblepharosi spuria cohærebant, neque diduci poterant, quin multis lacrymis acribus elapsis, admissaque luce et aere vehementissimus dolor sequeretur. Oculus lævus iisdem, at mitioribus, malis laboravit. Dolores hocce in morbo tanti erant, ut et ob continuitatem somnum arcuerint, et interdum præ vehementia animi defectiones causerint. Pulsus parvus et admodum celer fuit; sed non multo alius per sanitatem quoque observabatur. Alvus erat constipata; urina vero secundum naturam procedebat, nisi quod subinde ruberet, sedimentumque album mucosum poneret, in primis dum ægra totum diem in lecto transiegit, ac præ doloribus ubertim sudavit. Catamenia rite, at paulo uberius, ac aliis feminis plerisque, procedebant. Cetera neque sitis neque sudores erant nimii;

isti ex intervallis accidebant, frigidi et glutinosi. Appetentia ex integro aberat, viresque magnopere fuerunt prostratae. Hocce in statu reperta est 3^a Januar. 1774. Ante aliquot abhinc menses idem quoque malum, at leviores in gradu, perpeffa est, postquam oculo in januam impigisset, quod tamen intra aliquot hebdomades consuetis remediis cessit. Per sanitatem alias obnoxia erat alternanti hemiplegia lateris laevi, forte quod totas noctes ad lumen lectione exegisset; narrabat quoque, sinistro thoracis lateri continuum inhæsisse dolorem cum sicca tussi, identidemque omnia alimenta, praesertim si jentasset, vomitu se rejecisse. Impresensiarum autem nulla ophthalmiae causa ipsi succurrebat, nisi quod catarrho fuerit affecta. Postremo hoc in morbo pharmacopœi opera per plures dies usa est, qui aliquot cathartica praebuit, vesicasque pone aures excitavit. DOBSON demum accitus, cum ægra Væ Sem nulla tenus admitteret, numerosis hirudinibus sæpius ad tempora admotis multum sanguinis elicuit, ac deinceps iustis ex intervallis lenia cathartica dedit, simulque vesicantia, enemata et ophthalmica resolventia administrari iussit. Capiti quoque raso ablutiones aqua frigida, temporibusque cataplasmata resolventia sunt adhibi-

ta; porro opium ac pediluvia, ubi res polcebat, in usum ducta; potus refrigerans cum nitro præscriptus, et idonea diætâ imperata. At omnia in cassum, morbo incrementa potius nacta. Catharticis ægra semper lædebatur; siquidem aucti inde dolores, vigilesque noctes et sæpe defectiones animi consecutæ. Per principia Februarii ad hæcenus recensita symptomata accessere etiam intensa sitis, tussis, anorexia, pravus in ore sapor, et febris quotidiana a meridie, cum totius corporis debilitate; ægra nihilo minus ab omnibus abstinuit remediis, tum quod priora nihil opis tulerint, tum etiam quod 8 dies abfuerit DOBSON, qui demum redux diu quid facto opus esset, ambigens, cum jam jam suo ægram fato relicturus erat, experiri tamen ante decrevit, quid hic emetica, quorum utilitatem in pertinacibus quibusdam oculorum morbis ab aliis extolli novit, possent: idcirco præscripsit

R. \square ri emet. gr. iij, solve in

Julepi salini \mathfrak{z} iiij. S. cochl. j hora 6^a vesperi, ac postmodo omni hora, donec aut emesis aut catharsis eveniat. Post dosin secundam si nec ano nec cato successerit effectus, capiat cochl. ij, hocque modo pergat, quoad evacuatio oboriatur. Finita vomitione sumat pilulam sequentem:

- ℞. Extr. Thebaic. gr. jss
 ‡ Ypecacuanh. gr. ij
 Syr. simpl. gr. v. F. pilula j.
 ℞. Cort. Peruv. opt. in alcohol
 redact. ℥j
 Rad. gent. incif. ℥ss
 — glycyrrh. ℥ij. coqv. in
 ∇æ font. ℥iij ad ℥ij. Colat. adde
 TRæ Cort. Peruv. нухн. ℥ij
 Vini chalyb. ℥jss

Elix. vitrioli acid. ℥iij. M. S.
 cochl. iij ter de die absente febre. Do-
 sis opii pro tenera ægra nimia videri
 forte posset; sed cum jam opio ob vehe-
 mentes dolores continuasque vigilias sæ-
 pius usa eidem quadantenus assueverit,
 majore illius præbio, præsertim quod
 Ypecacuanhæ jungebatur, fuit opus.
 Postero mane ad stuporem observare erat,
 symptomata omnia remisisse; emetico
 multum materiæ lentæ biliosæ evehctum
 est, alvusque promota. Nox inde tran-
 quilla multo cum somno reficiente, quam
 unquam hætenus, consecuta; dolores
 potissima sui parte conquievire, tumor
 oculi imminutus, gelatinosa humorum
 conditio emendata, visusque recuperatus.
 Cum vero altera mox emetici dosis vo-
 mitum movisset, hodie e residuo emetici
 singulis horis minor dosis capienda im-
 perabatur, excepta accessione febrili, in

qua illud ut alterans et antifebrile effectum præstare oportebat. At febris prorsus emanfit, vel certe vix aliquid illius observatum. Postero die reliquum solutionis absumptum est, ac tum objecta proxime oculum admota jam distingvebat ægra, humoribus oculi pedetentim rursus inclarescentibus. Idcirco nunc ad usum decocti transiit, a quo citra ullam sensibilem evacuationem pristinæ reddebatur sanitati sine ulla mali recidiva, nisi quod errore diætæ semel sibi leviolem causarit hemiçraniam. Ob aliquam tamen superstitem corneæ opacitatem sequentes pilulæ porro sunt præscriptæ :

R. Calomelanos gr. xij

Sulph. ☉ ꝑ ii 3ss. Tritis simul
perfecte in marmoreo mortario
adde

Opii puri gr. iij

Conserv. rosar. q. f. F. pil. xij.

S. m. et v, N^o j per biduum; 3^o die summat mane infusum sennæ comm. q. f. ad alvi solutionem cum solito regimine: hacque methodo pergat, donec omnes pilulas absumpserit. Unde visus in dies emendabatur. Ejusdem prope et tenoris et succellus observationes complures haud ita dudum abhinc vulgavit M. STOLL, quæ emeticorum in ophthalmia inevitabilem sæpe necessitatem apprime osten-

dunt, nempe (r) „ rusticus annorum 22
„ ab aliquot jam annis oculorum rube-
„ dine dolorifica per intervalla tentatur,
„ dextri præcipue, quem etiam modo
„ albugo maculat. Varia adhibuit, quæ
„ vel fors obtulit, vel agyrta svasit, vel
„ anicula. Ab anno aliqua oculorum
„ emendatio. Sinister vix aliquod opa-
„ citatis in cornea vestigium, dexter
„ vero albuginem exhibet, cui cum ante
„ 5 septimanas unguentum illiniret acre,
„ dolor, rubor, et continua lacrymatio
„ oculorum utrumque, validius vero si-
„ nistrum,prehendit. Cetera sanus die
„ 4^a Junii nosocomium accessit. Hiru-
„ dines pone oculum acutius dolentem
„ applicatæ, et discutiens cataplasma, ne
„ hilum profuere. Per 3 ex ordine dies
„ observavimus oculos rubere semper
„ quidem, dolere tamen statâ quotidie
„ hora, 4^a videlicet vespertina, dolore
„ longam comitante noctem, et ad au-
„ roram profugo. Nullum ceteroquin
„ ullius vestigium febris; at linguam
„ flavicans materies obsedit, et faciem
„ totam multa fiavedo suffudit. Cum
„ per hosce dies haustus salinos assump-
„ sisset, die 6^a Junii epoto emetico

(r) Rat. medend. P. 2. C. 10. æger. 5 p. 101. sqq.

„ multam flavam et tenacem bilem vo-
„ mitionibus crebris refudit. Mox ea
„ vespera dolor oculorum nullus, stante
„ rubedine. 8 Junii, cum pridie denuo
„ doloris quid, ut ut perpaucum, vespe-
„ ri rediret, lingua et facie biliosis, ite-
„ ratum emeticum copiosam denuo bilem
„ excussit. Nulla ea vespera exacerba-
„ tio, nec sequentibus diebus. Super-
„ stes indolens rubedo vesicante pone
„ oculum applicato discussa est. Cum
„ denuo dolorifica quædam sensatio et
„ lacrymatio reverteretur, nullis colly-
„ riis aut alvi ductionibus profliganda,
„ 3a demum vice emesis concitata multam
„ bilem eduxit. Inde faciei pallor et
„ oculorum constans sanitas. Ventricu-
„ lo amaricantibus et rheo cautum „.
Hæc ophthalmia soli biliosæ colluviei,
quali æstas 1777 abundavit, debebatur;
at autumnò proVecto, mense videlicet
Novembri (s) „ obvenit . . . ophthal-
„ mia . . . ex ventriculo oriunda aut
„ pituitoso aut bilioso. Hæc multis sæ-
„ pe septimanis et mensibus ægros ve-
„ xat: oculus multum rubet, illacryma-
„ tur, et quasi ab injectis pulvisculis
„ aut arenulis dolet, lucis impatiens per

(s) Ibidem Cap. 15. p. 324. sq.

diem ; et dolore ad vesperam
noctunque intensiore continuoque ;
at interdiu aut nullo aut miti
et interrupto : rubor assiduus ;
dolet etiam alterutrum tempus ægro-
tanti oculo vicinum, et latior subinde
capitis ex eo latere plaga. Cornea
transparens opacatur; albidæque subin-
de vesiculæ in eadem excitantur. Alia
symptomata ægri plerumque suapte non
queruntur; at curatori facta pervesti-
gatione constabit ventriculum cibique
desiderium per id tempus languere;
amarescere os, aut mucò redundare
præter solitum, gravari epigastrium;
obscurissimos motus febriles per vices
recurrere; horripilationes nempe su-
datiunculis et calore levi ac subitaneo
interstinctas, idque vesperi et noctu
magis. Inquies per noctem; et fæ-
tens sudor, insomnia. Diuturna ejus-
modi ophthalmia mihi semel pro sy-
philitica imposuit, cum præter noctur-
nas exacerbationes multa quoque alia
concurrerent ab hac suspitione non
aliena: ægram quamdam id genus oph-
thalmiâ laborantem meque una multo
affeci tædio; multa et tædiosa usus cu-
ratione, donec innotuerat, rem a ven-

„ triculo proficisci „. Videlicet (t)
„ puella 23 annorum elapso abhinc anno
„ rubore doloreque oculi dextri, et cor-
„ neæ laborabat per annum integrum du-
„ rante; catameniis irregularibus utâ,
„ sana ceterum. Cum appetente vespere
„ dolor intenderetur rubore non ma-
„ gnâ; et corneam opacitas fere totam
„ teneret; varia diu et ab aliis et a me
„ quoque præscripta fuere. Tandem
„ omnibus in cassum adhibitis & lia ob
„ latentis veneræ labis suspicionem in
„ auxilium vocata. Nil profectum est,
„ ægraque singulari potius naturæ beni-
„ gnitate morbum una nostramque erro-
„ neam medicinam vincentis convaluit;
„ quam artis spe. Die 26 Novemb. de-
„ nuo ob similem alterius oculi affectio-
„ nem nosocomium adiit; dura potius
„ necessitate coacta, et ex heræ, cui ser-
„ viverat, mandato, quam ob fiduciam
„ recuperandæ apud nos sanitatis; utpo-
„ te longæ et ipso morbo peioris cura-
„ tionis, quam nuper subierat, non dum
„ oblita. Ante 4 septimanas vespere su-
„ bito dolore capitis se correptam fuisse
„ narrabat, primum obtuso supra orbi-
„ tam oculi sinistri, dein acuto totum

„ caput pervadente; mox et rubor atque
„ ardor eundem oculum cepit cum acris
„ fervidique feri profluvio copioso: pau-
„ cos post dies obscurari cornea, in
„ ejusque medio bullula nasci, quæ spon-
„ te disrupta foveolam reliquit. Ex eo
„ tempore et oculi et temporis vicini
„ sub vesperam quotidie revertebatur;
„ tota nocte crescens et acutus supra
„ modum, donec diluculo remitteret
„ paulatim, et in obtusum fatisceret do-
„ loris sensum ad 9am matutinam. Inde
„ capite gravi quidem sed indolente fuit
„ ad statam usque horam vespertinam.
„ Etsi interdum dolore omni vacaret ocu-
„ lus, et capitis vicina regio, tamen
„ nunquam illius rubor; nec unquam
„ acrium lacrymarum vis defuit. Cum
„ 3 ferme septimanis hæc ægritudo sta-
„ tis horis recurreret quotidie, ægra ob-
„ ambulante; ceterum nil incommodi
„ conquesta et appetente, en cibi fasti-
„ dium accedit, et assumptorum amarus
„ sapor et fitis. Ophthalmiæ exacerba-
„ tionem nocturnam nullus horror præ-
„ cessit, nullus sequebatur sudor; at
„ comitari solebat calor major naturali.
„ Atque ita 4 septimanas exegit domi
„ suæ, variis usa remediis, collyriorum
„ omni specie, et terna phlebotomia, et
„ assiduis purgantibus, ita ut per inte-

„ grum mensem diu noctuque et quoti-
 „ die crebro dejecerit. Ea corneæ opa-
 „ citas fuit, cum nos adierat, ut res
 „ objectas non dignorit, etsi ambitus
 „ amplioris et sole multo illustres. Per
 „ biduum poscam et mulsam hausit co-
 „ piofam, et arcani duplicati eam quan-
 „ titatem, ut alvus quidem emolliretur,
 „ at citra ejusdem fluxum: Die 3^o va-
 „ lens pharmacum potavit; duos vide-
 „ licet scrupulos radicis Ypecacuanhæ
 „ grano j tartari emetici armatos. Pi-
 „ tuitosa et biliosa revomuit cum eximio
 „ levamine: Rubor vix ullus ab emeto-
 „ catharsi, nec posthac ulla doloris re-
 „ versio; nocles tranquillæ et cum so-
 „ mno: Triduo vix elapso rubere ocu-
 „ lus ex toto desiit; incepitque perlu-
 „ cere. Vires, quas pervigilium et
 „ phlebotomia alvusque assiduo fluens
 „ jam extra nosocomium confregit, in-
 „ tra non multum tempus sequenti re-
 „ medio restituebantur:

R. Flor. salis ammon. martial.

‡ cort. Peruv.

Elect. diatell. aa ʒj. F. bolus; et
 „ fiant tales No vj. Sumat omni 4^a ho-
 „ ra bolum. Major in dies corneæ pel-
 „ luciditas rediit, ut die 10^a Decembr:
 „ res minutiores dignosceret. Nullum
 „ , colly-

„ collyrium oculo ægrotanti huc usquē
„ admovimus. En alvum assidue copio-
„ seque fluentem uni vomitui adeo non
„ parem; ut purgantibus augeri morbi
„ materies intendique visa fuerit; quam
„ unica emeto-catharsis exterminavit.
„ Cum hæc juvencula post medium De-
„ cembrem uberiores victum intempe-
„ stivius expeteret; et alvus aliquot die-
„ bus segnis evaderet; redire aliquis
„ pone tempus vicinum dolor; visusque
„ minui cœpit. Mox agræ ventrem sol-
„ vimus, diæta tenui aliquamdiu injuncta:
„ tandem ad roborantium usum revertē-
„ bamur, ea lege, ut alvus quotidie bis
„ terque responderit. Tum demum ocu-
„ lum sæpius aqua frigida; cui sacchari
„ b ni pauxillum admistum fuerat; irri-
„ gari curavimus eo eventu; ut sub ul-
„ timos Decembris dies nil doloris ex-
„ perirètur, atque oculo denuo uteretur
„ non discolori, ut ut paulo minus ex-
„ pedite; et si eundem attentius inspe-
„ xeras, modicissime nubiloso „. Haud
„ secius (u) „ die 12 Novemb. juvenis
„ 24 annos natus, qui suam in confici-
„ endis ex lana pileis operam magistro

(u) Ibidem æger 3 p. 331.

„ locabat, nos adiit. Morbi anamnesis
„ hæc erat: ante 3 septimanas alvus ci-
„ tari cœpit inter levia ventris per vi-
„ ces tormina, ceterum non calenti,
„ appetenti; hanc nucis moschatae pulvis
„ suppressit. Triduo inde vix elapso do-
„ lere caput, gravari multum, et ob-
„ ortis demum achoribus perfundi, ca-
„ lores crescere, et appetitus imminui.
„ Achores insperso & quodam siccavit,
„ ceteris non emendatis. Ante octidu-
„ um cum operi suo pileario pone a-
„ quam ebullientem vacaret, repente
„ dexter oculus insolito dolore valide
„ compungebatur, senim ex illo latere
„ caput acrius infestante, interdum beni-
„ gniori, noctu exasperato et somnum
„ omnem arcente. Incaluit magis, præ-
„ sertim ad sinciput. Amazor oris; hor-
„ ror nullus; sitis multa. Pars alba oculi
„ quasi sanguine suffuso rubet cum ardo-
„ re. Pulsus naturalis; lingua impura
„ siccescens. Ventriculo aut abdomine
„ non dolebat. Facies ex rubro flava;
„ lucis impatientia; lacrymarum pluviae;
„ corneae transparentis incipiens obscu-
„ ritas. Aqua simplici cum melle ac-
„ to et sale polychresto utebatur. Ocu-
„ lo nil remedii unquam admovebatur.
„ Die 14 Nov. cathartico-emeticum. Pi-
„ tuitam multam cum pauca bile vomē-

„ do refudit, dejecitque cum levamine
„ evidenti, celeri, magno. Ardor nul-
„ lus, rubedo multo minor, lucis tole-
„ rantia, nulli calores: tota nocte dor-
„ mivit. Die 15 Nov. poscam et mul-
„ sam cum sale polychresto sumpsit. Nul-
„ lus rubor, nebula tenuissima corneæ
„ adhuc obtensa; cetera bona. Ex illo
„ tempore invigorare ventriculum cœ-
„ pimus. Bene habuit. Oculus paucos
„ post dies sanissimus,,. Denique (x)
„ femina 30^{um} ætatis annum attigerat;
„ 5 prolium mater; quarum natu mini-
„ mam unius anni huc usque suo lacte
„ enutriit. Circa medium Octobrem no-
„ focomium adiit, aitque se a 4 septima-
„ nis cum gravi ophthalmia conflictari.
„ Quadam vespera oculum utrumque re-
„ pente dolere quasi compunctum atque
„ rubere occepisse; ea nocte ob vim do-
„ loris non dormivisse: die altero a do-
„ lore quidem vacasse, at persistisse ru-
„ borem inter assiduos æcritum lacryma-
„ rum imbres. Vespera denuo appe-
„ tente reversos immites oculorum cru-
„ ciatus esse cum pervigilio. Eam mali
„ accessionem remissionemve quotidia-
„ nam fuisse; non appetiisse, fastidio-

(x) Ibidem æger 5 p. 337.

„ fam, sitientem, dedolatam, ore mucos-
„ so insipido; animo per noctem sæpius
„ deficiente; hypochondrio sinistro duro
„ tenso dolente, ventre segni, obambu-
„ lassè febriculosam. Ultimis 2 septima-
„ nis exacerbata ophthalmiam horripiti-
„ latio præcessit, quæ antea non obser-
„ vabatur, noctu incaluit, et sub auro-
„ ram sudavit. Bis sanguinem toto hoc
„ tempore eduxit, e brachio una vice,
„ atque altera ex pede; et purgans as-
„ sumpsit proprio marte; at levamine
„ exiguo minimeque diuturno. Tandem
„ pectus opprimi cœpit; ejusque fini-
„ strum latus amplo dolore corripit ad
„ scapulam vicinam; indeque per omne
„ brachium excurrente, cephalalgia. Sic
„ affecta ad nosocomium venit. Curam
„ exorsi sumus a potu multo mellito,
„ posca; et arcano duplicato: dein eme-
„ to-catharsin instituimus. Vomitus se-
„ cessusque pituitosi biliosi copiosi, mox
„ allevantes et perseveranter: venter
„ mediocriter atque aliquot diebus fluxit.
„ Tandem nauseantis ventriculi pigri-
„ tiam ereximus remedio amaricante sto-
„ machico. Oculis affectis nihil admo-
„ vebamus. Sanguinis missionem bis in-
„ stitutam facilius tulit, quam multi so-
„ leant in morbis ejusmodi ab ea causa
„ prognatis; id forte corporis robori de-

„ bebatur in femina rusticana, et anni
 „ tempori aliquantulum jam refrigerato :
 „ certe autumnō, eoque potissimum jam
 „ provecto, adulto, atque in hyemem
 „ proxime desituro unam quin et alte-
 „ ram phlebotomiam febres biliosæ non
 „ raro exigunt, antequam tuto et utili-
 „ ter ventriculus subvertatur; quæve
 „ sanguinis missionem non possunt, ean-
 „ dem tamen absque periculo plerumque
 „ ferunt. Complures id genus ophthal-
 „ mias vidi, temporibus biliosis in pri-
 „ mis, atque ex ventriculo oriundas,
 (y). Similes quoque ophthalmiæ curan-
 dæ sæpius obtigerant J. G. FRITZIO (z),
 quæis emetica utilissime opposuit.

§. 40.

II. CATHARTICA vero longe ampli-
 oris sunt usus in ophthalmia præ emeti-
 cis, quæ cum nullum humorum ad caput
 pellendorum periculum secum ad instar
 emeticorum ducant, non stomachum mo-
 do verum universum etiam tubum inte-
 stinalem a saburra vindicando purum aliis

(y) Ibidem p. 337.

(z) Medicin. Annalen I Band 3 Abschn. p. 113.
 121. 168.

deinceps remediis in secundas vias transitum efficiunt; stimulum inflammatorium ab oculis ad intestina detrahere conantur; metastases ad vasa oculi factas loco movent; humorumque impetum ab encephalo ad alvinas vias avertunt, &c. Hinc toties ophthalmiis sola sæpenumero cathartica sine ullis aliis adhibitis remediis medentur. „ Ad lippitudinem „ annuam, inquit HIPPOCRATES (a), ac „ populariter grassantem capitis et inferioris alvi purgatio conducit,,. Unde etiam „ ex iis, quibus oculi tentari phlegmone cœperunt, non nullos sola purgatione per alvum uno die sanatos „ vidit,, GALENUS (b). Haud secius J. LANZONUS (c) „ oculorum inflammationes et pertinaces ophthalmias „ sola stimulatione ventris assumpta solutiva potione curatas vidit absque Væ „ Se, cucurbitulis, et aliis hujusmodi „ remediis,,. Quin imo J. N. PECHLINUS (d) „ in oculorum inflammationibus „ cum frustra diu laboratum topicis et „ collyriis, uno sæpe purgante morbum

(a) Lib. de videndi acie Opp. T. I. p. m. 689.

(b) Meth. med. L. 13. C. 11.

(c) Consult. med. 174. Opp. T. 2. p. 354.

(d) Dialog. de poſu Theæ p. 27.

„ profligari,, testatur. Congruunt hæc
cum aliorum quoque experientia. „ Pu-
„ ella quædam 8 annorum cum una cum
„ sorore sæpius ophthalmia laborante in
„ uno lecto decumberet, cetera sana,
„ nec catarrhis alias obnoxia, subito
„ etiam hoc malum et quidem tam ve-
„ hemens contraxit, ut per integrum
„ diem oculos nec aperire quidem po-
„ tuerit, qui quippe inde non tam ru-
„ buere, quam multum intumuerunt:
„ consultus ego, inquit V. RIEDLINUS
„ (e), propterea bis terve eidem pilulas
„ Francofurtenses exhiberi jussi, quæ...
„ tantum profuere, ut 3^o die vix oph-
„ thalmiæ quædam vestigia superfuerint,
„ licet nullum omnino remedium exter-
„ num adhibuerit. Ubi contra cum...
„ alia quædam virgo sacculos ex vino
„ coctos oculis eodem modo affectis ad-
„ movisset, ea malum inde non tam mi-
„ tigatum quam auctum sensit: unde et
„ huic has pilulas commendavi,, Porro
„ nos, ait C. VEGA (f), ingentes dolo-
„ res oculorum incipientibus inflamma-
„ tionibus adhibita purgatione 20 hora-
„ rum spatio sanavimus. Placet tamen

(e) Curar. medic. millenario. No 629.

(f) De arte medendi L. 3. S. 2. C. 1.

„ unius eorum mentionem facere. Cum
„ enim . . . nobilis adolescens 22 anno-
„ rum Medicum . . . vocasset, retulit
„ se vehementem dolorem alterius oculi
„ pati cum acrium lacrymarum effluxu;
„ Medicus vero collyrium album, quod
„ opium recipit, oculo instillare præce-
„ pit. Verum eo remedio adhibito do-
„ lor fluxione retenta augebatur. Ego
„ vero accersitus ac re intellecta præce-
„ pi, ut pilularum sine quibus 3j ea
„ nocte assumeret, solum autem ovi al-
„ bum instillaret. Cum autem mane ad
„ ipsum vilendum accessi, eum profecto
„ sine dolore, fluxione, et inflammatio-
„ ne inveni purgatum,,. Quin etiam
sunt ophthalmiæ, in quibus plus cathar-
ses quam sanguinis missiones proficiunt. Ita
observante J. HUXHAMO (g) mense Ju-
lio A. 1746 „ ophthalmiæ per plurimæ
„ cum epiphora maxima atque acerrima,
„ dolor dentium porro plurimos torquet:
„ in utrisque crebra catharsis juvat magis
„ quam missio sanguinis,,. Et sane in
saburralibus ac biliosis maxime febribus,
quæ sanguinis missionem haud facile fe-
runt, rubores oculorum illis adeo fami-
liares sola cathartica penitus sæpe delent,

(g) Opp. phys. Tom. I. Vol. 2. p. 341.

quemadmodum in binis puellis ejusmodi febre cum petechiis oculisque perquam rubris passis observavit C. STRACK (b).

§. 41.

Cautelæ tamen quæpiam in cathartice adversus ophthalmiam exhibendis tenendæ sunt, videlicet illorum

I. *Selectus*, eccoproticane an drastica præbenda sint? De his ita F. HOFFMANNUS (i) „ de purgantium (ait) „ usu tenendum, corporum et naturarum „ diversitati eundem esse accommodan- „ dum. Si res mannatis, tamarindinatis „ et tartareis expediri potest, non con- „ fugiendum ad acriora. Alias in tor- „ pidioribus et phlegmaticis pilulæ effi- „ caciores, uti tartareæ et de succino „ CRATONIS, vel tutius nostræ bal- „ samicæ, aliquoties porrigendæ „ Et sane non pauca sunt, quæ drastica præberi dissuadent, præsertim vero appetitus, digestionisque labefactatio, ac virium vitæ, quæ hic opus est, prostratio: unde interdum ophthalmia ex acuta eva-

(b) Obs. med. de morbo cum petechiis ægrot. 14. 15.

(i) l. c. caut. §. 3.

dit chronica, solis deinde roborantibus oppugnanda. Interdum tamen reperire est corpora, quæ non nisi depleto repente et insigniter vasculoso systemate convalescunt, cujusmodi fuisse videtur vidua prope septuagenaria apud V. RIEDLINUM (*k*), quæ a scabie manuum dato ter cathartico ex ꝥ^o dulci et magist. jalappæ, tum subjuncto usu essentiæ purif. CLAUDER, ac demum adhibito litu ꝥ^{li}, vindicata post mensem incidit in utriusque oculi ophthalmiam humidam acrem dolentemque adeo, ut summovertit omnem somnum. Præscriptum ergo epithema e pomo cocto, pane similagineo, croco et lacte parandum, et catharticum idem fere, quod in scabie datum quantitate, quæ in triduum sufficeret; sed anus omne una dosi abliguriens in hypercatharsim incidit, ex qua viribus collectis ab ophthalmia quoque evasit libera. Similis quoque referente J. A. REIMANNO (*l*) est „ historia viri prænobilis, qui „ in juventute sua valde obnoxius fuerat „ ophthalmiis, . . . Dantisci existens „ frustra prius in consilium vocatis Me- „ dicis ejusdem urbis primariis ab em-

(*k*) Lin. med. ann. 6. Januar. 7. p. 27.

(*l*) l. c. p. 126.

„ pyrico et circumforaneo quodam bre-
 „ vi curatus est, assumendo per 7 dies
 „ continuos purgans drasticum, quod 30
 „ vicibus eum sellulare cogebat; quibus
 „ quidem artibus vix non enecatus est,
 „ ita ut de vita sollicitus alterius consilio
 „ uti debuerit, immunis tamen ab omni
 „ ulteriori recidiva in præsens vixit „
 In primis vero valentioribus cathartici-
 locus est, ubi mitiora in cassum fuere
 exhibita, id quod expertus est H. RID-
 LEY (m): „ juvenis quidam tempera-
 „ menti biliosi, et habitus corporis ma-
 „ cilentij, molestissima humorum defluxi-
 „ one oculum unum obsidente graviter
 „ per septimanas duas laborabat. Pluri-
 „ ma collyriorum et cataplasmatum for-
 „ ma medicamenta juxta amicorum nunc
 „ unius nunc alterius sententiam compo-
 „ sitorum frustra expertus, tandem ope
 „ mea usus est. Cum igitur ægrum præ
 „ dolore ab inflammationis vehementia
 „ orto adeo torqueri viderim, statim...
 „ phlebotomiam ad ℥xij, et ejusdem re-
 „ petitionem, interposita purgatione le-
 „ ni ex ∇^x purg. ℥ssij cum mannæ ℥jss
 „ et ☐ vitriolat. ℥j etiam ad aliam vicem

(m) Observ. med. pract. 14, p 53 sqq.

„ cum alia insuper purgatione, si nihil
 „ mitius se haberent symptomata, con-
 „ sului; verum in cassum, adhuc urgente
 „ membranæ adnatæ etiam et palpebra-
 „ rum inflammatione cum ingenti et
 „ dolorifica laticis aquosi et acris effu-
 „ sione, ita ut penitus fere interrompe-
 „ retur somnus, et omnium ciborum a-
 „ versio sequeretur. Ad collyria igitur,
 „ extorta prius aliquali ab exhibito hau-
 „ stu paregorico symptomatum alleva-
 „ tione confugere coactus, sequens (quo
 „ melius hisce casibus in praxi haud ex-
 „ pertus sum, adjuncto vitriol. alb. gr.
 „ ʒss, quoties inflammationis expers sit
 „ defluxio) præscripsi;

R. Aqv. plantag.

—— spermat. ranar.

—— rosar. rubr. aa ʒj

Tutia optimæ ppt,

Ceruss. opt. lotæ

C. C. usti aa ʒj

Sacch. Saturn. ʒss. M. F. Colly-

„ rium, quod ex spongia admodum mol-
 „ li exceptum in oculum ter quater vel
 „ ad libitum in die instilletur, et exter-
 „ ne etiam leviter aliquoties ei applice-
 „ tur. Hoc autem, prout etiam aliquo
 „ alio a nobili quadam admodum cele-
 „ brato, ne hilum hic proficientibus ad
 „ usum cataplasmatidis ex medulla panis

„ albi cum vitello ovi, adjecto ol. rosac.
„ tantillo compositi, et ultimo ad lini-
„ mentorum camphoratorum, et indolis
„ quantum potuerimus anodynæ usum,
„ interea etiam vesicatoriis amplis inter
„ scapulas et intercipientibus emplastris
„ ad tempora applicatis, successu quidem
„ necquicquam adhuc feliciori nos rece-
„ pimus. Quocirca post aliquot dies
„ horum usu necquicquam cedente mor-
„ bo inutiliter insumptos, inflammatione
„ etiam jam oculum alterum vel pari
„ atrocia petente, accedente item præter
„ dolorem egregia utriusque oculi visus
„ diminutione, alia quam primum me-
„ thodo qua contumacissimum periculo-
„ sissimumque hoc symptoma dimovere-
„ mus, ad humorum videlicet acrimo-
„ niam corrigendam præcipuo colliman-
„ tem modo sequenti aggressus sum:

R. Extr. Rud. ʒj.

Calomel. gr. xij

Ref. jalapp. gr. iij. M. F. pil. ʒ

„ deaurandæ, primo mane sumendæ, et
„ aliquamdiu superdormiendo, cum re-
„ gimine. Copiosa et benigna secuta est
„ operatio, postea plurimum remittente
„ inflammatione, ita ut ex earum ad 3
„ vel 4 vices, interposito unius vel
„ duorum dierum intervallo, repetitione
„ ad pristinam oculorum sanitatem et vi-

„ sus aciem restitutus sit ... Verum in
„ ipsis etiam drasticis cathartics aliquo
„ opus est delectu, monente id H. BOER-
„ HAAVIO: (n) „ alterum (inquit ille)
„ auxilium est purgatio alvi fortissima,
„ sed præmissa prius sanguinis missione.
„ Subducitur autem alvus per acria san-
„ guinem solventia, non per stimular-
„ tia calida, ut SYDENHAMIUS me-
„ net; alias morbus augetur. A pur-
„ gantibus enim sanguis sæpe movetur;
„ et febricula excitatur. Purgatio autem
„ debet esse satis violenta, idque si fieri
„ possit ad initium levis animi deliqui,
„ quod oritur; quando tantus stimulus ad
„ mesenterium adest; ut omnia liquida
„ cum impetu eo affluant; et circa in-
„ testina moveantur; superiores autem
„ partes ita liquantur, ut sufficiens san-
„ guis in cerebrum non preatur (pella-
„ tur), ut spiritus inde in satis magna
„ copia secerni possint. Oritur tunc si-
„ mul oculorum pallor, quem in hoc
„ morbo tanti facit HIPPOCRATES:
„ Lenia autem debent esse hydragoga;
„ quæ nempe serum attenuant, et ex va-
„ sis mesentericis educunt, non nimis a-
„ cria, ut euphorbium &c. sed debiliora,

(n) De morbis oculorum §. 57. p. 98. sq.

„ inter quæ princeps est diacrydium et
 „ jalappa, admixto ꝑ^{io} dulci. Adhi-
 „ benda autem sunt purgantia una vel al-
 „ tera hora post Væ Semi eodem adhuc
 „ die. Hinc pro robusto homine

℞. Diacrydii gr. xvij, cum

∇^a cichorei f. a. F. emulsio; cu-
 jus a fecibus separatæ ʒj adde

Syr. ros. solut. c. senna ʒj

ꝑⁱⁱ dule. tenuissime triti gr. xvj.

„ M. F. haustus. Quando hoc medica-
 „ mentum operationem suam absolvit,
 „ plerumque remittit morbus, et metus
 „ suppurationis cessat. Idem medica-
 „ mentum in forma pulveris dari po-
 „ test, e. g.

℞. Scamonei purissimi gr. xiv

ꝑⁱⁱ dulcis gr. jx. M. F. ʒ, qui
 „ facile hauritur, et ipsis infantibus in
 „ minori dosi dari potest, v. g.

℞. Diacrydii gr. v.

ꝑⁱ dulcis gr. ij vel iij.

„ Ex eodem pulvere fieri quoque pos-
 „ sunt pilulæ, v. g. si addatur electua-
 „ rium aliquod aut syrupus rosarum solu-
 „ tivus,,. SWIETENIUS(o) quoque hinc
 Præceptoris sui methodo plurimum tri-
 buit. Imo curata jam ophthalmia ad

opacitatem corneæ superfitem idem prorsus faciendum vult BOERHAAVIUS (p) :
 „ si (inquiens) opacitas post curationem
 „ adsit, moneendi sunt (amici), fortissimi
 „ ma medicamenta esse adhibenda, Væ
 „ Ses nempe ad animi deliquium usque,
 „ et copiosæ purgationes ex § 10, ut
 „ semper fere et continuo alvus fluat.
 „ Ita sæpe oculi jam tum turbati pellu-
 „ ciditatem recipiunt. Curavi aliquan-
 „ do hoc modo nobilem virginem, cui
 „ quotidie dedi resinæ jalappæ & § ii
 „ dulcis aa gr. x; post horam autem vel
 „ semihoram, quando illa medicamenta
 „ sanguini misceri incipiebant, dabamus
 „ clyisma, ut vis § ii ad inferiora deri-
 „ varetur: vesperi autem semper daba-
 „ mus opium. Sic obscuratam corneam
 „ restitui in hac virgine... Quantum
 „ vero ab his remediis Cl. Vir expectet;
 „ colligere est ex iis, quæ subdit (q): „ in
 „ praxi (ajens) videbitis, quam irrita
 „ sint sæpe reliqua medicamenta; hisce
 „ neglectis,,.

2. Iteratio.

(p) l. c. §. 64. p. 58.

(q) Ibidem p. 59.

2. *Iteratio.* „ Neque unica purgatio
 „ sufficit, sed ea per intervalla repeten-
 „ da, si morbus in longitudinem abeat „
 inquit L. RIVERIUS (r). Quo in casu
 autem non jam acria illa e scammono, jalappa ac \S^{10} dulci, ut paulo ante dictum, sed lenissima tantum eccoprotica locum habent, e tamarindis, manna, sen-
 na, &c. quæ alvi continuo apertæ tenen-
 dæ causa quovis 2^o vel 3^o die præberi
 consulit A. STÖRCK (s). Quod si vero
 majoribus ex intervallis porrigenda fue-
 rint, v. g. 4^o 5^o &c. quovis die, hy-
 dragoga quoque, at provida manu, da-
 ri possunt, præsertim in malo contuma-
 ciori vel vehementiori; cujus rei com-
 plura felicia exempla habentur. Apud
 A. E. BÜCHNERUM (t) infans 2½ anno-
 rum ophthalmia serosa tam acri labora-
 bat, ut serum partes vicinas pene ad ossa
 usque excoriarit, et exulcerarit; quam
 tamen repetita cathartica \S lia, diapho-
 retica, ac vesicantia prorsus abegerunt.
 Hujus quoque loci est observatio G. C.
 ARNOLDI (u): „ mense Junio juvenis

(r) Praxeos med. L. 2. C. 8. p. m. 251.

(s) Præcept. med. pract. Tom. 1 p. 84.

(t) l. c. A. 1729. April. Cl. 2. art. 2. p. 235.

(u) Obs. phys. med. A. 1772 Obs. 5. p. 46.

„ 23 annorum, qui sæpe ophthalmia fero-
„ sa laborabat, in eandem incidebat.
„ Constitutionem quidem bonam habe-
„ bat, uti in hac ætate solet esse, absque
„ manifesta tamen plethora vera, cete-
„ rum succis quidem abundabat. Cum
„ chirurgus casu fortuito ad eum intra-
„ ret, et videret magnam rubedinem
„ oculorum, eorumque lippitudinem,
„ audax fecat venam in utroque pede.
„ Satis magna copia sanguinis detracta,
„ interea quod cruor de vulnere aper-
„ to adhuc fuisset, illico palpebræ clau-
„ duntur, ita ut eas a se invicem dedu-
„ cere, aut oculos ipsi aperire impossi-
„ bile fuerit. Sic cæcus sedens misit
„ ad me die cæcitatis 5^o. Accedens ad
„ ipsum oculos perfecte clausos inveni,
„ nullo conatu proprio nec manu aperi-
„ endos. Palpebræ rubebant, nec duræ
„ erant. Pulsus erant æqualis depressus
„ et debilis. Cum autumarem hanc oc-
„ clusionem palpebrarum potissimum ori-
„ ginem ducere ex debilitate levatorum
„ palpebrarum, et ex impedito circuitu
„ humorum tenuiorum circa eosdem aut
„ antagonistas eorum, ob vim circuli
„ rubri fractam, jussi lavare oculos omni
„ bihorio cum aqua admodum frigida.
„ Sequenti die dedi summo mane radi-
„ cis jalappæ pulverisatæ drachmam se-
„ millem in aqua, copiose superbiben-

„ do decoctum tenue ex avena decorti-
„ cata paratum. Sedes habuit decem.
„ Lotionem cum aqua frigida continua-
„ vit; licet post eam palpebræ admo-
„ dum dolerent. Die suæ cæcitatis 7^o,
„ qui hunc sequebatur, sub quolibet o-
„ culo sentiebat pruritum; cumque locum
„ prurientem scalperet digito, mox pro-
„ rumpebat ex eo sanguinis copia ingens
„ quæ 3vj longe ascendere videbatur.
„ Locus erat sub margine inferiore or-
„ bitæ singuli lateris, simili fere di-
„ stantia ab oculo et naso. Statim pal-
„ pebræ per 7 dies clausæ aperiuntur,
„ visus restituitur, et vulnus utrumque
„ formato thrombo sponte clauditur vel
„ obturatur. Ast cum oculus ipse admo-
„ dum ruberet, jussi utrique applicare
„ pomum balneo sicco coctum, cujus
„ pulpæ indere pauxillum camphoræ præ-
„ cepi. Hujus tepida sæpe reiterata ap-
„ plicatio, et datum purgans ex pulve-
„ ris radicis jalappæ 3ß quod sequeban-
„ tur 6 sedes, tantum profuerunt, ut
„ albuginæ sugillatio proffigaretur, quin
„ oculi ventum perferrent. Triduo ela-
„ pso denuo exhibui dosin similem radi-
„ cis jalappæ in pollinem redactæ cum
„ gr. ij terrei acuatam. Ita convaluit
„ continuata saltim lotionem cum aqua fri-
„ gida die ab inchoatione occlusionis

„ palpebrarum 12° „. Eundem hæc re-
 media successum habuere in casu L. R I-
 VERII (x): „ elegans et venusta puel-
 „ la x. . 18 annos nata a 3 vel 4 annis
 „ fluxionem patiebatur in oculum fini-
 „ strum procumbentem, qua totus ocu-
 „ lus, palpebræ, et partes etiam circum-
 „ jacentes tumore ac rubore afficieban-
 „ tur: unde pulchra illius facies defœ-
 „ dabatur. Autumno præcipue ingra-
 „ vescebat affectus, et tota hyeme per-
 „ severabat, neque Væ Sæ aut purgatio-
 „ ne ex potionibus et apozematis, aut ve-
 „ sicatoriis, aliisque remediis quam plu-
 „ rimis, quæ frequenter et frustra ulur-
 „ pata fuerant, sedari potuerat. Tandem
 „ incunte autumno, quo morbus pari-
 „ tum ferocia rediit, potentioribus re-
 „ mediis uti vitam est ad fluxionis con-
 „ tumacis radicem extirpandam. Itaque
 „ loco apozematis, quo antea usa erat,
 „ præscribo pilulas aperientes et diapho-
 „ reticas ex salibus tamarisci, ablynthii,
 „ magisterio tartari et ʒi diaphoretico,
 „ de quibus capiebat duas mane tribus
 „ horis ante prandium, et totidem ante
 „ cœnam per 4 dies: 5° die sumpsit pi-
 „ lularum catholicarum 36, quibus opti-

(x) Observ. medic. Cent. 1. Obs. 7.

„ me purgata est; unde rubor et inflam-
 „ matio valde imminui cœperunt. Sum-
 „ pfit iterum pilulas aperientes per 4 dies,
 „ et 5^o pilulis catholicis purgata est fe-
 „ liciter: ac paucis postea diebus oculi
 „ rubor omnino evanuit, neque amplius
 „ reversus est . . . In hac curatione mis-
 „ sus non fuit sanguis, quamvis ægra
 „ prædita esset sanguineo temperamento;
 „ quia paucis antea diebus detractis fu-
 „ erat tum ex brachio tum ex malleolo.
 „ Sed peracta curatione decoctum men-
 „ ses promovens præscriptum fuit, quia
 „ illos imminute patiebatur. Illud autem
 „ decoctum tale fuit:

℞. Rad. althææ et

— valerianæ aa ʒj

— fœniculi

— asparagi et

— apii aa ʒvj

Fol. betonicæ

— pimpinellæ

— ceterach

— artemisiæ

— sabinae aa M. j. bulliant omnia

„ in decocto cicerum rubeorum ad 4 in

„ v. In colatura dissolve sacchari albi

„ ʒiij. F. apozema clarificatum et aro-

„ matifatum ʒij cinnamomi et ʒj croci

„ quatuor dosibus matutinis, quas capiat

„ 4 diebus, antequam menses prodeant.

Quod si vero cathartica quotidie sumenda sint, ut artificiali diarrhœa sit opus, nil hic acidulis est præstabilius, quæ simul aliis compluribus indicationibus explendis intervium. His aquis vetustæ sæpe ophthalmiæ manus victas dedere. Sedlicenses 6 vel 8 diebus hauriendas commendat SCHMUCKER (y), et Carolinæ sæpe se se jam his in casibus probaverunt, quales complures memorat J. C. TILLINGIUS (z), nempe „ puella „ annorum 18, corporis habitus maxime laxi, varia sed frustra adhibuerat „ medicamenta a Medico docto per aliquot annos suppeditata ob ophthalmiam chronicam serosam. Tandem adibat „ nostros fontes salutare, quorum usus „ binis annis adhibitus omnem morbum „ sanabat, eaque constantia, ut deinde „ non rediret, licet furore quodam aliquoties incenderetur nupta, et sæpius „ catarrhosis fluxionibus obnoxia esset. „ Monachus jam senectute proventus, „ insigni corporis robore gaudens, offendebatur, hemicrania et gravi ophthalmia serosa, qua non solum visus oculorum obtundebatur, sed oculi quoque

(y) l. c. p. 499.

(z) Obs. med. singul. circa verum usum thermar. Carolin. obs. 34. hist. 5. 6. 7. 8. 9.

„ pannum rubrum referebant. Haurie-
„ bat A. 1744 fervidissimas thermas cum
„ interpositis laxantibus antiphlogisticis,
„ et ophthalmia cessabat . . . Puella an-
„ norum 20 decimo ætatis anno labora-
„ bat variolis copiosis, et 12^o infestaba-
„ tur ophthalmia serosa gravissima,
„ qua oculi undiquaque rubebant. Ex
„ haustu thermarum furiosi fontis, et
„ interpositis laxantibus mannat, quæ
„ ad sananda mala ex variolis reliqua
„ in primis prodesse creduntur, sani
„ fiebant oculi, nulloque deinde affli-
„ gebatur vitio eorum, nisi hoc uno le-
„ viore, quod in talibus ægris semper
„ observavi, quo ex consuetudine de-
„ figere solent ad terram oculos, quod
„ ignari pudicitie indicium interdum
„ interpretantur. Puella 18 annos nata
„ et sanguinea mensium fluxum expe-
„ riebatur nimis parum, ex quo non
„ solum oculi rubebant, sed manus quo-
„ que tangebant. Utebatur thermis no-
„ stris 9 abhinc annis, et licet parum
„ levata domum rediret, tamen inse-
„ quente anno non solum menses copio-
„ sius fluebant, sed oculorum rubor
„ quoque evanescebat. Repetit quoque
„ cum fructu eodem anno thermarum
„ usum externum æque ac internum.
„ Adolescens annorum 18 studiis operam

„ navans, paulo tenerioris corporis ha-
„ bitus et mollioris, habuerat superiori
„ anno in tibia ulcus, quo consolidato
„ ophthalmia sequebatur serosa ab omni
„ potu exæstuante exacerbata. Cum in-
„ signis apud ipsum esset nausea ad omnia
„ medicamenta, dedi tandem, antequam
„ cubitum iret, salis amari semunciam,
„ et primo mane diei insequentis iussu
„ haurire, quæ ad molam bulliunt,
„ thermas, quas mox vomitu rejiciebat.
„ Substitui ergo, quæ ex furioso fonte
„ prorumpunt; et res bene succedebat.
„ Sexto die proveniebant scabiosa exan-
„ themata, levisque suboriebatur in tibia
„ dolor, ubi ulcus olim fuerat. Die
„ 15^o oculi paululum rubebant, in pri-
„ mis palpebræ, minus tamen 16^o, quo
„ exhibui $\frac{1}{2}$ em rhabarbarinum cum tem-
„ perante, et post bibendo thermas,
„ sed nimis celeriter, sequebatur pri-
„ mum vomitus pituitosus, deinde aquo-
„ sus, cum quadam virium defectione.
„ Æger quidem non dum sanatus abibat;
„ insequente tamen anno rediens de sa-
„ nitate recuperata gaudebat, usumque
„ magna cum utilitate repetebat,,.

3. *Contraindicatur* autem cum eme-
ticorum tum catharticorum, præ primis
fortiorum ac reiterandorum, usus in cor-
poribus debilibus, laxis, ac pallidis,

nisi manifesta saburræ præsentis adfuerint indicia; eo quod plus alioquin iis lædantur, ut postmodo (a) sumus vituri.

CAPUT II.

S O L V E N T I A.

§. 42.

Postquam vasa pro eo ac par erat, depleta fuerint, si lentore peccent humores, frangere eundem oportet, ut illi reddantur maxime fluxiles, stasesque eorum in vasis oculorum quantocyus possint auferri: solventia proinde in usum tunc vocare oportet, eaque pro ratione et indole ipsius lentoris varia, et quidem

1. *Nitrum* in lentore phlogistico longe omnium efficacissimum, cuius magnis dosibus post sanguinem detractum exhibitis sub idonea diæta omnem fere curationem tribuerdam esse contendit ROWLEY (b).

(a) Vide §. 43 No 2.

(b) l. c.

2. *Aquæ minerales* multo fale et aere fixo ptæditæ in chronicis præsertim ophthalmiis a pertinaciori humorum lentore oriundis sæpe omnibus aliis remediis irritis solæ curationem absolvunt: quæ id simul utilitatis adferunt, quod morbosam materiam attenuatam ac dilutam per vias lotii blande e corpore citra turbas evehant; cujusmodi sunt aquæ Freyenwaldenses, Piperinæ, Pyrmontanæ, &c. Freyenwaldensis fontis aquis plures ab ophthalmia liberatos narrat J. D. GÖHLIUS, quos inter vidua (c) erat „ laborans „ . . . ophthalmia serosa cum nocturnis „ conglutinationibus palpebrarum, vi- „ susque hinc debilitatione, quæ diutur- „ næ et per triennium duranti cephalal- „ giæ supervenit. Ad fontem accessit, „ postquam varia, scarificationes, vesi- „ catoria, ut et semel Væ Sem in bra- „ chio, purgantia, et diaphoretica in „ cassum usurpaverat; imo ipsam quo- „ que salivationem sustinuit, cui adscri- „ bit, quod post illam non satis sollici- „ te tractatam fluori albo simul obnoxia „ facta. Cum successu itaque ad oculo- „ rum affectum aquas nostras potavit,

(c) l. c. Dec. 1. Vol. 5. Sect. 2. No 57 p. 69.

„ balneaque pro infessibus æque prospere
„ usurpavit: eandemque adeptam mede-
„ lam ita perstitisse . . . iterum ad
„ fontem nostrum accedens verbis con-
„ firmavit; fluoris albi autem fluxum
„ neutiquam percuratum esse retulit „.
Porro (d) „ puer 10 forte annorum . . .
„ diu habituali ophthalmia in utroque
„ oculo laborans, ad eandemque multis
„ remediis in cassum usus, per aquarum
„ saltem matucinam moderatam et ordi-
„ natam potationem, interpositasque la-
„ xationes, admodum et constanter resti-
„ tutus fuit. Ita et judæus juvenis . . .
„ habitualibus et periodicis oculorum in-
„ flammationibus diu quoque afflictus,
„ nebulisque hinc in pupilla relictis,
„ per æstivalem hanc curam ad fontem
„ Freyenwaldensem institutam recursum
„ inflammationis admodum discussit „.
Denique (e) „ quæ a variolis relictæ man-
„ sit ophthalmia in quam plurimis quot-
„ annis exemplis ibi dissipatur. In pro-
„ pria mea filia, cui tale quid per perio-
„ dos contigit, effectus vidi semper ad-
„ modum promptos, ita ut vix per o-

(d) Ibidem Vol. 7. Sect. 1. p. 54.

(e) Ibidem Dec. 2. Vol. 6. Sect. 1. No 5.
p. 23.

„ctiduum ibi commorata, sed aquis sal-
„tem pro nutrimento usa, mutatio-
„nem in melius senferit. Ita studio-
„sus theologiæ . . . gravi serosa ocu-
„lorum inflammatione . . . infestatus,
„quam a pueritia per periodos, ob ha-
„bitum jam tum nactum, sæpissime ex-
„pertus fuit, ut magnam etiam visus
„debilitatem, lucubrandique impoten-
„tiam inde nactus sit, nullis aliis reme-
„diis cedente, ad fontem nostrum se
„conferens brevi tempore in plenum ab
„illa per aquarum potationem, balneo-
„rumque alternis diebus institutorum
„usum, liberatus fuit „. Generatim
vero notat Auctor (f) „ophthalmia (in-
„quiens) quo magis recens est, et in
„fervida consistit congestione, eo mi-
„nus quadrant balnea; ubi autem chro-
„nicum induit habitum, et plures alias
„medicationis methodos per laxationes,
„vesicatoria, collyria varia, &c. inani-
„ter excussit, valentiolem non vidi cu-
„ram, quam quæ sit ad fontem Freyen-
„waldensem „. Pyrmontanæ vero aquæ
in sequenti F. HOFFMANNI (g) casu se
se probavere: „femina 42 annorum,

(f) Ibidem.

(g) l. c. Observ. 2.

„ sangvinea, obesa, scorbutica, et glan-
„ dulas in collo tumefactas gerens, post
„ retentum mensium fluxum corripieba-
„ tur oculi sinistri dolore ac rubore cum
„ ejusdem lateris cephalalgia ad, dum
„ vehementi. Liberata primum annum
„ postea semper mense Octobře hujus
„ mali experta est recursum, sub quo
„ appetentia erat prostrata, lucem ferre
„ non poterat, et feri ex oculis copio-
„ sum stillicidium semper experiebatur,
„ quod per aliquot menses persistebat.
„ Pluribus usa remediis, sed in cassum;
„ et notabile erat, quod quoties sal vo-
„ latile oleosum sumeret, toties soporem
„ et torporem ingentem capitis patere-
„ tur. Ut itaque hic affectus, qui per
„ triennium ægram mirum affligerat, ra-
„ dicitus extirparetur, acidulas Pyrmon-
„ tanas æstate sub debito regimine pota-
„ bat: quibus etiam alvus et urina opti-
„ me secessit, et ipsa postea a contuma-
„ ci malo est liberata „ J. REYDT (b)
meminit feminæ conferto exanthemate et
ophthalmia serosa affectæ, quæ usu aquæ
piperinæ prorsus convaluit, ruborē ocu-
lorum intra 3 vel 4 dies abactō.

(b) Hydrophylasii 1 Th. 12 Cap. Obs. 2.
p. 170.

3. *Lumbricorum terrestrium succus.*
 C. PEZOLDI (i) Eques hæmoptoen aliquoties perpessus incidit in dolorem ischiadicum cum ophthalmia; ab utraque autem ægritudine sumpto lumbricorum terrest. succo convaluit. Analogum huic est, quod A. STÖRCK (k) perinde hic utile reperit, nempe „ophthalmiæ venereæ quæ sæpe nec salivatione, nec usu fortissimi sublimati corrosivi potuerunt emendari; solis pulveribus „(hisce) curatæ sunt:

R. Scamm. gr. vj.

Milleped. pp. 36

Stib. diaph. non abl. gr. xv. M.

„ F. pulvis, parentur tales No viij,
 „ et sumat æger mane et vesp. j „.

4. *Cicuta*, si lentor strumofus, scrophulosusve ophthalmiam induxit, ad illud emendandum est efficacissima. LEMOINE (l) curandum habuit cerdonis filium diuturna utriusque oculi inflammatione cum palpebrarum infarctu, crassitie labiorum, glandularum colli tumore, pallore faciei, verbo cum habitu scro-

(i) Observ. med. chir. 41 p. 73.

(k) Ann. medic. 2. p. 225.

(l) ROUX Journ. de Medecin. &c. T. 37. Fevr. 1772 p. 132. sq.

phuloso, laborantem. Huic, præter decoctum lapathi, bis quotidie præbuit cochl. j. syrupi de cicuta et rapa; oculis farinæ resolventes cum fœcalina ad æquas partes admotæ, dein pulpa pomorum acido-dulcium, et bis terve per diem eluebantur infuso e sem. fœniculi cum sacch. candi in vino albo: his interposita justis ex intervallis cathartica. Convaluit, superstitibus tantum duabus corneæ maculis, quæ fumigationibus etiam cessuræ sperabantur. Observavit Auctor extractum cicutæ lentius agere suo syrupo. Hinc et E. G. BALDINGER (m) præfert dicto extracto electuarium ex 8 partibus mellis ad unam pulveris cicutæ siccatae; quod se multiplici experientia edoctum fuisse testatur.

5. *Arnica flores* in ophthalmia scrophulosa et a saburra lenta primarum viarum recrudescente utiles se se præbuere teste NOSE (n) in puella rustica 13 annorum, ab anno jam innumeris colli scrophulis cum ceteris quoque hujus cachexiæ signis deturpata, ac diuturnam ophthalmiam perpessa, quæ menses non dum

(m) Neues Magaz. für Aerzte 3 B. 4 St. p. 344.

(n) E. G. BALDINGER neues Magazin für Aerzte 3 Band. 1 St. p. 5. sqq.

experta præter subdulcem oris quandoque saporem ceretroquin de nulla alia requerebatur. Præparato itaque corpore datus *Qus* emet. et *Ypecacuanha*, et postmodo florum *arnicæ* (quod resolventes simulque tonici essent) periculum factum, quorum infusum, præter potum communem e carice aren. LINN. paratum, bis de die haustum, et porro gr. x cum saccharo primum ter, dein quater per diem data. Leves tantum inde nausæ obortæ; et dolor ardens cum oculorum nunc ubertim fluentium tum minorum colli scrophularum adauctus: urina vero toto curationis tempore mansit clara, straminea, sine sedimento, nisi quod admodum raro levis ei nubecula inesset. Die 15^a Februarii (cujus 10^a curationis initium factum) pulveres granis ij aucti et quinques per diem dati: unde levis oborta diarrhœa brevi iterum desit; at oculus dexter 18^a jam multum emendatus 22^a prorsus sanus evasit: lævus vero multum adhuc plorans lente emendabatur. Cum autem insequentibus diebus indicia saburræ oculis quoque officientis adessent, die 28^a datum rursus emetico-catharticum optimo cum effectu. Die 7^a Martii ambo oculi prorsus erant sani, nisi quod subinde aliquatenus fierent lacrymosi: idcirco

circo iterum Æs granis ij aucti et quin-
quies de die exhibiti; ast infusum ob
nauseas denuo obortas non ultra 10^{am}
Martii amplius datum, ejusque dein lo-
co sex Æs sumpti. Ab his ophthalmia
omnino desit. At contra scrophulas nec
soli arnicæ Æs a 21^a Martii granis iij
et sensim pluribus aucti, nec cum flor.
O* martial. juncti, quidquam poterant;
quin imo, cum finiente Martio oculi ob
scuritatem denuo opacati a tertium dato
emetico educta ingenti vi muci biliosi
iterum recuperassent claritatem, sanique
deinceps mansissent, illæ exhibitis variis
ad finem usque Maji remediis nil cede-
bant. Eapropter puella, cetera hilaris
et alacris, remediorum ac frigidorum
præsertim balneorum, quæ crebro in
cassum adhibuit, pertæsa abiit.



CAPUT III.

D I A P H O R E T I C A.

§. 43.

Ubi copia humorum debite imminuta, lentorque illorum, siquis adfuit, satis emendatus, ophthalmiam reddidere initio-rem, nec nisi reliquix illius quædam supersunt, quas minimorum vasculorum atonia etiamnum fovere pergit, pulchre eas diaphoretica data abolere solent. Imo vero recentibus ea quoque ophthalmiis, quas imminuta excretio cutanea proritat, nec ultra taraxin procedere solent, non raro medentur, ubi alia quædam pauca præmissa fuerint remedia. Etenim F. HOFFMANNO (o) teste „divertens si-
 „ mulque discutiens egregia virtus inest
 „ diaphoreticis, quæ liberam perspira-
 „ tionem procurando non modo ab ocu-
 „ lis et capite ad corporis ambitum hu-
 „ mores agunt, sed et succos ab acri-
 „ monia falsa repurgant. In ipsa autem
 „ parte affecta inflammatoria stasis et
 „ internis et externis discutienda est.

(o) l. c. curat. §. 2.

„ Ex illis omnibus præferendum infusum
 „ theiforme ex radice valerianæ, liqui-
 „ ritæ, flor. sambuci, et semine fœni-
 „ culi, quod largius potandum, et ante
 „ potum vapor ipsius consulto sub tecto
 „ capite ad oculum admittendus,,. Quan-
 „ doque tanta horum remediorum est neces-
 „ sitas, ut iis neglectis omnia alia frustra
 „ sint. „ Insignis . . . ophthalmiæ casus
 „ memoriæ succurrit, ait G. HORSTI-
 „ us (p), juvenis cujusdam . . . in
 „ separatione metallica . . . conducti,
 „ qui mense Martio 1627 summis oculo-
 „ rum doloribus laborabat, ubi commu-
 „ nibus medicamentis adhibitis nihil
 „ quidquam levaminis sensit; donec me
 „ vocato purgans exhiberetur, quod

R. Extr. pil. Cochiar. ℥jss

℥ii dulc. ℥j

Diagryd. correct. ℥ss cum

Syr. de stæch. F. pil.

„ Hoc modo plurimum evacuato corpore
 „ sudorem imperavimus aliquoties exhi-
 „ bitis gr. x bezoartici mineralis: ubi
 „ miraculi instar, remotis omnibus topi-
 „ cis, dolor immensus evanuit,,. Sunt
 „ autem non nulla e diaphoreticorum clas-

(p) Obs. med. P. 2. L. 2, Obs. 25. Cas. 4.

se, quæ ceteris hic palmam præripiunt, videlicet :

§. 44.

1. *Lignorum decoctum*, quod impense commendat M. ETTMÜLLERUS (*q*) exemplo G. HORSTII (*r*); et vero non abs re, quippe quæ decocta in aliis quibusvis serosis lymphaticisque morbis tantæ sint efficacix : bene tamen Vratislavienses monent (*s*), non promiscuum illorum esse debere usum ; siquidem plethoricis magis obsint, quam profint. Utiliter sane decoctum hoc præbuit M. RULANDUS (*t*) mulieri 40 annorum ophthalmiam serosam dolorificam cum cæcitate diu perpeßæ, postquam plurima alia frustra fuisset experta. Huic primum catharticum datum

℞. Pilular. sine quibus ℥ii

———— aurearum ℥j

Trochisc. alhand. gr. iij.

℥^x scenic. q. s. F. pilulæ vij hora post cœnam sumendæ ; a quibus plurima variaque egressit. Postea per 10 dies datum decoctum ligni sancti

(*q*) Opp. T. 2. P. 1. p. 593.

(*r*) l. c. P. 1. L. 2. obs. 32.

(*s*) Histor. morb. Vratisl. p. m. 63.

(*t*) Curat. empyr. Cent. 8. sur. 61.

R. Ramentor. ligni sancti ℥j. Infunde in

∇^æ calentis ℥ xij per 24 h. tum coque ad consumptionem medietatis, colatura D. U. Sumat in aurora ℥viiij calide, vesperi autem trihorio ante cœnam ℥vj, stragulis probe tecta pro sudore. Post hunc oculis adhibita aqua ophthalmica Auctoris (u). Pro potu communi datum decoctum secundarium ligni sancti, affusis nempe feci prioris denuo ℥ xij ∇^æ et ad $\frac{3}{4}$ incoctis et colatis paratum. Atque sic sub diætâ bona intra 10 dies ægra prorsus convaleuit, visu quoque pristino recuperato. Magnæ quoque utilitatis sunt hæc decocta in ophthalmiis a syphilitidis reliquiis enatis profligandis. „ Juvenis Romanus, „ refert G. BAGLIVUS (x), per octi- „ mestre spatium gravi et summopere do- „ lorosa ophthalmia laborans doctissimo- „ rum Medicorum remedia semper irri- „ ta expertus est. Cum ad me venisset, „ singulasque morbi circumstantias sedu- „ lo considerassem . . . a me interpella- „ tus, an lue Gallica quandoque labo-

(u) Vide §. 72. I. C. No 5.

(x) Prax. med. L. 2. C. 9. S. 1. §. 5. p.m. 202. sq.

„ rasset ? Respondit , elapso octennio
 „ male tractatum fuisse a gonorrhœa
 „ Gallica , a qua post duos menses adhi-
 „ bitis opportunis remediis protinus eva-
 „ ferat. Quoniam vero impuræ hujus
 „ luis feminia per 30 et plures annos
 „ sanguini inhærere , ægrotosque vana
 „ sanitatis possessione illudere solent,
 „ interimque sub persona plurium mor-
 „ borum reviviscant , et Medicos turpi-
 „ ter decipiant ; statim decrevi ophthal-
 „ miam hanc Gallicam esse , exhibitaque
 „ longa potione , ad instar aquarum ther-
 „ malium , decoctionis fars. parillæ , an-
 „ timon. crudi , &c. post 10 dies circiter
 „ perfecte convaluit „

§. 45.

2. *Phosphorus* urinæ , de cujus effi-
 cacia in ophthalmia rebelli haud vulga-
 rem observationem M. A. BARCHEWI-
 TZIO (y) communicavit P. I. HART-
 MANNUS : „ matrona quædam 50 circi-
 „ ter et quod excurrit annorum per lon-
 „ gius temporis spatium ophthalmia
 „ complicata sanguineo-serosa misere af-
 „ flicta nihil proficientibus reliquis re-

(y) Diss. de phosphori urin. usu interno §. 15.
 (Præf. A. E. BÜCHNERO 4 Hale 1760).

„ mediis per 2 tandem hebdomades quo-
„ tidie cubitum itura duas soluti phos-
„ phori guttas aqua frigida temperatas
„ haufit, simulque bis aut ter per diem
„ eodem 20 partibus alcoholis vini per-
„ mixto superiorem palpebram modice
„ inunxit, dictoque temporis intervallo
„ ita convaluit, ut nullo deinde oculo-
„ rum vitio unquam laboraret.,,

§. 46.

3. *Sulph. auripigmenti* correctum in
ophthalmia seroso-catarrhali pertinaciter
recidivante post alia cassa unice profuif-
se vidit J. C. HILDEBRAND (z), scili-
cet „ vir . . . 57 annorum, temperamen-
„ ti sanguineo-melancholici, nullis a
„ juventute præter rebellem ophthal-
„ miam serosam, qua ante 24 annos per
„ spatium anni dimidii laboravit, obno-
„ xius fuit morbis. Præterlapso decen-
„ nio gravissimam cerebri commotionem,
„ quam e lapsu de scala altiori lapidea
„ et vehementi capitis ad axin antero-
„ rem rhedæ inferius locatæ ferro obdu-
„ ctam allisu reportavit, expertus est,
„ qua per triduum rationis, loquelæ,

„ omniumque sensuum usu privatus, ad-
„ hibitis congruis remediis feliciter tan-
„ dem restitutus est. Excepit anno ela-
„ pio gravissimum hunc affectum scabies
„ humida admodum rebellis, ægri pa-
„ tientiam per spatium 2 annorum misere
„ excrucians, quæ postmodum usu fonticuli
„ in brachio excitati et remedio-
„ rum antimonialium sublata 8 annos
„ gestato in brachio fonticulo, sed eo
„ etiam iterum consolidato, cum bra-
„ chium totum erosione cutis herpetica
„ affectum ulteriorem ejus conservatio-
„ nem interdixit, et nihil per 6 annos
„ præter naturam sensit, quam macilen-
„ tum corporis habitum et pathemata ab-
„ dominis flatulenta, sine dubio a vitæ
„ genere sedentario et appetitu sæpius
„ excedente profecta. Mense Martio
„ anni præteriti vir hic generosus a ca-
„ tarrho leviori liberatus, et remedio
„ laxante mannato usus, nihil tale co-
„ gitans mane tumore palpebrarum oculi
„ dextri, earumque conglutinatione af-
„ fectus est, et paucis interjectis die-
„ bus sinistrum oculum idem tumor cum
„ palpebrarum conglutinatione occupa-
„ vit. Adhibita statim et per aliquod
„ tempus continuata fuere remedia anti-
„ catarrhalia, et præcipue TRa sapona-
„ cea h. SCHULZII, itemque Jcs salis

„ no-rhabarbarini, interpositis remediis
„ laxantibus; sed ophthalmia in dies
„ gravior evadebat: siquidem mane
„ palpebræ per 2 horas conglutinatæ
„ manserunt, illisque adhibito foku aper-
„ tis serum mucoso-viscidum ex oculis
„ rubore et ardore affectis cum excoria-
„ tione et pruritu marginis utriusque
„ palpebrarum tumentis et insigniter ru-
„ bentis toto die largiter effluxit. Ad
„ serum tale viscidum per M. S. diffu-
„ sum attenuandum, ejusque affluxum a
„ capite derivandum, æger præmissa Væ
„ Sæ TRas alcalinas saponaceas, Æes sa-
„ lino-resolventes, sacculos discutientes,
„ quolibet octiduo laxantia anticatarrha-
„ lia, et alternis diebus pediluvia, per
„ 4 hebdomades non interrupto ordine
„ usurpavit, motu corporis equitando
„ et obambulando quotidie ad plures ho-
„ ras instituto, et exacta diæta observa-
„ ta. Ab usu horum remediorum æger
„ alvo quotidie ter et quater aperta
„ optime se habuit; verum ophthalmia
„ in dies gravior pejorque evasit, dum
„ tumor palpebrarum, earumque ardens
„ rubor, et effluvium feri viscidum cum
„ sensu titillationis marginum palpebra-
„ rum, quam successive major rubedo et
„ longior palpebrarum tempore matuti-
„ no conglutinatio excepit, continua.

„ runt. Mense Majo æger aquam Selte-
„ ranam, præmisso laxante mannato, bi-
„ bere incepit; sed ab illius usu ob tu-
„ morem, gravitatem, et ruborem pal-
„ pebrarum in dies auctum, et sensum
„ titillationis in marginibus earundem
„ intolerabilem, mox desistere coactus
„ fuit. Ad serum viscidum resollen-
„ dum et per inferiora eliminandum,
„ aqua Sedlicensis in usum vocata fuit;
„ ob eadem vero jam recensita sympto-
„ mata ab illa quoque desistendum fuit.
„ His remediis nihil proficientibus æger
„ mane infusum resolvens theeforme,
„ TR^{am} alcalino-fuccinatam ter de die
„ ad gtt. 40 et vesperi duas pilulas
„ Edinburgenses ab Ill. . . . BÜCHNE-
„ RO (a) correctas, interposito singulis
„ 14 diebus laxante anticatarrhali, as-
„ sumpsit; externe mane et vesperi fo-
„ tu et sacculis discutientibus et robo-
„ rantibus oculis prospexit, et in bra-
„ chio sinistro ad derivandum affluxum
„ vesicatorium applicari permisit, con-
„ tinuando pediluvia, motum corporis,
„ et diætam admodum restrictam. Per 4

(a) Diff. de medicam. mercurial. cum salib.
parator. enëac. per adjunctum Sulph. ad
certos quosd. morb. magis accommodanda
p. 38.

„ hebdomades hæc remedia , educto fi-
„ mul intra octiduum ope vesicatorii co-
„ pioſo ſero e brachio , in uſum voca-
„ ta ſunt eo cum effectu , ut oculi ſplen-
„ dorem lucis iterum perferre potue-
„ rint; verum effluuium ſeri mucoſo-
„ viſcidi ex oculis cum tumore et con-
„ glutinatione palpebrarum matutina-in-
„ definenter perſeveravit. Cum vero
„ ... æger , poſtquam antea intra triduum
„ alvum habebat apertam per 3 menſes
„ continuos quotidie quater et quinquies
„ alvum laxiorem expertus eſſet ſine ullo
„ ſeri mucidi ex oculis profluentis de-
„ cremento , optime ceteroquin ſe ha-
„ bens , iudicavi exinde glandularum o-
„ culi et ductuum palpebrarum excre-
„ toriorum relaxationem inſignem rebel-
„ lis huius mali et continuantis ſeri mu-
„ cidi effluuii rationem continere : id-
„ circo . . . infuſum per epicraſin la-
„ xans e ſale Sedlicenſi , ꝯ^e rhabarb.
„ cort. chinæ rad. gentianæ rubr. liquore
„ terræ ſol. ☐ri et infuſo ſummitatum mil-
„ leſolii paratum mane et pomeridie ad
„ 4 circiter uncias , et vespertino ſem-
„ per tempore pilulas duas Edinburgen-
„ ſes correctas , interponendo quolibet
„ octiduo per 4 dies limaturæ ♂ ꝯj cum
„ cort. cinnamomi gr. v conjunctum ,
„ bis de die cum vino Rhenano ſumen-

„ dum, et subjungendo ptisanæ resolven-
„ tis et tonicæ ulum pro potu ordinario,
„ insimulque externe collyrium WEIS-
„ BACHII ficcum e butyri Majalis illo-
„ ti ℥ss (cui ego meliori cum effectu
„ butyrum aliquoties cum aqua rosarum
„ lotum substitui) Tut. ppt. ℥ss , nihili
„ alb. gr. xv. sacch. ℥ni et vitriol. alb.
„ aa gr. vj paratum, vesperi cuilibet o-
„ culorum angulo exteriori pisi magni-
„ tudine applicandum, sedulo simul con-
„ tinuato pediluviorum, fots, et saccu-
„ lorum discutientium usu, præscripsi.
„ Quibus remediis per 3 hebdomades
„ continuatis, subsequente largiore alvi
„ excretionem et imminuta palpebrarum
„ titillatione, quæ initio a collyrii usu
„ per pauca temporis momenta auctior
„ evaserat, . . . æger sensim sensimque
„ a rebelli hoc affectu in totum libera-
„ tus est. Integro dein præterlapso
„ mense ad robur oculorum firmandum
„ aquam Schwalbacensem in usum duxit,
„ qua per 3 dies adhibita gravissima ite-
„ rum affectus est ophthalmia. Ego...
„ remedia laxantia, solventia, discu-
„ tientia et derivantia in et externa præ-
„ scripsi, sed frustraneo cum effectu.
„ Unguentum ophthalmicum Cl. D. D.
„ JACOBI in novis literariis Erfurten-
„ sibus publici juris factum, quod ægro

„ de meliori erat commendatum, ipse
„ paravi, et illud cum aqua ophthal-
„ mica MATTHIOLI applicandum cura-
„ vi; ejus vero ingratus et insperatus
„ effectus, dum titillatio marginum pal-
„ pebrarum in dies increfcens non folum
„ tumorem, gravitatem et ruborem pal-
„ pebrarum, fed etiam effluvium feri
„ vifcidi et conglutinationem palpebra-
„ rum adauxit, ulteriorem ejus inter-
„ dixit ufum. Reiteravi igitur præce-
„ dens infufum per epicrafim laxans, et
„ reliqua ibi recensita remedia, quibus
„ per 3 hebdomades continuatis ophthal-
„ mia fenfim fenfimque imminuta celfa-
„ vit. Hæc dum acta effent, confpectui
„ meo fe obtulit . . . commentatio . . .
„ BÜCHNERI (b), qua perlecta con-
„ dolui, quod nullam antea correcti
„ hujus fulphuris auripigmenti notitiam
„ habuerim, ratus futurum fuiſſe, ut
„ in hoc rebelli affectu efficax præbuiſ-
„ ſet remedium. Interea fulphur hoc
„ correctum cum TR^a ejusdem illico
„ parandum curavi, ejusque, ſi malum
„ hoc repullularet, periculum facere
„ decrevi. Elapſo 4 hebdomadum ſpatio

(b) De medicamentor. ex auripigmento præpa-
rator, præſtantiff. uſu, Halæ 1758.

„ generosus æger, cujus oculi hactenus ab omni immunes fuerant vitio,
„ mane titillationem leviozem in marginibus palpebrarum oculi sensit, quam
„ altero die effluvium feri viscidioris et
„ conglutinatio palpebrarum matutina
„ exceperunt. Ego . . . exhibita pilular. ☿ lium dosi, . . . mane ad gtt.
„ 40 TR^{am} sulphuris auripigmenti correcti, et vesperi quovis sulphuris
„ hujus gr. ij cum sacch. lactis Helvetici 3j, conch. citrat. et ♂ ii diaphoret. aa gr. v. præscripsi, conjuncto
„ ptisanæ demulcentis et tonicæ pro potu ordinario, collyrii WEISBACHII
„ sicci, fots et sacculorum discutientium usu, quibus remediis per
„ 14 dies adhibitis vir iste generosus ab ophthalmia hac serosa gravissima
„ sensim sensimque feliciter liberatus est,
„ et adhuc per aliquot menses . . . immunis a rebelli et contumaci hoc affectu vivit. Effectus, quem æger illico de his remediis sensit, potissimum
„ in auctiore, alias haud consveta, nocturna transpiratione et crebriore alvi
„ apertione consistebat: unde per spatium 6 hebdomadum eidem mane dosi
„ sin TRæ auripigmenti, et vesperi ♂^{em} cum sulphuris hujus gr. jss exhibui;
„ quorum remediorum usum magna . . .

„ mutatio secuta est; siquidem non so-
„ lum quovis mane in lecto facilem et
„ spontaneam auctiorem expertus est
„ transpirationem, quam subinde potu
„ thee promovit, unde ab hoc tempore
„ non solum affectus rheumatici ipsi
„ alias familiares cessarunt, sed etiam
„ quotidie alvum laxiorem obtinuit,
„ quæ antea segnior erat, et vix intra
„ biduum respondere solebat,,.

§. 47.

4. *Vinum* quoque huc referendum
venit, de quo HIPPOCRATES (c)
„ oculorum dolores (ait) meri potio aut
„ balneum aut fomentum aut Væ So aut
„ medicamentum purgans exhibitum sol-
„ vit,,. Carpitur vero, neque id im-
merito, ab A. C. CELSO (d), quod
cum quæ utilia hic sunt, recensuisset,
non item edocuerit, quando vel maxime
singula illorum in usum ducere oporteat:
„ curare . . . oculos (inquit is) sangui-
„ nis detractiōne, medicamento, balneo,
„ fotu, vino vetustissimus auctor HIP-
„ POCRATES memoriæ prodidit; sed

(c) Sect. 6. aphor. 31, et Sect. 7. aphor. 46.

(d) l. c. art. I. p. m. 280.

„ eorum tempora et causas parum expli-
 „ cuit, in quibus medicinæ summa est „.
 Hinc ipse singula ita digere, ut quo po-
 tissimum tempore unum quodque illorum
 sit administrandum, intelligatur. Cum-
 que Væ Se, cathartico, et abstinencia
 varioque topico pro re nata gravio-
 rem ophthalmiam per initia oppugnandam ef-
 se ostendisset, subdit demum (e): „ ubi
 „ vero aliquis relevatus est, jamque
 „ cursus pituitæ constitit, reliquias for-
 „ tasse leviores futuras discutunt bal-
 „ neum et vinum. Igitur lavari debet
 „ leviter, ante ex oleo perfricatus, diu-
 „ tiusque in cruribus et feminibus, mul-
 „ taque calida aqua fovere oculos, dein-
 „ de per caput prius calida tum egelida
 „ perfundi; a balneo cavere, nequo fri-
 „ gore afflatus lædatur: post hæc cibo
 „ paulo pleniore quam ex operum con-
 „ suetudine uti; vitatis tamen omnibus
 „ pituitam extenuantibus. Vinum bibe-
 „ re lene, subausterum, modice vetus,
 „ neque effuse neque timide, ut neque
 „ cruditas ex eo et tamen somnus fiat,
 „ lenianturque intus latentia acria. Sed
 „ si quis in balneo sensit majorem oculo-
 „ rum

(e) Ibidem art. 8. p. m. 284. sqq.

rum perturbationem , quam attulerat
(quod incidere his solet, qui manen-
te adhuc pituitæ cursu festinarunt),
quam primum discedere debet ; nihil
eo die vini assumere, cibi minus etiam
quam pridie : deinde cum primum sa-
tis pituita substitit, iterum ad usum
balnei redire. Solet tamen evenire
non nunquam sive tempestatum vitio
sive corporis, ut pluribus diebus ne-
que dolor neque inflammatio, et mini-
me pituitæ cursus, finiatur. Quod
ubi incidit, jamque ipsa vetustate res
matura est, ab his eisdem auxilium
petendum est, id est balneo ac vino;
hæc enim ut in recentibus malis aliena
sunt, quia concitare ea possunt, et ac-
cendere, sic in veteribus, quæ nullis aliis
auxiliis cesserunt, admodum efficacia
esse consuerunt : videlicet hic quo-
que, ut alibi, cum secunda vana fu-
erint, contrariis adjuvantibus. Sed
ante tonderi ad cutem convenit; de-
inde in balneo aqua calida quam pluri-
ma caput atque oculos fovere ; tum
utrumque penicillo detergere, et un-
gere caput irino unguento ; contine-
reque in lectulo se, donec omnis calor,
qui conceptus est, finiatur, desinat-
que sudor, qui necessario in capite
collectus est. Tum ad idem cibi vi-

„ nique genus veniendum est sic, uti
 „ potiones meracæ sint, obtegendumque
 „ caput, et quiescendum. Sæpe enim
 „ post hæc gravis somnus, sæpe sudor,
 „ sæpe alvi dejectio pituitæ cursum fi-
 „ nit. Si levatum est malum (quod ali-
 „ quando serius fit), per plures dies
 „ idem fieri oportet, donec ex toto sa-
 „ nitas restituatur. Si diebus eisdem
 „ alvus nihil reddit; ducenda est, quo
 „ magis superiores partes leven-
 „ tur; Hæc CELSUS, cum quo J.
 GORTER (*f*) eadem fere protulit :
 „ vinum potum (ajens) suo stimulo spi-
 „ rituoso majorem facere circulationem
 „ cum corporis incalescentia omnibus
 „ notum est: talis ergo meri potio va-
 „ let talem subigere et excutere doloris
 „ causam, quæ ex minori circulatione
 „ fuit nata; hæc enim materia a majore
 „ circulatione agitata et subigitur et ex-
 „ pellitur . . . Si ergo aliquis diu labo-
 „ ravit oculis dolentibus sine multâ ru-
 „ bedine, quorum oculorum palpebræ
 „ levis fordescunt, simulque effluunt
 „ humores acres frigidi catarrhosi, his
 „ imperanda est meri potio, quæ aucta

(*f*) Medicinæ HIPPOCR. L. 6. aphor. 31 No 2.
 p. 415.

„ circulatione solvit viscosum, et emen-
 „ dat acre spontaneum catarrhofum fri-
 „ gidum „ &c. Videamus nunc experi-
 „ entiam. GALENI (g) „ adolescens : . .
 „ quod vicinus urbi non erat, oculo-
 „ rum inflammationem pluribus jam die-
 „ bus ruri pallus fuerat. Hunc, quia in
 „ eodem statu perseverabat, in urbem
 „ profectum intuitus habere oculos
 „ squallidos quidem, sed valde tumidas
 „ ac plenas sanguine . . . venas, iussit,
 „ ut cum se lavasset, potu uteretur in-
 „ raciori, et ita se somno traderet : quod
 „ et factum est; somnus enim profundus
 „ eum invasit, et mane sine dolore sur-
 „ rexit „. Perinde L. RIVERII (h)
 „ rusticus quinquagenarius ophthalmia
 „ inveterata laborans ex Medici præscri-
 „ pto victu refrigerante et aquæ potu
 „ longo tempore usus fuerat sine ullo
 „ levamine. Tandem ab alio rustico
 „ persuasus fuit, ut victum illum refri-
 „ gerantem desereret, et meri potui in-
 „ dulgeret. Post assumptum primum
 „ meri cyathum se oculis melius habere
 „ sensit, et intra paucos dies eodeni po-
 „ tu continuato ab ophthalmia prorsus li-

(g) Comment. 31 in HIPPOCR. aphor. cit.

(h) Observ. med. Cent. 3. Obs. 25.

„beratus est. Idem aliis duobus conti-
 „gille mihi relatum est,, inquit Auctor.
 Ita etiam C. F. PAULLINI apud J. DO-
 LÆUM (i) „mulier 44 annorum a
 „quadriennio inveterata et continua
 „fere ophthalmia laborans tentarat va-
 „ria, sed sine levamine. Svasit (Au-
 „ctor) . . . præmisso cathartico ob ca-
 „cochymiam, et Væ Se ob plethoram,
 „meraci vini potum per aliquot heb-
 „domadas. Fecit, et convaluit,, P. BO-
 RELLUS (k) etiam „tres nobiles viros
 „novit antiquis oculorum doloribus et
 „ruboribus adeo cruciatis, ut nulla re-
 „media intentata . . . relinquerent; sed
 „omnia sine ullo fructu semper experti
 „sunt. Tandem aquæ potu abstinentes,
 „quo Medicorum quorundam consilio
 „utebantur, vini potu, imo meracioris,
 „curati quasi miraculose fuerunt,, Vi-
 no quoque potu, non aeri mutato, tri-
 buenda est ophthalmiæ curatio in casu V.
 RIEDLINI (l), quam ipse cælo mu-
 tato tribuit: nempe mercator quidam tam
 molestæ ophthalmiæ in pueritia obnoxius,

(i) Append. ad encyclop. med. Epist. II. §. 10:
 p. 71.

(k) Hist. et obs. med. phys. Cent. 2. Obs. 77.

(l) Curar. med. millenario No 561.

ut fonticulum gestare debuerit, ubi in Italia aliquamdiu vixit, vino cerevisiæ in locum usus, ab ægritudine illa ita evaserat immunis, ut fonticulum quoque sine noxa coalescere siverit. Ast ex Italia in patriam reverso, ut primum vini loco cerevisiam bibere coëgit, ophthalmia pristina cum vehementia mox rediit, fonticulo denuo excitato ne hilum quidem jam opitulante. Haud secius profuit vini potus cum puero apud **FOR-DYCE** (*m*) tum **GEACHII** (*n*) succenturioni. Contra ea „**PETRUS RAMUS** „ Veromandus, teste **ZUINGERO** (*o*), „ Lutetiæ Parisiorum literis operam dans „ ex immodicis vigiliis in ophthalmiam „ incidit. **J. SYLVIVS** summus alioquin „ Medicus ex **HIPPOCRATIS** aphorismo (*p*) . . . vino generosissimo uti „ hominem iussit; cuius haustu ita crevit „ vit malum, ut vix tandem multis re- „ mediis exstingvi potuerit „ Ex hac itaque historia cum prioribus collata liquet, recte de vini usu cum **CELSUM** tum **GORTERUM** sensisse, et magno

(*m*) Vide §. 48 No 3.

(*n*) Ibidem No 2.

(*o*) Theatr. vit. hum. Vol. 17. Lib. 3.

(*p*) l. c.

pere cavendum esse, ne importuno tempore hauriatur.

CAPUT IV.

CORTEX PERUVIANUS.

§. 48.

CORTEX *Peruvianus* etiam in ophthalmiæ curatione haud postremum obtinet locum, cujus usum exigunt haud pauca, in primis

1. *Reliquiæ morbi* cum visu debiliore, quas cum atonia vasorum oculi foveat, roborantibus ac præsertim cortice est auferenda. „Egregie hic, inquit A. G. RICHTERUS (q), aliquando cortex Peruvianus inflammationis, reliquias dissipat, et debilem visum, corroborat,; quod ejus femina (r) inter alios est experta.

2. *Æger pallidus debilisque*, ita ut ophthalmia a laxa vasorum oculi debilitate aut recurset aut foveatur, quæ sublata hac debilitate ex toto decedere solet. Ita meminit F. GEACH (s) succen-

(q) l. c. Cap. 11. p. 115.

(r) Ibidem Cap. 12. Obs. 6. p. 139 sqq.

(s) Medic. u. chir. Wahrnehm. p. 13.

turionis habitu corporis debili, quem sanguinis missiones atque cathartica plus etiam exhaustere, Augusto A. 1760 vehementi correpti ophthalmia humida tam acri, ut humor effluens omnia, quæ attingit, eraserit. Dolor, qui subinde repente atrocissimis puncturis caput pervadebat, ad insaniam pene hominem fævitie sua adegerat. Æger carne laxa ac pallida præditus pulsum habuit debilem celeremque, et palpitationes cum anxietate perpetiebatur; urinas reddebat claras ac limpidas, et mane quovis sudores experiebatur. Oculos lucis impatientes palpebræ clauferant, nullo fere conatu attollendæ; quæ si vi diductæ lucem admiscere, intolerabilem illa continuo dolorem causavit. Cum morbus a fibrarum laxitate cum insigni humorum acrimonia profectus esse videretur, iussus est æger aere insalubri sui conclavis, cui se æquo magis incluserat, relicto, in liberum egredi aerem: cibi dabantur facile digerendi, potuique concessum vinum lymphatum. Pauca tantum attenuantia remedia dare visum, prorsus vero nullæ evacuationes validiores institutæ. Utebatur autem 6^a vel 8^a quaque hora ð cort. Peruv. ʒj cum ð Valer. gr. v ex TR^a rosarum, et ante somnum syrupo e meconio. Alvi obstructioni sale cum

manna obviabatur. Nuchæ veficans appositum, et cum æstas esset, nullus apud eum ignis excitabatur. Atque hacce mendedi methodo æger celeriter convaluit.

3. *Scrophulosa diathesis*. Complures observationes præ manibus habentur ophthalmiarum scrophulosarum (quæ a vasorum laxa debilitate cum humorum lentore peculiari hacce in diathesi oriuntur) cortice Peruviano, intercalatis præsertim remediis lentorem corrigentibus, percuratarum. Sic apud J. FORDYCE (t) puer 5 annorum scrophulosa ophthalmia plures hebdomadas durante et duo ulcera sinistræ corneæ causante laborans, frustra facta Væ Sæ, et vesicante admo-
moto, iterataque catharsi, tandem fetone trans nucham trajecto post aliquot hebdomadas convaluit: ut proinde ulcera cum vesicante tum fetone excitata sensim ficcare licuerit; facto tamen in brachio fonticulo, ne recidiva contingeret. Verum biennio post media hyeme morbus lævo in oculo recrudit, multisque elusis remediis oculum opacavit, cuius in cornea ex adverso pupillæ ulcus

(t) Medic. Bemerk. u. Untersuch. der Aerzte von London I Band No 17. 5 Fall p. 174. sqq.

mediocris turundæ capax post trimestre est repertum, oculo ne minimæ quidem lucis patiente. Setaceum nuchæ denuo inditum etsi per mensem ubertim flueret, oculum nullatenus emendavit. Idcirco cortex Peruvianus bis quotidie exhibitus, et post quamlibet ejus dosin cochl. j vini rubri Calensis (Portwein) porrectum, cujus alias quoque interdum unum alterumve cochlear sumendum datum. Intra 3 hebdomades æger absumpsit corticis \mathfrak{z} ij. Externe toto tempore nil nisi aqua ophthalmica Edinburgensis adhibita. Ab his ulcus cicatricem duxit, ophthalmia intra mensem prorsus decessit, puerque inde optime valuit. Eundem quoque a cortice effectum tribus in ægris J. FOTHERGILL (u) observavit. Puellus 12 vel 14 mensium labiis admodum tumidis, colloque scrophulis obdito, et aliis cachexiæ scrophulosæ indicibus præditus oculorum quoque inflammatione cecitatem minante laborabat cum tanto palpebrarum tumore ac sensilitate, ut multo cum conatu vel uno in oculo diduci se se paterentur. Huic ter quotidie datum cochl. j decocti corticis Peruviani cum balsami polychrestii gtt. vj vel x

(u) Ibidem No 25. p. 278. 699.

vel quot fatis erant ad alvum semel movendam, siquidem puero difficilis alvus a natura obtigerit. Pro nutrimento tenuè jus carniùm teneræque carnes concessæ, vetita multa vegetabili diætâ. Intra 14 dies oculi lucem tulere, et post mensem puer prorsus convaluit. Non multo inde post puer alius ad 7 annos habens, tenui macroque corpore, facie pallida ac lurida, et passim humido quodam exanthemate totum jam tegementum obfessa, palpebras perquam tumidas habuit, oculosque nec minimæ lucis patientes. Data illi quoque ter in dies decocti corticis Peruv. cochl. jss, et alternis noctibus pilula e ꝯii dulc. gr. j cum conserva rosarum. Post 10 dies oculis puer jam plus valebat, et facies ab exanthemate aliquatenus purior viscebatur. Cum autem illo jam tempore frigus appeteret, spatium mensis nil nisi decocti usus est imperatus; a quo valetudo multo, quam anno priore, melior ei obtigit: nam oculi lucem omnem ferebant, disparuit exanthema, glandulæque colli minores ac molliores evasere. At dum vere insequenti oculi iterum imbecilli facti dolerent, aliaque pristini mali repullularent symptomata, priora denuo remedia cum eodem successu sunt usurpata. Ad præcavendam vero ulteriorem

recidivam consilium est datum, ut anni totius quolibet trimestri per 10. 14 dies æger quotidie decocto corticis ac pilulis ꝑ libus uteretur. Quo facto puer 4 annis a morbo hoc mansit immunis, demumque ex variolis malignis epidemicis obiit. Perinde infans anniculus dolentissima ophthalmia induratisque glandulis laborans eadem hac medendi methodo sanitati est redditus.

4. *Febris intermittens* vel juncta ophthalmiæ vel sub hujus habitu delitescens (dum nempe ophthalmia statis periodis revertitur). Ophthalmiæ cum febre quotidiana intermittente complicatæ exemplum in se ipso præbuit Cl. О Е Н М В (x) testimonio medicorum Vratislaviensium, qui „ ophthalmia (ajunt) ipsi habitualis „ est, per intervalla rediens, iterumque „ recedens, nunc in hoc nunc in illo „ oculo, antea quidem dextro frequen- „ tius, nunc sinistro. Hoc anno (1699) „ per integrum Augustum et Septem- „ brem maxime ipsum cum aliis afflixit „ febre stipata inflammatoria quotidie „ sub vesperam recurrente. Præter ru- „ borem, dolorem, et tumorem oculi „ tanta simul lippitudo et copiosior lym-

(x) Histor. morbor. Vratisl. p. m. 60. sqq.

„ phæ effluxus e narium sinistra oculo
 „ affecto vicina effundebatur, ita ut
 „ per metastasin quasi omne serum per
 „ vias has effluere videretur, quod
 „ alibi nempe in intestinis et renibus
 „ adeo deficiebat, ut æque ac in hydro-
 „ pe, ubi propter eandem feri $\rho\sigma\pi\eta\nu$ et
 „ alvus et urinæ excretio parca est, utra-
 „ que harum excretionum ad stuporem
 „ usque retardaretur. Alio tempore
 „ oculi ejus inflammati collyria cujus-
 „ cunque generis perferre poterant tam
 „ calida quam frigida &c. Hoc anno
 „ nullum plane perferebant, maxime fri-
 „ gida, et quibus misti Æ^{es} , sola humi-
 „ da sine Æ^{e} , v. g. ex decocto cort.
 „ granator. c. croci orient. pauca quan-
 „ titate calide applicata unice tolerare
 „ poterat, ex quibus etiam levamen sen-
 „ sit. Ex internis cum ab aliquot jam
 „ annis omnia remedia vinosa v. g. essen-
 „ tiæ c. Ω bus ardentibus factæ, item sa-
 „ lia volatilia propter orgasmum sangui-
 „ nis, quem excitant, ipsi nocuissent,
 „ eorum nullo usus est, quocunque etiam
 „ nomine remedii specifici aut depurato-
 „ rii superbiret, nec reliqua etiam sicca,
 „ quæ quodammodo massam sanguineam
 „ calefacere, ut diaphoretica, aut fun-
 „ dere, ut cinnabarina, possunt, adhi-
 „ buit, exceptis solis lapillis cancrinis,

„ qui interdum sine damno capiebantur.
„ Cortex Chinæ, quo in aliis febrium.
„ generibus cum successu multiplici in
„ corpore suo usus fuerat, in febre fu-
„ ganda quidem virtute sua non destitu-
„ ebatur, ast cum inflammationis au-
„ gmento, quod plus una vice exper-
„ tus, ita ut si febrim per aliquot dies
„ mitigare vellet, electuario Chinato
„ uteretur, si ruborem et ardorem com-
„ pescere, ab eodem desisteret. Inter
„ universalia neque purgantia neque de-
„ cocta lignorum aliquid illi conferebant,
„ imo malum exasperabant, ita ut per
„ integrum paroxysmi tempus omni fere
„ remedio tam interno quam externo
„ carere cogeretur, sola diæta tenuiori,
„ imo simplicissima contentus. Ex ex-
„ ternis vesicantia tamen experiri pla-
„ cebat, circa quorum applicandi locum
„ curiosum quid suo damno observavit.
„ Applicabat eadem circa aurem fini-
„ stram in loco, oculo affecto (secun-
„ dum Autorum & Collegarum, qui
„ ipsum visitabant, consensum imo præ-
„ scriptum) vicino; ex qua re duplex
„ damnum percipiebat: 1) quam primum
„ cantharides (quod intra 5 horas factum
„ fuerat) virtutem suam exseruissent,
„ saporem in ore sentire sibi videba-
„ tur Xibetho analogum, qui quamdiu

„ vesicatoria eodem in loco relinqueban-
„ tur, perdurabat, et cuivis alimento-
„ rum et potulentorum generi se se mi-
„ scebat, ut nauseam exinde caperet;
„ 2) dolor in dies imo horas singulas
„ vesicis humorem plorantibus exacer-
„ babatur, et lippitudo adeo augebatur,
„ ut singulis momentis oculus aquam stil-
„ laret. Quo duplici incommodo per-
„ motus vesicantia post triduum ex eo-
„ dem loco in remotiorem et quidem
„ pedem sinistrum transferebat; ex quo
„ duplex iterum enascebatur observatio:
„ 1) quod intra nycthemeri spatium
„ vesica emplastro etiã fortissimo vix
„ excitari potuerit propter serum ad
„ superiora versum; 2) quod quam pri-
„ mum vesicæ in pede stillare incipie-
„ bant (quod parcius tamen contingebat
„ propter eundem feri defectum); in
„ momento quasi dolor oculi remitteret;
Ex hac singulari prorsus et oppido rara
observatione cum complura sint, quæ
utiliter eruas, tum illud in primis no-
tatu dignum est, quod ad febrem quoti-
dianam intermittentem cortice Peruviano
tantummodo mitigandam pertinet. Simi-
le quid etiam H. SLOAN (y) sua in præ-

(y) Act. nat. sur. Vol. 10. append. No 7.
p. 290.

xi observavit: „ dum vero (ait ille) in
„ curandis oculorum morbis occuparer,
„ sæpe miratus sum, curationis succeſ-
„ ſum non reſponſiſſe votis; progre-
„ diente autem tempore deprehendi cau-
„ ſam ſubſiſſe febrem intermittentem:
„ quoties enim paroxyſmus aderat, to-
„ ties pejus evenit oculis, quorum aſſe-
„ ctus magis reddebatur refractarius.
„ Quam primum vero illa curata eſſet
„ . . . cortice . . . Peruviano, etiam
„ oculorum curatio ex ſententia ſucceſ-
„ ſit „. At multo etiam hic efficacior,
imo unicum pene remedium eſt cortex
Peruvianus, dum febris intermittens lar-
vata ophthalmiam periodice recurrentem
mentitur; cujus rei haud pauca exiſtant
exempla. PACCHIONUS apud F. TOR-
TI (z) meminit Cardinalis, in quo pe-
riodica ophthalmia perquam dolorifica
et epilepſiam proxime minitans cortice
Peruviano fuit proſtigata. F. GEACH (a)
caſum refert viri 40 annorum toto cor-
pore conſumpti, qui menſe Martio 1762
utroque in oculo pungentem ſenſit dolo-
rem, cui paulo poſt vehemens ſuperve-
nit inflammatio et æſtus capitis cum pul-

(z) Therap. ſpecial. L. 5. C. 6. p. m. 426.

(a) l. 6. p. 15. ſq.

su celeri tremuloque. Ocyus detractæ
 3 x vel xij sanguinis crustam phlogisti-
 cam formantis, datumque catharticum ex
 elect. lenitiv. 3j in infusi fol. fennæ 3ij.
 Lectum petere jussu multum feri lactis
 tamarindinati cum crem. \square ri hauriendum
 porrectum. Dolore nil remittente post
 biduum Væ So et catharsis iterabantur,
 vesperique data pro sedando dolore dia-
 codii 3j. Rasum caput oculique decocto
 capitum papav. foti, nec non cataplasma
 e mica panis cum lacte adhibitum. Ab
 his pulsus quidem emendabatur, at dolor
 vehemens identidem recurrebat. Ob flu-
 xum feri ex oculis uberrimum vesicans
 nuchæ admotum: interne pro sero lactis
 data TR^c corticis alexipharmaca sale acua-
 ta, potuique concessum vinum Calense
 (Portwein) lymphatum cum succo aurantio-
 rum Sevilliensium; atque in usu catharti-
 corum et anodynorum pergebatur. Mor-
 bus ab his febris intermittenti evasit similis.
 Idcirco in accessionum intervallis da-
 tum decoctum corticis Peruviani, ac
 postea infusum sassafras: atque sic æger
 plane convaleuit. J. JANIN (b) per-
 quam rarum hypopion periodicum taraxi
 junctum

(b) l. c. p. 360. sqq.

junctum observavit, solo cortice Peruviano profligandum. Nempe cerdo quidam temperamenti cachectici jam ab anno fere primis cujusvis mensis 14 diebus visu privabatur ob materiam flavescentem in antica utriusque oculi camera collectam usque adeo spissam, ut trans illam nec pupillæ status nec iridis color videretur. Adnata levissime ac sine ullo dolore oculi rubebat. Initio Martii 1757 consilium petenti 4^o quoque die catharticum datum, sæpiusque per diem oculis sequens collyrium adhibitum:

℞. Vini albi generosi ℥j

Croci metallor.

Aloes succotr.

Tutix ppt. aa ʒj. Indita lagenæ probe obturatæ, et $\frac{1}{4}$ horæ agitata stent 2 menses in sole identidem agitando. Postmodo D. U. ita, ut quotidie mane, meridie, ac vesperti gtt. ij. iij. oculi cantho majori immittantur, palpebræque alternis vicibus aperiantur et claudantur (capite occipiti insistente), ut liquor per totam oculi superficiem æquabiliter diffuat. Quod cum adversus ophthalmias, palpebrarum infarctus, corneæque maculas et ulcera alias admodum sit efficax remedium; hic tamen frustra fuit, oculis non nisi die 15^o (ut alias nempe sponte fiebat) clarescenti-

bus. Quo factō æger ocyus omnibus valedixit remediis. Die 1^a Aprilis rediit denuo malum cum iisdem ac nuper phænomenis. Idcirco, efficaciori collyrio adhibito, 3^o quoque die dabatur hydragogum; et pone utramque aurem vesicans admotum est; sicque evenit, ut accessio hæc non nisi octiduum durarit: unde sanatum se ratus æger, omnia denuo seposuit remedia. Die 1^a Maji repetiit morbus, et præter morem ultra diem 22^{am} excurrit, quem æger brevis durationis futurum autumans initio neglexit. Opem itaque tertium petenti continuo setaceum in nucha trajectum et 4 menses in fluxu servatum, intèreaque et posterius collyrium adhibutum, et mane quovis stomacho jejuno bolus e $\frac{\text{ss}}$ cort. Peruv. gr. xxxvj cum syr. de cichor. c. rheo ss q. oblatum. Qua medendi methodo malum sublatum, et usque ad A. 1761, post quem æger ab Auctore non amplius visus est, constanti sanitate homo gavissus est. NIL ROSENSTEIN (c) matronæ ineminit, cujus oculos dolor insignis cum rubore alternis diebus stato tempore affligebat,

(c) Anweisung zur Kenntniß u. Cur der Kinderkrankheiten 21 Cap. §. 7. p. m. 415.

nullis remediis præterquam cortice Peruviano abigendus. Perinde N. RIGLER(*d*)
 „ periodice recurrentem ophthalmiam
 „ mense Februario 1779 purgatis pri-
 „ mis viis curavit corticis Peruviani ʒj
 „ in D. SCHROE „. Ejusdemmodine
 fuit „ ophthalmia febricosa (seu) dolor
 „ atrox periodicus cum lacrymatione,
 „ vel potius febris quotidiana, ut vidit
 „ et curavit feliciter kinkina „ J. E. M.
 SAGAR (*e*) ?

CAPUT V.

M E R C U R I U S.

§. 49.

MERCURIUS quoque vario fine in curatione ophthalmiæ usurpatur, indicantque ejus usum

1. *Cathartica*, quæis additus, dum humores potenter fundit, hydragogam illorum vim egregie auget, ut superius (*f*) vidimus.

(*d*) Constit. epidem. A. 1775. sqq. append. casu 3. p. 136.

(*e*) System. morbor. sympt. Cl. 4. O. 2. S. 14. No 22. p. 236.

(*f*) Vide §. 41 No 1.

2. *Lentor humorum* admodum pertinax, et nullis sæpe aliis frangendus remediis, qualis in primis in scrophulosa cachexia obtinet. Hinc FOTHERGILL (g) utilissime corticis Peruviani usui ꝑum dulcem in uno suorum agrorum conjunxerat. F. HOFFMANNI (b)

„ juvenis literarum studia intemperantius
 „ tractans indulserat a longo tempore nimium lucubrationibus, et inde sibi insignem contraxerat visus debilitatem.
 „ Post annum invasit oculos dolor gravativus pressorius non sine ardore adeo,
 „ ut nec lumen aspiciere, nec citra molestiam legere posset, sed statim languin oculorum stillicidium experiretur.
 „ Medici svaserunt purgantia, tabaci fumum, oculi cum balsamo Peruviano inunctionem externam, nec non fonticulum in nucha; frustra tamen: quin licet purgantia postea fortiora, decocta sanguinem purificantia, Væ Sēm in pede, pediluvia cum accurato in diæta et victu regimine adhiberent, nihil tamen aliud omnibus effectum, quam ut ventriculus debilitaretur insigniter.
 „ Alii de scarificatione administranda,

(g) Vide §. 48. No 3.

(b) l. c. obs. 4.

„ fonticulo brachio inurendo, et pingue-
„ dine viperarum instillanda oculo de-
„ derunt consilium, sed eodem frustra-
„ neo effectu. Adiit etiam æger Pyr-
„ montanas acidulas, quibus labes et
„ infirmitas oculi adaucta, et nube-
„ culæ visui oblatæ, ut cataractæ
„ plane metus esset. Pariter in va-
„ num laboravit Medicus, qui decoctis
„ sanguinem purificantibus, vesicatoriis,
„ sternutatoriis, variisque collyriis per-
„ tinax malum abigere molitus est. Tan-
„ dem vero solo usu pilularum ꝑlium
„ cum gummatibus et extractis balsami-
„ cis amaris, item infuso theiformi ex
„ sem. fœniculi cum anatica lactis par-
„ te, nec non externo cataplasmate ex
„ mica panis similaginei cum cremore
„ lactis, croco et floribus sambuci alla-
„ tum misero levamen, dolor pressorius
„ discessit; remansit vero quædam visus
„ imbecillitas „. HEISTERUS quoque
bis ꝑ^{io} ad ptyalismum usque dato perti-
nacem profligavit ophthalmiam, ac pri-
mum quidem in Comite podagrico (i),
alias vero (k) in juvene 20 annorum, qui

(i) l. c. I Band No 643.

(k) Ibidem 2 Band No 201.

jam inde a pueritia post variolas usque huc, præter auditum difficilem, ophthalmia cum maculis corneæ perpetuaque palpebrarum conglutinatione ad plurima remedia contumaci laborabat. Opem poscenti data sequentia:

℞. M. P. polychrest. nostr. ℥j

Ess. lignor. q. s. M. F. pil. N^o 28. consp. cinnab. D. pro dosi ad alvum movendam.

℞. Rad. farsapar. ℥ss

Herb. euphras. M. ij

— veronicæ M. ss

Flor. rosmar. p. ij.

Ras. lign. sassaf. ℥j. M. c. gr. m.

D. pro infuso bis quotidie bibendo.

℞. Trag. ophthalm. nostr. ℥jv. S. m. et v. hora 5^a cochl. j. casseaceum cum præcedenti infuso.

℞. ∇^x fœniculi

— valerian. aa ℥ij

∇ camphor. ℥ij

Sacch. bⁿⁱ gr. jv.

℥ii dulc. subtil. ppt. gr. ij. M.

D. pro oculis sæpius eluendis.

℞. Ungv. nigr. nostr. ℥iij. D. pro litu metatariorum m. et v. instituendo. Porro 3^o quoque die pediluvium imperatum tepidum e furfuribus, cinerib. ac rosmar. aa M. j. Ab horum usu æger melius habere cœpit, rubor disparebat,

dexter oculus nullatenus jam , sinister vero non nisi parumper adhuc conglutinabatur, amboque magis jam lucem ferebant, continuatisque remediis ingruit salivatio sine ulla molestia, qua conquiescente disparuit quoque omnis rubor, pituita palpebrarum, corneæ maculæ minores evasere, visusque tam clarus, qualis nunquam ante, obtentus. Sub finem 6æ hebdomadæ pro auditu quoque emendando roganti remedium datum sequens:

℞. Ell. succin. ʒjss

— castor. ʒj

Ol. still. cham. ʒss

— — lavend. gtt. vj. M. D. ut gtt. ij gossypio exceptas tepide m. et v. indat in aures. Unde etiam auditu emendato juvenis domum reversus est. Haud secius „ salivationem inunctione Oli ten- „ tatam in pertinacioribus oculorum in- „ flammationibus efficacemprehendit „ D. SCHACHT Acad. Leydenfis P. P. „ et nosocomii medicus „ teste C. F. PAULLINI (l), tametsi nulla hic salivatione sit opus. Neque minus q̄libus remediis hic defert J. WARNER (m),

(l) De nucæ moschata Sect. 2. Part. I. membr. 2. Cap. I. §. 7. p. 260.

(m) A Descript. of the hum. Eye &c.

qui post sanguinem missum præter vulgaris antiphlogistica illis quoque uti sva-
det aut solis, aut si nimisquam alvus
inde fluere, cum sem. papav. mistis.
Remittente demum inflammatione interne
corticem Peruv. externe vero adstringen-
tia remedia tuto utiliterque administrari
ait. Præsertim vero §^{1a} in ophthalmia
scrophulosa a celebrioribus ophthalmi-
atris commendantur; quippe quæ ipsam dia-
thysin scrophulosam abolendo ejus quoque
effectus tollant. s. YVES (*n*) iis in pri-
mis per multum hic tribuit, qui præter
alia præsidia huc facientia vel maxime
mineralem æthiopem et decoctum sangui-
nem depurans dandum consulit, videlicet

℞. Rad. lapath. silv.

—— chinæ aa ʒj. concis. minut.
coq. in

∇^x mensur. v ad remanent. mens.
ijʒ, sub finem adde

Passular. M. j.

· Liquirit. q. s. Colat. D. U.

Bibat æger quotidie mensuras iij, unam
a meridie, duas mane, per integrum
mensem. Eodem tempore per triduum
semper sumat quotidie æthiopis minera-
lis gr. 30, die 4^o hydragogum tempera-

(*n*) l. c. Cap. 6. art. 2. §. 6. p. m. 193. sq.

mento, ætati, morbique magnitudini par; dein per 4 dies nihil ex æthiope detur, his vero præterlapsis eodem ordine æthiops et hydragogum ad plenam usque sanitatem in usum vocentur. Potest etiam dosis æthiopsis pro re nata pedetentim usque ad ʒj augeri; parva enim dosis parum opis affert. Hoc eodem in malo J. JANIN (o) bina sequentia commendat remedia:

℞. Æthiopsis miner. tritur. parati ʒjss
Panacææ ʒ li ʒj.

Syr. domest. q. s. F. pil. gr. ij. S. m. et v. N° jv superbibendo jusculum, idque ad sanationem usque, 4° quoque die interpolato hydragogo. Vel

℞. Cort. Peruv. selectiss. ʒj
Æthiop. min. trit. parati ʒij
ʒ ii dulc. ʒj. M. F. ʒ subtilis, adde
Extr. aloes ʒiij

Syrup. cichor. q. s. F. Opiata.

Dosis pro adulto gr. 30 pro infantibus gr. 12 in forma boli vel pilulari; usus autem diuturnus sit, oportet, uti et diæta conveniens, multusque motus muscularis, et 5° quoque die hydragogum interpolandum est. C. BISSET (p) perinde te-

(o) l. c. p. 402. 405 No 26. 29.

(p) Verf. u. Bemerk. in der Arznei u. Wund-
arzn, No 10 p. 105.

statum se æthiope minerali in quibusdam contumacibus casibus evidenti cum fructu fuisse usum, cui interdum aliquid cinnabarum & cum granis aliquot nitri adiecerat.

3. *Syphilis* præsens, quæ si ophthalmiam causat, unicum adversus eam remedium esse quoniam cum W. ROWLEY (q) tum omnes etiam alii fatentur, adeo ut usu illius plena quoque cæcitas ab opacata cornea oborta haud raro percuretur. Sic „ catarrhali diuturna et contumaci „ ophthalmia cum fluxu oculorum perpetuo . . . laborabat, narrante H. HEINRICI (r), puella 4 annorum a binis annis et ultra adeo, ut ab uno anno aperire non potuerit oculos, acre erodens „ serum semper, sanguinem vero sincerum „ tunc plorantes, si vi deducerentur palpebræ. Mitigato multis remediis malo succinata adhibita pustulas quasdam „ protruserant, quas ob similitudinem et „ justam suspicionem impuro sanguine „ natam eam esse pro venereis habui; „ dedique propterea quoniam dulcem cum

(q) l. c.

(r) Tela ex pharetra APOLLINIS a quo in sui securitatem subducta §. 12. p. 27.

„ laxantibus cavendo ptyalissimum, quem
„ saliva sæpe satis copiose confluens in
„ os minitabatur. Sub et ab illis sana-
„ batur puella intra 3 vel 4 septimanas
„ tum ab impuritate venerea tum ab oph-
„ thalmia ista, prioribus remediis qua-
„ dantenus saltem mitigata. Brevi post
„ alia mihi obveniebat 15 præter pro-
„ pter (annor.) puella, quæ gravissima
„ quoque ophthalmia cum epiphora per
„ 9 annos laboraverat, plurium medico-
„ rum consuetas methodos et medicatio-
„ nes frustra experta. Placuit tentare
„ § lia; dedi dulcem cum M. P. de suc-
„ cino CRATONIS et stimulo quodam
„ purgante; quo tamen ptyalissimum
„ prorumpentem ægre, nec nisi inter-
„ polando usum pilularum, prohibere
„ licebat. Successit tamen experimen-
„ tum tam feliciter, ut intra 3 hebdo-
„ madas curata ophthalmia per 10 hos
„ annos (licet quinquennium abhinc de-
„ mum proruperint menses) nullo ne le-
„ vissimo quidem oculorum, nec etiam
„ ullo alio capitis malo, laboraverit „
J. F. BREYER (s) ejusdem commatis ca-

(s) Diss. de ophthalm. venerea (4^o Tubing.
1734. Præf. A. CAMERARIO) C. 2. §. 15.
in HALLERI disp. med. pr. T. I, No 19.
p. 299.

sum observavit in juvene ruricola, cui post gonorrhœam virulentam adstringentibus repressam lapso inde biennio variæ pustulæ venereæ circa frontem emergere cum insigni cephalalgia, maxime circa occiput, et ophthalmia. Mala hæc cum nocte exacerbata sub ortum solis ita semper denuo mitescebant, vix ut ullus in oculis tumor ac rubor viseretur. Tandem usu § ii sub congruo regimine homo prorsus convaleuit. Ut ut autem litus externi neutiquam hujus loci sint; nihilominus ob affinitatem rei duo huc adicere visum est exempla ophthalmiæ venereæ § li unctiōe profigatæ.

„ Quidam, inquit ZACUTUS (t) im-

„ mania oculorum tormenta per annum

„ integrum expertus veluti desperatus a

„ remediis abstinebat. Huic veluti cœ-

„ co conjunctiva tunica cum ardore, ru-

„ bedine, pruritu, palpebrarum asperi-

„ tate, purisque copia per canthos assi-

„ due emissâ, erat inflammata valde.

„ Hic plurima jam tentaverat auxilia,

„ purgationes, phlebotomiam, fomenta,

„ balnea, collyria tum sicca tum humi-

„ da, cauterium in nucha, hirudinum

„ super arterias temporales impositio-

(t) Prax. med. admir. Lib. I. Obs. 54.

„ nem. Demum nihil non tentatum.
„ . . . Cœpi cunctantius perscrutari,
„ num esset aliquando passus morbum
„ Gallicum, aut cum fœda obscœnaque
„ femina concubisset? Omnia negat;
„ unum solum confessus, se per noctem
„ in lecto hujus contagiosi morbi suspi-
„ cione non carente decubuisse. Hoc
„ audito . . . sudores decocto smilacis
„ asperæ moliendos censeo . . . His die-
„ bus 20, attamen citra fructum, usus
„ est. Quamobrem licet in superis par-
„ tibus premeret affectio, et timor es-
„ set, ne vacuato humore per os ☿ ii vi
„ fluxio irrueret in oculos, et ingrave-
„ sceret amplius affectus; tamen cum es-
„ set diuturnus, et confluentis humoris
„ impetus sedatus, unguenta ☿ lia, cor-
„ pore præsertim exquisitissime expurga-
„ to, applicanda censui. His admotis
„ dierum 7 curriculo post copiosam spu-
„ ti vacationem dolores mitescunt, e-
„ vanuit inflammatio, mitigatus pruri-
„ tus, qui antea percipiebatur in pal-
„ pebris cum acrimonia multa, et sic
„ relicto solum in brachio lævo fonticu-
„ lo, . . . et servato victu pristinam
„ recuperavit sanitatem „ Litu perin-
„ de mercuriali, at citra salivationem, oph-
„ thalmiam veneream M. A. WEIKAR.

DUS (u) percuravit, videlicet homo quidam ex impuro coitu osculisque ad oculos, præsertim finifirum, datis præter gonorrhœam ac bubones etiam ophthalmiam utriusque oculi nactus est, sinistro in primis admodum dolente, ejusdemque inflammatione, quæ in dextro brevi disparuit, diu adhuc superstite cum vehementi dolore et opacatione, et cum tuberculis aliquot in interna superioris palpebræ superficie inflammatis, quæ sub quovis oculi motu dolorem multum augebant. Post consveta primum adhibita remedia (hirudines subtus oculo, cathartica, vesicantia, collÿria emollientia et adstringentia), demum unguenti & lis aliquid singulis vicibus illinebatur partibus oculo vicinis, imposito desuper cataplasmate cum aqua GOULARDI. Ophthalmia inde juxta ac tubercula aliud ex alio evanuerunt, levi tantum e regione pupillæ superstite pterygio, licet inflammatio paucis durarit diebus; verum et hoc brevi dissipatum est. Interne pari cum successu remedia contra gonorrhœam data. Mirum autem! ophthalmia decrecente artuum dolores cum rubore fuisse obortos.

(u) Vermischte medic. Schriften 3 Stück p. 47. sq.

§. 50.

Salivatio autem cum hisce in casibus nequaquam sit necessaria, tum præ primis vitanda est etiam, dum inflammatio nimis adhuc viget, aliasque exigit vacationes revulsorias, vel ubi vires ægri tantopere jam exhaustæ sunt, ut ptyalismus tabem accelerare posset, vel ubi aliud quid magnopere obstat. Atque ita accipiendum est, quod Vratislavienses (x) observarunt: „ non nulli (ajunt illi) in „ pertinaciori ophthalmia ad salivatio- „ nem confugiunt: quod in nobili femi- „ na ante aliquot annos fecit D. TRAL- „ LES: verum in tantam ex hac cura „ oculi inflammationem mulier illa inci- „ dit, ut cœcitatæ periculum ægerrime „ potuerit declinare. Juvenem ex con- „ tagio venereo ophthalmia laborantem „ salivatione 2 libus excitata occœcatum „ meminit D. PAULI „. Meminit quo- „ que F. GEACH (y) viri 35 annorum, diu lue veneream perpeffi, ac de- „ mum rebellem ophthalmiam nacti. In nosocomium receptus dolores faucium insuper patiebatur; licet ulcera nul-

(x) *Histor. morbor. Vratisl.* p. m. 62.

(y) *l. c.* p. 20. sqq.

la viferentur , tonsillæ tamen inflammatae fuerunt , et uvula ex toto laxa : circa anum ficus reperti , et pustulae squamosae superius inferiusque in femoribus. Tentatus in ipso litus ꝯ lis pro ptyalismis ; at frustra , debili vi vitae effectum impediens : ut proinde abstinendum fuerit , ne atrophiam sequeretur. Cum itaque viribus prius prospiciendum fuerit , datae quotidie per 14 dies decocti sassaparillae et lactis aa ꝯ ij hauriendae oculos multum emendarunt , ægerque habitum aliquatenus recuperavit ; ficus quidem mansere , sed sine humoris ullius exsudatione. Per 14 dies quolibet vespere dabatur ꝯ ii calcinati gr. j. Ficubus nulla caustica applicata ; quod spes esset , morbum remediis internis , ad quorum usum remittebat , debellatum iri. Et vero ficus hætenus rubelli jam pallescere atque instar foliorum rosarum flaccescere et corrugari citra dolorem vel humoris proventum , contractionesque fieri cœperunt : pustulae passim per corpus enatae decedebant , relictis tantum post se maculis flammeis. Quare dosis ꝯ ii calcinati pedetentim augebatur sub continuato lactis et decocti sassaparillae usu , quod in ore dolores æger sentiret. Post 2 menses oculi sani fuere , homoque mire in melius proficiebat.

CAPUT VI.

O P I U M.

§. 51.

OPIMUM in ophthalmiæ curatione etsi sæpenumero perquam sit necessarium, tamen palliativum est tantummodo remedium, videlicet ad vehementiam dolorum compescendam; nisi forte congestio sanguinis a spasms capiti subjectarum partium, in primis viscerum abdominalium, in oculos foveatur: tunc enim vero hinc sopitis etiam ophthalmia decedit. „ Nota, „ inquit T. SYDENHAM (x), quod sæpe „ accidit, quod Væ Se et catharsi ut „ cunque repetitis ophthalmia non cedit: „ hoc in casu paregoricum ex syr. de „ mecon. ʒj singulis noctibus exhibitum „ curationem sine aliorum suppetiis ab „ solvit „. Verum sollicite cavendum est, ne ante debitas vacuationes factas præbeatur; locus enim ei non alias est, quam ubi post ubertim detractum sanguinem, alvumque motam dolor nullatenus conquiescit, ad quem tum sedandum opium præbere convenit. Hoc enim tempore

(x) Process. integr. in morbis tit. *ophthalmia*.
Opp. p. m. 503.

„ summum arcanum est, inquit BOER-
„ HAAVIUS (a), ut vesperi detur gr. j
„ opii, si homo robustus est, vel sy-
„ rupi de meconio ʒj, vel si ægrotus
„ debilior fuerit, opii gr, ʒ aut ejus
„ quarta pars, et syrupi de meconio ʒʒ.
„ Cavendum autem est, ne detur opium
„ cum calidis. Scopus in usu opiatorum
„ est circulationem turbatam restituere
„ et blandum somnum producere,,

(a) l. c. §. 57. p. 49.



S E C T I O II.

CHIRURGICA REMEDIA.

CAPUT I.

S A N G U I N I S M I S S I O.

§. 52.

SANGUINIS *missio* cum primum tum efficacissimum omnium est adversus ophthalmiam præsidium: unde etiam curatio ab illa semper est inchoanda. Verum tamen sunt ophthalmiæ, quæ vel non exigunt missionem sanguinis ob levitatem suam, et citra eam sanari se se patiuntur, vel etiam eandem varias ob causas (ut ut raro tamen) prorsus respuunt. Porro ipsa quoque sanguinis missio, ubi necessaria est, haud pauca observanda habet, quæ citra ægrorum detrimentum vel negligi vel ignorari minime possunt. In tironum itaque gratiam ea, quæ ad hanc doctrinam pertinent, singula seorsim enucleatius dicere visum est, ut sunt 1) indicantia, 2) copia sanguinis de-

menda, 3) selectus vasorum secandorum, 4) modi, 5) contraindiciantia.

§. 53.

Indicant sanguinis detractionem

1. *Plethora* e suis causis indiciisque cognoscenda, præsertim si morbus a solenni quadam sanguinis yacuatione seu spontanea (ut sunt hæmorrhagiæ narium, catamenia, lochia, hæmorrhoides) seu artificiali non facta ortum ducit. Hinc monente CELSO (b) „sanguis mittendus est . . . si in fronte venæ tument, si firmo corpore materia superest „.

2. *Phlogistica diathesis* sanguinis præfens, quam prægressæ ejus causæ arguunt, calor item corporis insuetus cum pulsu celeri ac duro, &c. nec non crusta pleuritica in detracto sanguine efformata.

3. *Principium morbi*, præsertim chemoseos. Universi clari Practici sedulo inculcant, mature esse mittendum sanguinem; ne re diutius dilata princeps hoc præsidium administrari amplius non possit. „Ab initio, inquit BOERHAAVE, VIUS (c), sanguis mittendus est,

(b) l. c. art. I. p. m. 281.

(c) l. c. §. 56. p. 47.

„ cum id postea fieri non possit; inflam-
„ matione enim ad suppurationem nunc
„ disposita oculus jam perditus est . . .
„ In majori autem inflammatione, quan-
„ do rubor et dolor ingens urget, dif-
„ ferendæ non sunt sanguinis missiones;
„ quando enim primis 3 vel 4 diebus
„ negliguntur, suppuratio supervenit,
„ et actum est de oculo,,. Contra ve-
ro mature satis instituta sanguinis missio
sæpenumero opinione citius morbum tol-
lit; quandoquidem GALENO (d) obser-
vante „ oculorum persæpe dolores gra-
„ vissimos e directo venæ, quam hume-
„ ralem nominant, sectio intra horæ
„ unius spatium compescuit,,. Confir-
mat id observatio AMATI (e): „ ju-
„ venis natus annos 27 cum recte ha-
„ beret, repente dextri oculi dolore
„ cruciari cœpit. Dolebat etiam a ca-
„ pite; persentiebat autem juvenis hic
„ boni habitus, temperatura biliosus,
„ intra oculum dolorem pauco cum ru-
„ bore, absque tamen febre. Pro quo
„ curando a depositis per clysterem al-
„ vi fecibus ex cephalica externa sive
„ capitali dicta vena eundem affectum

(d) De cur. rat. per sangv. miss. Cap. 16.

(e) Carat. medic. Cent. 5. cur. 59.

„ oculum respiciente sanguinis 3vj detra-
 „ ximus; a qua sanguinis missione illico
 „ se recte valere nec amplius dolorem
 „ perferre dixit: ad oculum tamen stil-
 „ latitiam ex rosas uno vel altero croci
 „ grano intinctam admovebat frigidam „.

4. *Symptomata gravia*, præsertim dolores vehementes, deliria, &c. quæ ut plurimum chemosi sunt solennia. Unde CELSUS (f) „ quod si graves dolores „ sunt (ait), commodius 2^o die, si ta- „ men res urget, etiam 1^o, sanguis mit- „ tendus est „.

§. 54.

Copia vero demendi sanguinis quanta simul ac semel esse debeat, et quoties iteranda sit hæc vacuatio, morbi vehementia, corpus ægri, aliaque adjuncta docere debent. Generatim vero hic de sanguinis missione idem, quod in gravi pleuritide, esse tenendum plerique omnes inculcant, atque ante alios hanc in rem BOERHAAVIUS (g) est audiendus: „ primum vero auxilium (inquiens) oph- „ thalmiæ est missio sanguinis largiori

(f) l. c.

(g) l. c.

„ copia facta et repetita, ut non parca-
„ tur sanguini, . . . Ergo vena secatur,
„ sive infans fuerit æger, sive senex,
„ idque fiat largiter, et certo tempore ac
„ certa quantitate repetatur, prout ple-
„ thora major vel minor est, et prout ma-
„ lum majus vel minus est. Si malum
„ minuitur, minor Væ So adhibetur. Eo-
„ dem modo ut in pleuriticis hic pro-
„ cedendum, quibus dolores laterum
„ 4^o vel 5^o die abeunt in suppurationio-
„ nem, sed quæ absolute præcavetur mis-
„ sione sanguinis ad uncias 60 ad sum-
„ mum repetitis vicibus emissas. In oph-
„ thalmia ergo primo statim die mittan-
„ tur 10 ad usque 12 unciaë sanguinis,
„ qui tunc pleuriticorum similis erit:
„ quo facto, si levior fiat inflammatio,
„ desistendum est. Si ea vero sequente
„ die iterum augetur, tunc uti in pleu-
„ riticis sanguis denuo mittendus est,
„ et missio pro necessitate repetenda ad
„ 5^{am} usque vel 7^{am} vicem, donec in-
„ flammatio substituerit. Eam autem sub-
„ sistere cognoscimus, quando oculus et
„ facies post Væ Sem pallent, vel ani-
„ mi deliquium accedit. Sed aliquando
„ prima jam vice post largam sanguinis
„ missionem omnis suppurationis metus
„ aufertur. Si post Væ Ses repetitas o-
„ culus nihilo minus rubet, indicium

„ est, inflammationem vix posse repelli,
„ quod omnino malum est,,. Quam fe-
lix autem ab ubertim sic dempto san-
guine fuerit morbi exitus, non paucis
docemur observationibus. Sic „ ego,
„ ait GALENUS (b) olim rogatus sum
„ a divite quopiam . . . ut rerum sua-
„ rum œconômum inviserem, cui cœci-
„ tatis imminebat periculum . . . magno
„ dolore vexabatur, idque diebus jam
„ 20. Divitis autem illius familiæ præfe-
„ ctus erat medicus lectæ ERASISTRA-
„ TÆÆ, anxie semper Væ Sem refugiens.
„ Ubi ergo laborante inspecto juvenem
„ eum multi sanguinis cognovissem, ac
„ oculos quidem non dum ulceratos ha-
„ bere, ceterum phlegmonem maximam
„ fluxionemque, tum in ambabus palpe-
„ bris densitatem, atque in altera quas-
„ dam etiam asperitates, a quibus obor-
„ ta caligine ægrotus magis magisque
„ dolebat, ac phlegmone fluxioque acer-
„ babantur: his inquam conspectis, co-
„ gnitaque omni ratione curationis, qua
„ medicus ille usus fuerat, . . . prima
„ protinus detractioe tres sanguinis li-
„ bras exhausti, ac deinde hora 9^a (i.e.
„ quadrihorio post) aliam. A quibus

(b) I. c. Cap. 17.

„ mirifice reſectus, inunctus eſt poſtero
„ die mollium collyriorum quopiam,
„ cui admixtum erat, quod vinum habet,
„ . . . illitu ſub palpebris facto ſpecilli
„ cuſpide in ſummo medicamen impoſi-
„ tum ferente. Id primum quidem ma-
„ ne faciebam, deinde ad horam tertiam
„ poſtea ad nonam; poſt quas inunctio-
„ nes ſub occaſum ſolis in balneum du-
„ ctus eſt. Poſtero deinde die palpe-
„ bris extra verſis bis inunctus eſt ma-
„ jore copia collyrii illius, quod vinum
„ recipit, molli illi collyrio admixta;
„ dein ad vesperam lotus eſt. Poſtridie
„ vero mane obviuſ diviti illi . . . ſa-
„ lutavit illum oculis apertis, phlegmo-
„ neque ac fluxione plane liberis, qui
„ ante biduum illos ne aperire quidem
„ præ fluxione atque dolore potuerat.
„ Itaque res incantationi ſimilis viſa eſt,
„ . . . Porro ex palpebris reſtabant ex-
„ tergendæ . . . tum denſitates illæ tum
„ aſperitates: ceterum id fieri non po-
„ terat cirra medicamentum mordax.
„ Atqui ferre illud neutiquam potuiſſet,
„ niſi prius vacuatus foret „ &c. Per-
„ inde RHASES (i) „ cuidam (inquit)
„ accidit ophthalmia: mandavi ipſum

(i) Lib. de mirabilib. curis.

„ phlebotomare de cephalica, et noluit
„ obedire; et sequenti die dolor au-
„ gmentatus est ita, quod nunquam vidi
„ tam difficilem ophthalmiam et pericu-
„ losam, et dubitavi, ne scinderentur
„ tunicæ oculorum, et egrederetur ali-
„ quid de ipsorum substantia, et nihil
„ quasi mansit de cornea, quod non esset
„ coopertum, nisi in quantitate unius
„ lentis propter sublevationem apostema-
„ tis conjunctivæ. Et cum incepit gra-
„ vari a morbo, rediit ad me; et ego
„ feci ipsum phlebotomari bis, et ex-
„ traxi duabus vicibus quantitate trium
„ rotulorum sanguinis et plus, et ab-
„ terxi oculos suos a lippitudine; et
„ pulverisavi desuper Œm album; et
„ dormivit eo die, et cessavit dolor,
„ et insequenti die liberatus est omni-
„ no,, &c. ZACUTUS (k) quoque,, mo-
„ nachum vidit gracilem et excarnem
„ ætate 45 annorum, et in victu . . .
„ sobrium et abstemium, qui singulis
„ mensibus oculorum inflammatione adeo
„ sæva cruciabatur, ingenti dolore op-
„ pressus, ut non expectato medici aut
„ chirurgi adventu sibi ipsi venam in
„ eodem die humerariam aut nigram ab-

(k) l. c. obs. 55.

„ scinderet, et imposito vulnere digito
„ iterum atque iterum fluere fineret, quo-
„ usque dolor tumor rubedoque evane-
„ scerent. Et ita immanis dolor hominem
„ exercebat aliquando... ut multoties...
„ 24 horarum spatio decies sanguinem
„ exhauriret, ita ut sæpe in animi deli-
„ quium incurreret. Is licet plurima
„ præservationis causa fuerit expertus
„ auxilia, aperuerit fontanellas, balnea
„ admiserit, sæpius clementer purgantia
„ assumpserit, et hæmorrhoidalibus ve-
„ nis hirudines apposuerit; tamen se
„ nullo alio præsidio, quam hac copiosa
„ iterataque vacuatione, juvari confes-
„ sus est. His vero magis etiam in-
signis est casus J. L. SCHMUCKERI (1):
puella nempe 15 annos nata, tempera-
menti concitati, ac plethorica, hyeme
A. 1768 correpta est oculi unius oph-
thalmia brevi in chemosin adolescente,
ita ut choroidea quoque haud parum
fuerit inflammata, cum vehementi ce-
phalalgia, præsertim e latere oculi affe-
cti, lucisque omnimoda impatientia, ut
quæ vel minima admissa dolorem causarit
intolerabilem: unde ægra diu noctuque
quiete caruit. Præter interna antiphlo-

(1) l. c. 46 Beobacht. p. 519, sqq.

gistica remedia in usum vocata jam etiam quater vena tusa fuit, vesicans nuchæ impositum, bisque hîrudines applicatæ, sine ullo tamen levamine. Cum vero sanguis pleuriticam semper crustam exhiberet, iterabantur Væ Ses parvæ, hîrudinesque identidem admovebantur; oculo aquæ ophthalmicæ adhibitæ, data cathartica lenia antiphlogistica, simulque tenuissima diæta imperata. Rebellis tamen ophthalmia tres fere hebdomades duravit, usque dum 6 vel 7 Væ Sbus adhuc factis ac 36 hîrudinibus admotis imminui deum cœpisset. Tum vero ubertim lacrymabatur oculus; atque idcirco eluebatur sæpius aqua rosacea frigida sine sale parata, simulque in usu fotium et aquæ ophthalmicæ Auctoris pergebatur: interne præter cathartica etiam decoctum sanguinem depurans præscriptum. Post 9 hebdomades fots noctu tantum impositi, interdiu vero aqua ophthalmica Auctoris oculo infundebatur omni bihorio. Quibus tandem rubor depullus est; verum tamen in bimestre adhuc velum fericeum viride oculis prætensum gestandum erat ob uveam haud dum satis lucis patientem, donec pristinum recuperasset robur. Consilium porro puellæ datum, ut laborem minutiozem in albis objectis vitaret: quod etsi non severe

observatum fuerit , ophthalmia tamen nunquam deinceps revertit. Post aliquot annos puella nuptui data exactis 9 mensibus peperit. Aliquanto inde post variolis gravissime laboravit, atque anno post rursus e putrida febre maligna decubuit. Oculus tamen nunquam inde in pristinum relapsus est malum.

§. 55.

Delectus vasorum porro haud minorem meretur attentionem. Quantum enim ad vasa tundenda attinet,

A. *Arteriae temporalis* sectio in latere affecto ex omni retro antiquitate hic semper commendata legitur. Ita GALENUS (m) „ quæ (inquit) in tem-
 „ poribus sunt, arterias, et quæ post
 „ aures, incidere medicis mos est; in
 „ temporibus quidem, infestantibus ocu-
 „ los fluxionibus tum calidis tum spiri-
 „ tuosis; post aures vero in vertiginosis
 „ maxime, et iis, qui diuturnis dolori-
 „ bus capitis calidis ac spirituosus affli-
 „ guntur,,. Quibus e verbis satis ap-
 „ paret, pervulgatum id remedium fuisse
 Veteribus, quorum etiam complures hanc

(m) l. c. Cap. 22.

ipsam in rem citat M. A. SEVERINUS (n),
 ac proprias quoque observationes adjun-
 git (o); enim vero „ in phlegmonis
 „ quippe multos (ait) varie lippientes,
 „ ut cœcutientes non dicam, homines
 „ . . . tam graviter afflictatos; ut ne
 „ palpebras quidem aperire possent; fa-
 „ cta semel arteriotomia in temporibus
 „ sic e vestigio levatos vidimus, ut ma-
 „ gna quasi sarcina liberatos se cogno-
 „ scerent; et oculos expeditissimos ha-
 „ berent . . . Eandem arteriotomiæ
 „ felicitatem chemosis magno discrimine
 „ conflictatus sensit J. BLANCUS Janu-
 „ ensis non incelebris proxeneta, sensit
 „ et . . . homo subalpinus quam prom-
 „ ptissimam: Idem ad unguem evenit . . .
 „ opifici funario . . . itemque J. C.
 „ VALDRISIO Triventino . . . digna-
 „ que perpetuo monumento visa res est,
 „ quod ad alterum oculum novo 20 post
 „ diebus facto defluxu (siquidem inops
 „ homo sub ardente sole per aprica lo-
 „ ca æstate frequens itare cogeretur)
 „ cum illo temporum latere rursus admi-
 „ nistrata micantis venæ sectio fuisset,
 „ in promptu gravitas omnis capitis;

(n) De efficaci medicina L. I. P. 2. p. m. 38.

(o) Ibidem p. m. 43.

„ lacrymarum defluxus ; tunicarum in-
 „ flammatio , noxæque aliæ , quæ in-
 „ erant , difcuffæ fuerè , &c. Perinde
 J. LANZONUS (p) ; in muliere (in-
 „ quit) quadragenaria sævo oculorum
 „ dolore affecta fecta temporali arteria
 „ . . . melius fe habere incepit . . . In
 „ pertinaci ophthalmia ter in praxi mea
 „ feliciter fum ufus tali chirurgico præ-
 „ fidio in utroque sexu , et præfertim
 „ A. 1711 mense Majo in puello post
 „ variolas ophthalmia pertinaci laboran-
 „ te , L. HEISTERUS (q) hominis
 plethorici cafum refert , diuturnis capi-
 tis doloribus et ophthalmiæ obnoxii , cui
 AMIAND arteriotomen , in pluribus jam
 aliis hocce in malo ab fe felici cum even-
 tu factam , commendavit. Affentiente
 ægro , tria parva fplenia , falciamque duo-
 rum capitum 6 ulnas Gallicas longam et
 2 pollices latam promit , ægroque confi-
 dente derafis in latere illo , ubi arterio-
 tome futura erat , capillis arteriæ digitis
 prius exploratæ in locum lanceolam pro-
 fundius , quam in phlebotomia fieri affo-
 let , immerfit (ob altius latentem arte-
 riam) , eamque transversim incidit.

(p) Misc. nat. cur. Cent. 3. Obs. 60.

(q) l. c. 1 Band No 43.

Sanguis arcubus formatis erumpens ad
 3xij ubi effluxisset, vulnere tria illa sple-
 nia imposuit, minimum primum, tum
 reliqua ex ordine majora, fasciaque stel-
 lata firmavit. Cessavit sic hæmorrhagia,
 ægerque usurpatis insuper remediis in-
 ternis melius valere cœpit. HEISTER-
 U S quoque postmodo hanc operationem
 sæpius cum fructu instituit. Non minus
 etiam utilis est hæc arteriotome ad dō-
 lores oculorum chronicos ophthalmiæ su-
 perstites profligandos, cujusmodi exem-
 plum T. BARTHOLINUS (r) memoriæ
 prodidit. Notandum autem est hæud per-
 functorie, arteriotomen hæud prius esse
 instituendam, quam e brachio vel pede
 semel aut sæpius ubertim fuisset detractus
 sanguis, imo ubi omnes alii demendi
 sanguinis modi fuissent pertentati; quo
 facto bis in ejusmodi casibus proficuum
 fuisse arteriotomen GUERINUS (s) ob-
 servavit. Sive jam hæcce cautela ne-
 glecta sive aliud quid in causa fuit, bis
 certe frustra institutam arteriotomen vi-
 dit SCHMUCKER (t); imo alteri ho-
 rum

(r) Act. med. Hafniens. Vol. I. Obs. 4.

(s) l. c. p. 33 nota (13).

(t) l. c. p. 439. sq.

rum ægrorum vulnus die 15^o ab operatione e fortiori sternutatione , alteri vero die 27^o recrudit ; licet merito credi potuisset , intra hoc tempus vulnus cicatricem duxisse , siquidem arteria ob subjectum os rite se comprimi sinat. Unde et inutilem et periculosam quandoque hanc arteriotomiam esse non abs re notat J. WARE (u) „ inter præsidia „ (inquiens) directe in oculum agentia „ est et arteriæ temporalis sectio inter „ efficacissima ac celerrime proficua re- „ ferenda. Propter viciniam hujus ar- „ teriæ ad partem affectam sectio illius „ multo frequentius institueretur , quam „ soleat , ni duo obstarent , nempe quod „ arteria hæc incisa sæpe multo minus „ præbeat sanguinis , quam ad ophthal- „ miæ imminutionem requiritur , tum „ quod ingens non raro , imo periculo- „ sa etiam multarum horarum hæmorrhagia inde consequatur. Unde huic ar- „ teriotomiæ plerumque præfero hiru- „ dinum ad tempora applicationem. Ob- „ servavi nihilo minus in non nullis ad- „ modum contumacibus ophthalmiis post „ frustra admotas hirudines , multifaria-

(u) Auserl. Samml. zum Gebrauch der pract.
Aerzte 6 Band. 2 Stück p. 361 sq.

„ que administrata remedia solam demum
„ temporalis arteriæ ex toto dissectionem
„ profuisse; siquidem non modo leva-
„ men e subita tam copiosi sanguinis de-
„ rivatione insigni sequebatur, verum
„ etiam una scaturiginum sanguinem ad
„ inflammatam partem ablegantium pror-
„ sus sic interceptiebatur „. Methodus
hanc operationem recte administrandi
apud L. HEISTERUM (x) videri po-
test.

B. *Venæ* autem numerosæ omnino cum
sint, ex quibus utiliter sanguis pro re-
nata educi queat; id tamen universim in
hac multiplici phlebotomia est observan-
dum, ut primæ sanguinis missiones e ve-
nis fiant tum majoribus (ut e lato vulne-
re in iis facto sanguis spissus cito uber-
timque vacuari possit), tum ab oculis
affectis remotioribus (ne si e vicinis ad
oculos fieret, eo versus potius impetus
humorum augeretur, quam inde averte-
retur), tum etiam ex eodem latere cum
oculo affecto sitis. Hinc vulgo primum
tundi solet vena

I. *Brachii* vel *pedis*. „ Si mali
„ origo a sanguinis redundantia, inquit
„ F. HOFFMANNUS (y), præstat prius

(x) Chirurg. Part. 2. Cap. 39.

(y) l. c. Cautel, y. 2.

„ venam brachii pedis aut jugularem
 „ aperire, ac postea, si opus est, scarifi-
 „ ficare pone aures vel in nucha „. Sed
 ambigebant non nulli, humerariane an
 cephalica esset aperiunda?

a) *Humeraria*, eaque e directo
 oculi inflammati posita, ut secetur, GA-
 LENUS (z) auctor erat.

b) *Cephalica* vero aliis præplacuit,
 quam etiam suo juveni AMATUS (a) in-
 cidi iussit. At cum sanguinis ex hac
 vena detractiōnem adeo oculis infestam
 esse multi voluerint, ut cæcitatem inde
 sæpenumero consecutam fuisse (haud du-
 bie propter humorum impetum in ocu-
 los adauctum) referant, id quod pluribus
 in mea Amauroseos historia (b) videre
 est; ZACUTUS (c) cum cephalicæ se-
 ctione caute admodum in ophthalmia
 mercandum esse monet.

c) *Salvatella* quæque non nullis Ve-
 terum in pretio erat, qui plurimos mor-
 bos ab intemperie vel hepatis vel lienis
 repetebant, et ad quam salvatellarum se-
 ctionem arbitrabantur admodum esse uti-

(z) Vide §. 53 No 3.

(a) Ibidem.

(b) Part. 2. §. 94 d) p. 523.

(c) De medicor. Princip. hum. Lib. 1. dub. 29,
 p. m. 386 sqq.

lem, ut fuisse hanc in rem ZACUTUS (d) differit, ac sequentem observationem producit: „ ophthalmia plurium mensium spatio laboraverat juvenis, qui „ omnium auxiliorum vim fuerat expertus; post quæ ad cauterium in nucha „ accessit, a quo vix levatus arterias in „ temporibus ter secare coactus est: sed „ incassum. Nam ex temporum intervallis calidissima suborta de novo fluxione doloris sævitie opprimebatur immaniter adeo, ut oculus e propria sede exsilire videretur. Dolor universalium et particularium præsidiorum vires contempserat. Secta deinde fuit vena frontis, hirudines temporibus bis applicitæ, apertæ mariscæ, administratum balneum, et parti dolenti diversimoda lavacra, et anodyna imposita, propinata pharmaca. Quibus cum quiesceret malum, de novo deinceps ferocius exacerbabatur. Quæsitæ fuit scaturigo mali. Eam in hepate squalido sitam esse invenimus. Cumque hæc pars nec epithematum infrigidantium ope, nec aliis auxiliis roborari posset, quin calidum acrem biliosum-

(d) Ibid. quæst. 27. & Obs. 42. & Prax. med. admir. L. 1. Obs. 53.

„ que humorem gigneret, ad oculosque
„ tamquam ad partem debiliorem trans-
„ mitteret, dextram salvatellam tundere
„ præstantissimum consilium judicavimus,
„ qua bis secta humore ad longinqua
„ avvocato, ventilatoque hepate, æger
„ ipse nunquam amplius dolorem præ-
„ sensit „. Verum non tam, quod he-
pati salvatella secta mederetur, quam
quod iterata sit missio sanguinis, profi-
cua est censenda. Tundi etiam principio
morbi solet

2. *Pedis* vena, quatenus humorum
motum versus pedes a capite adauget;
quod in duobus præsertim casibus per-
quam est necessarium, dum nempe oph-
thalmiam vel retropulsa podagra vel ca-
tamenia suppressa accenderunt; istorum
enim revocando fluxui apprime servit
phlebotomia in pede, illius vero ad pe-
des revocationi magnopere favere ob-
servatur.

3. *Ani*, *vulvæ*que venis applicatæ
hirudines sæpe omnem aliam sanguinis
missionem efficacia sua superant, ubi
ophthalmia suppressum aut hæmorrhoi-
dum aut mensium fluxum est consecuta.
Quantum enim ad revocanda catamenia
hirudines vulvæ labiis admotæ valeant,

documento est puella JANINI (e); quid vero in malis a subsistente hæmorrhoidali fluxu oriundis hirudines hæmorrhoidalibus ani vasis applicatæ utilitatis adferant, in vulgus notum est, et c. F. SCHULZIUS (f) testatur irradicatas ophthalmias hoc præsidio ab se fuisse profligatas.

4. *Juguli* quoque vena secta ingentis est energiæ in ophthalmiæ curatione, cujus a „ sectione rite peracta G. F. HIL- „ DANUS (g) nullum malum observa- „ vit contigisse, quin potius in inflam- „ mationibus oculorum et membranarum „ cerebri aliisque affectibus capitis effi- „ cacissimum subsidium fuisse cum in vi- „ ro quodam ophthalmia laborante . . . „ tum etiam in multis aliis observavit. „ Sectionem autem harum venarum rite „ fieri debere non immerito monet AU- „ GENIUS; nisi enim prius corpus a mul- „ titudine humorum expurgatum fuerit, „ infelix erit successus ratione . . . li- „ gaturæ colli et sectionis venæ . . . „ Quapropter si plethora maxima adfue- „ rit, pharmaco expurgato corpore ve-

(e) Vide §. 37 No 2. a)

(f) Kurze Nachricht einiger Krankheiten in Pohlen §. 32. p. 64.

(g) l. c. Cent. 4. Obs. 14.

„ nam in cubito primo (inquit), deinde
 „ jugularem secare soleo; sic enim san-
 „ guis circa membranas cerebri, oculos,
 „ faucesque collectus protinus evacuatur,
 „ uti ex sequenti exemplo videre est.
 „ A. 1600 quinquagenarius et civis qui-
 „ dam . . . inflammatione dextri oculi
 „ adeo graviter laborans, ut de visu
 „ periclitaretur, et præ dolore dies no-
 „ ctesque dormire non posset, me ac-
 „ cersivit. Exquisita instituta victus
 „ ratione sequenti potiuncula corpus ex-
 „ purgavi:

R. Agrimonix

Betonix

Euphrasix

Scabiosæ aa p. j.

Fol. fennæ et

Sem. anisi aa ʒij. Coq. in

▽^a ut colat. redeat ad ʒiij. in
 quib. dissolve

Elect. de succo rosar. M E S. ʒij

Syr. ros. solut. ex multis infusio-

„ nib. ʒj. M. F. potio. Sequenti die
 „ venam in cubito dextro incidi, et ad
 „ ʒvj sanguinis extraxi; erat enim ple-
 „ thoricus. Ab initio oculis sequens
 „ collyrium instillavi:

R. Mucil. sem. cyd. ▽^a ros. extr. ʒij

▽^a plantaginis

— fragariæ

∇^a euphrasiz aa ʒj

Tutiz ppt. ʒj

Ceruliz lotz et

C. C. usti et ppt. aa ʒij.

Caphurz gr. vj. M. F. collyrium.

Fronti sequens defensivum applicui:

℞. Farinz hordei ʒij

ō rosar. rub.

—myrtillor. aa ʒij

—cortic. granator.

—balaustior. aa ʒss

Succ. prunor. filv. immatur. in-
spiss. ʒij, cum

∇^a plantag. beton. parumque

Aceti F. catapl. quod tepide fin.

„ gulis diebus bis applicui. Ne autem
„ cataplasma . . . hoc exsiccando cutem-
„ que contrahendo affluxionem humorum
„ adaugeat, sindone aut carbaso aqua
„ rosacea madefacto cooperio, et tepi-
„ de applico; omnia tamen (ut virtus
„ defensivi eo melius ad cutem perveni-
„ re, operationesque suas exsequi posset)
„ madida ut sint necesse est. Secunda
„ die a Væ Se in cubito facta sequentes
„ pilulas ut devoraret, præscripsi:

℞. M. P. lucis majoris ʒij

—— aurearum ʒj

Trochisc. alhandal gr. jv.

Ol. fœniculi gtt. vj. Cum

Syr. de stœchade F. pilulæ 5, in-

„volvantur ☿^e cinnamomi. Sequenti
„die post sumptas pilulas paulo ante
„prandium latiori vinculo debito mo-
„do ligato ægri collo, et in oppositam
„sectionis partem inclinato capite, ut
„vena magis tenderetur, scalpello ve-
„nam secundum longitudinem incidi,
„sanguinisque ad 3 circ. vij extraxi.
„Deinde pulvillum ex stupis fabricatum,
„nec non albumine ovi madefactum,
„☿^eque nostro ad sanguinem sistendum
„aspersum applicui, et fascia ad oscu-
„lum vulneris constrinxi. Ex hac Væ
„S^e inflammatio oculi protinus ita remi-
„sit, ut intra paucos dies plenissime con-
„valuerit, neque ab eo tempore in
„hunc usque diem, quo hæc scribo,
„unquam hoc malo laboraverit,,. Quan-
tum etiam R. MORTONUS (b) huic san-
guinis missioni detulerit, e verbis illius
colligitur dicentis: „in ophthalmia a
„superstite morbilloso fermento orta
„sanguis e vena jugulari præsertim de-
„trahatur; quo remedio venis oculorum
„capillaribus subito depletis molestum
„hoc symptoma post Væ Sem prius in
„aliis partibus in cassum celebratam, at-
„que plurima alia remedia frustra adhi-
„bita, spatio 24 horarum tamquam car-

(b) Pyretolog. Tract. 3. Cap. 4. p. m. 25.

„ mine magico allevatum fuisse sæpe me-
 „ mini „ Neque minus venæ jugularis
 sectioni detulere A. MAITRE-JEAN (i),
 C. SAINT-YVES (k), et alii ophthal-
 miatri „ viditque M. LANGE, (l) sæpif-
 „ lime Viennæ in nosocomio fratrum
 „ misericordiæ sub ipsa jam Væ Se to-
 „ pica ruborem oculi pallefcere, et fu-
 „ bito ophthalmiam relolvi „ Hujus
 quoque operationis methodum apud L.
 HEISTERUM (m) reperire est. Quem-
 admodum vero venæ jugularis sectioni
 præmittenda est alia in brachio vel pe-
 de, ita idem etiam, ac multo magis qui-
 dem, observandum est ante venarum ex-
 iliorum, oculoque magis vicinarum, a-
 perturam, ut sunt venæ

5. *Sincipitis, temporum, occipitis,*
pone aures. &c. „ Perseverante malo,
 „ inquit J. HOLLERIUS (n), vena fron-
 „ tis, vel quæ in sincipite apparet, quæ
 „ post aures, quæ in temporibus, in
 „ quibus ea eligenda est, quæ tumet,

(i) Von Krankh. des Auges 2 Th. 13 Cap.
 p. 225. 1q.

(k) l. c. Cap. 6. art. 2. §. 2.

(l) l. c. §. 21. p. 46.

(m) l. c. Cap 7.

(n) De morbis internis Cap. 19.

„ rubet , pulsat magis ceteris „ tundi
potest. Et CELSUS (o) „ est (ait) etiam
„ genus inflammationis, in qua ficui tu-
„ ment ac distenduntur cum dolore oculi,
„ sanguinem ex fronte mitti necessarium
„ est „. Perinde M. ETTMULLERUS (p)
„ ad derivationem (inquit) nil melius
„ est , quam venam frontis incidere ; sed
„ hocce habet incommodi, ut subinde
„ pro secanda vena frontis laqueus collo
„ injiciendus sit, ut pro meliori illius
„ intumescencia venæ jugulares constrin-
„ gantur: ubi periculum imminet, ne
„ constrictis ita venis jugularibus simul
„ insigniter augeatur oculorum inflamma-
„ tio. Unde non aperienda est , nisi
„ tundi possit vena frontis sine hac ad-
„ strictione , et per se pateat ; et po-
„ tius omnino eadem est relinquenda.
„ Non tamen, nisi præmissis præmitten-
„ dis hæc vena frontis incidatur ; liqui-
„ dem post eam intempestive sectam oph-
„ thalmiam gravissimam, visus et loque-
„ læ perditionem observavit HILDA-
„ NUS (q) „ nimirum „ sactor quidam
„ . . . 30 circiter annorum ætatis cum

(o) l. c. art. 26. p. m. 292.

(p) l. c. p. 592.

(q) l. c. Cent. 5. obs. 18.

„ doloribus capitis et epilepticis paro-
„ xyfinis in longum tempus vexaretur,
„ quadam die barbitonforem accedit;
„ cui cum morbum suum exposuisset,
„ ramum illum venæ frontis, qui in ali-
„ quibus non nihil ad sinistram vergit,
„ protinus incidit, nulla præcedente cor-
„ poris præparatione. Quid fit? oculus
„ in ipso etiam momento motum amisit,
„ fixus, immobilis, et clausus perman-
„ sit; dolor quoque capitis exacerbatus
„ fuit; inflammatio quin etiam oculi si-
„ nistri secuta est adeo magna, ut ero-
„ sis membranis humores effluerint, et
„ visus omnino deperditus fuerit; sed et
„ (quod maximum) non diu post loque-
„ lam amisit, adhibitis tamen remediis
„ . . . ipsam aliquomodo et ex parte
„ recuperavit „. Cum autem vena fron-
„ tis et exilis sæpe sit, ut haud multum
„ sanguinis inde elici queat, et non sine
„ molestia vinciendo colli subinde incidi se
„ se patiatur; sectioni ejus præferri surro-
„ garique potest aliarum venarum pone au-
„ res vel in occipitio, vel temporibus aper-
„ tura, idque vel ope hirudinum admota-
„ rum vel ope scarificationis; sic enim et
„ sine ullius vinculi molestiis et quantum
„ quis volet sanguinis elici inde potest.
„ Hirudinibus certe ad tempora applicatis

haud parum tribuit W. ROWLEY (r), et scarificatione ab auribus ad humerum usque facta complures ophthalmias sanatas fuisse constat. Sic teste J. RHODIO (s) „ oculis cum inflammatione do- „ lentibus non nulli cucurbitulis cum sca- „ rificatione pone aures ad venæ cepha- „ licæ in humero initium appositis ex „ voto subvenere „. Cujusmodi est, quod narrat HEURNIUS (t): civis Tigurinus, referente C. GESNERO, cum duos jam menses laborasset lippitudine cum asperitate magna oculorum, quasi arenam inspersam haberet, tandem agglutinavit cucurbitulas post utramque aurem cum incisuris, et mox iisdem detractis inferiore loco imposuit aliam, et sic deinceps, ut prioris cucurbitulæ circum cuti impressum sequens inferius paulo posita contingeret, &c. donec ad humerum utrumque perventum esset; illud demum postremo scarificavit in balneo vel prope fornacem: atque id cum pergeret facere continuando per dies 12 circiter crescente luna, sanatus est. Perinde in Medicorum Silesiacorum satyris (u)

(r) An Essay on the Ophthalmia &c.

(s) Observ. medic. Cent. I. Obs. 79.

(t) Libell. de morb. oris et dent. Cap. II.

(u) Specim. I. Obs. 7. p. 40. sq.

„ puer novennis . . . fatis quadratus
„ surreptum $\frac{1}{2}$ em pyrium admoto carbo-
„ ne accendit; flamma vero faciem nimis
„ propinquam, præsertim latus dextrum
„ ejusdem tentans, haud parum adurit,
„ neque oculo parcit. Supervenien-
„ tem quidem inflammationem et reli-
„ qua ambusti symptomata chirurgus
„ . . . remediis convenientibus fe-
„ liciter sanat, oculum tamen vehe-
„ menter dolentem rubentemque in me-
„ lius mutare nescit, et nequit. Nobis
„ in consilium demum adhibitis, cum
„ accurate in oculi statum inquiramus,
„ observavimus sanguinea vascula alias
„ vix visibilia admodum turgescere, mul-
„ tosque ramulos super corneam ipsam
„ spargere, quæ hinc et inde pariter
„ ac albugo multis phlyctenibus haud
„ raro cœcitatem causantibus obsessa erat.
„ Palpebræ non leviter inflammatae tu-
„ mebant, et lacrymæ stillabant copiose
„ et continuo, ita ut affectum jam in
„ ipsam fere chemosin degenerare vi-
„ deretur. Cum autem hæc phænomena
„ per aliquot septimanas jam durantia
„ consuetudinem affluxus, imo habitua-
„ lem jam ophthalmiam minitarentur,
„ malo internis vel externis remediis
„ obviam nobis esse eundem judicavi-
„ mus. Dedimus itaque antiorgastica,

„ temperantia , resolventia leniora , in-
„ terpositis laxantibus. Hæc licet ali-
„ quod levamen adferrent , in totum ta-
„ men inflammationem tollere , aut hu-
„ morum ad oculum affluxum aliorum
„ derivare insufficientia deprehendeban-
„ tur. Quare adhuc cucurbitulis dextro
„ brachio et post aurem aliquoties ad-
„ hibitis , locisque profunde scarificatis ,
„ multum sanguinis eduximus. Hac me-
„ thodo omnia statim in melius versa
„ sunt. Externe præter ea , quæ in ge-
„ nere ad inflammationes sedandas con-
„ ducunt , leniora constringentia partes-
„ que roborantia in usum vocavimus ,
„ et phlyctenibus liquore quodam egre-
„ giarum virium saturninæ prosapiæ no-
„ bis familiari occurrimus , ne latius ser-
„ pere aut profundas foveolas „ quas sta-
„ tim cicatrices aut maculæ albæ visum
„ maxime impediētes excipiunt , corneæ
„ imprimere possint. His per aliquot
„ septimanas diligenter continuatis puer
„ . . . pristinæ sanitati restitutus est,,.

6. *Palpebrarum* e venis perinde san-
guis ope hirudinum iis applicatarum uti-
lissime sæpe , ac vel maxime in chemosi ,
educitur. De hacce locali sanguinis mis-
sione pulcherrimas humano generi obser-

vationes J. L. SCHMUCKERUS (x) communicavit: „ A. 1739 (ait ille), novissimo nempe, quo Parisiis commorabar, hirudines in ophthalmia adhibuit S. YVES ad palpebras, at nunquam numerosiores quam 4, nec nisi semel. Quæ methodus cum præcellere cunctis aliis videretur, in ampla mea praxi illam postmodo cum in chemosi tum taraxi quoque per iterata tentamina multo, quam Præceptor meus, amplioris usus redere studui; felixque eventus eam semper consecutus, siquidem nunquam vel ulcera vel cicatrices superfuere, modo mature ad ægrum accerferer, effecit, ut hirudinum in usu eousque fuerim progressus, quousque pauci profecto erant progressuri. Et cum ophthalmiæ magis infantes atque adolescens ætas obnoxia sit, cui omnes hactenus memorati sanguinis detrahendi modi quam ægerrime administrari possunt, præsentissima tamen adsit necessitas demendi sanguinem, hirudines hanc in rem sunt vel maxime idoneæ . . . adultis continuo bis imo ter etiam brachii vena tundenda est, intermedio vero tempore
 „ re

(x) l. c. p. 494. sqq.

„ re quotidie 6 ad 8 hirudines ambabus
 „ palpebris admovendæ; queis delapsis
 „ grumofus fanguis vulneris osculo ad-
 „ hærefcens ubi spongia aquæ tepidæ
 „ immerfa absterfus fuerit, fanguis ad 5
 „ horas et amplius inde porro effluet
 „ optimis ægri rebus. Idem apud infan-
 „ tes, neglecta phlebotomia, locum ha-
 „ bet, iterandaque erit hirudinum appli-
 „ catio, donec adnata magis alba eva-
 „ dat,.. Quæ omnia complures lucu-
 „ lenti Auctoris cafus (y) confirmant.
 „ Sæpe admodum, inquit idem alibi (z),
 „ ægros naftus fum ab experientiffimis
 „ Viris tractatos, qui ophthalmiam lar-
 „ gis sæpeque repetitis phlebotomiis dif-
 „ cutere necquidquam ftuduerunt, illa
 „ nil indè emendata, cœcitatemque mi-
 „ nante. Applicatis vero 6 ad 8 hiru-
 „ dinibus ad utramque palpebram inflam-
 „ matio intra aliquot horas longe magis
 „ resolvebatur, quam a 6 prægreffis jam
 „ phlebotomiis, fingulis 3 viij ad x fan-
 „ guinis dementibus. Enim vero phle-
 „ botomia cum majores tantum modo ve-
 „ nas vacuet, in minores ac laterales

(y) Vide §. 54. & hiftor. 14. 15. 16.

(z) Vermifcht. Chir. Schrift. I Band 2 Abfchn.
p. 100. fq.

„ præ primis ramos parum admodum po-
„ test, docente id quotidiano rerum usu.
„ Ubi sanguis in vasa non rubra irruit,
„ phlebotomia plus noxæ quam emolu-
„ menti adferat, oportet; quandoqui-
„ dem iteratis vacuationibus tonus horum
„ vasorum perit: quo facto sanguis in
„ ea tanto magis velut incuneatur.
„ Contra ea hirudines eliciendo ex
„ ipsa parte affecta sanguinem ce-
„ lerius inflammationem dissipent, est
„ necesse. Si prima earum applicatio
„ non continuo profit, bis terve appli-
„ catis ophthalmia certo certius cedit.
„ Utiliter tamen phlebotomia præmitti-
„ tur, non modo ad copiam sanguinis,
„ verum etiam ad irritabilitatem vasorum
„ minuendam, ulterioremque sanguinis
„ e vasis suis egressum prohibendum.
„ Atque hac ratione permultos ægros
„ vehementi ophthalmia et chemosi af-
„ fectos a cæcitate præservavi, quæ in-
„ dubie quamlibet aliam medendi ratio-
„ nem vel ob suppurationem vel cicatri-
„ cem inde obortam fuisset seu aliquate-
„ nus seu omnimoda consecuta „ In
„ eandem fere sententiam disserit J. PRING-
„ LIUS (a): „ vehementiores (ait) oph-

(a) Beobacht. über die Krankh. der Armee
3 Th. 2 Cap.

„ thaliniæ sine magna sanguinis jactura
„ sanari se se non sinunt; nisi forte deri-
„ vatio a partibus laborantibus citra to-
„ tius corporis vacuationem fieri possit:
„ quo scopo utiliter ponuntur vesican-
„ tia pone aures, in primis si 2. 3 dies
„ ibidem relinquantur, ulceraque post-
„ modo in fluxu servantur, quod in vul-
„ gus notum est. Interea vero efficacio-
„ res subinde hic observavi hirudines,
„ . . . dum duæ pluresve imæ orbitæ
„ regioni vel prope canthum externum
„ applicatæ fuere, hæmorrhagiaque vul-
„ nerum sibi relicta est, quoad sua spon-
„ te substitit. Isthoc igitur in graviore
„ quaque ophthalmia post phlebotomiam
„ brachii vel venæ jugularis in usum
„ vocavi, atque ubi necesse erat, repe-
„ tii. Id ipsum in ophthalmia a læsione
„ externa orta perinde locum habet. Id
„ unum tamen tenendum est, ut præ-
„ sente vehementi oculorum fluxu post
„ detractum e brachio sanguinem conti-
„ nuo catharticum efficax prius exhibea-
„ tur,,. Hodie methodus hæc jam vul-
„ gator evadit in dies, idque ob evi-
„ dentem utilitatem; et M. LANGE (b)
„ vidit Viennæ in puella aliquoties venæ

(b) l. c. §. 20, nota (a) p. 43.

„ frustra secta quinque hirudines subito
 „ morbum tollere „. Apud Veteres
 quoque sanguis e palpebris mittebatur,
 at scarificatione internæ illarum superfi-
 cie; quæ operatio ubi lapsis tempori-
 bus exolevisset, revocavit eam denuo
 J. T. WOOLHOUSIUS ejusdemque di-
 scipuli, quæ *ophthalmoxysis* ab iis est
 nuncupata. Verum tam parum se se
 operatio hæc probaverat, ut eam ex-
 perientia non dolorificam modo, ve-
 rum periculosam etiam ac nocivam mon-
 strante cum Veteres ipsi tum nostræ quo-
 que ætatis chirurgi rejecerint (c). Siquis
 eruditionis causa penitus eam pernosse
 aueat, D. W. TRILLERUM (d) adeat,
 oportet; mihi de inutili re plura adfer-
 re non vacat: brevissimo etiam rem o-
 mnem sermone complexus est M. LAN-
 GE (e).

7. *Canthi* majoris. „ Reliquias in-
 „ flammationis vacuat ea, quæ ad majo-
 „ rem angulum est „ vena aperta teste
 J. HOLLERIO (f). Quin imo vigente

(c) J. WARE l. c. p. 363. sq.

(d) Opusc. medic. Vol. I, P. 2. Exercit. 6. et
 7. p. 463. sqq.

(e) l. c. §. 22. p. 47. sqq.

(f) l. c.

quoque inflammatione permultum commendat hirudinum anguli interni carunculæ applicationem (quod nempe ex angulari ibi vena revulsio propior, quam ex alia uspiam, sperari possit)
JAMES (g). Denique

8. *Adnatæ* ipsius ex inflammatione tumentis vasa in vehementissima chemosi suppurationem proximam minitante forfice aut cultro hodie perscinduntur pro sanguine in iisdem exsuperante vacuando tam præsentis sæpe auxilio, ut omnibus aliis præfidiis in cassum adhibitis hacce demum scarificatione omne suppurationis periculum ocyus aversum fuisse observata doceant. SAINT YVES (b) præter simplicem hanc modo dictam scarificandæ adnatæ methodum aliam quoque commendat, videlicet ope acus recurvæ, qua in conjunctivam infra turgentia vasa immissa isthæc excinduntur; atque hanc operationem et minus dolorificam esse et tutissimam ait. Sed prior et simplicior est, et mirior, et brevioris temporis, „ Hac ego, inquit J. L. SCHMUCKER (i),

(g) Dictionnaire univers.

(b) l. c. Cap. 6 §. 2. p. m. 189.

(i) Chirurg. Wahrnehm. 1. Th. p. 494.

„ præ primis utor, dum post validas
„ ophthalmias resolutas variis adhuc in
„ locis varicosæ vasorum extensiones
„ supersunt, quas vel tenui lanceola
„ vel acu s. YVESII pro cataracta
„ aperio „. Meminit etiam hic ipse Au-
ctor (k), s. YVESIO (ut ut hic altum
hac de re taceat) usitatam fuisse tunicæ
adnatæ a bulbo et palpebra, quousque
separari posset, abscissionem; quam tamen
ut inutilem et dolorificam observatam
rejecit. Felicem tamen illius successum
expertus est C. F. RIBE (l) in juvene
quodam tanta humorum acrimonia prædi-
to, ut ab ea nobilissimæ corporis partes
exanthema humidum paterentur ingenti
cum afflictione. Nescio cujus consilio
illud remediis adstringentibus et exsic-
cantibus retropulsum atque ad oculum
translatum eum rubore tumore et incre-
dibili dolore affecit; effluebat insuper ex
illo materia flava foetida. Cujusmodi sta-
tus cum plerumque oculum intra 6 dies
suppuratione pessumdare soleat, ne id
eveniret, celerrimo opus erat auxilio;
nullum autem celerius visum est ipsa ad-

(k) Ibidem p. 495. sq.

(l) Act. Svec. Vol. 7. Trimestr. I. art. 6.
Obs. 2. p. 45.

natae tumentis scarificatione. Idcirco ægro sedi illocato alius a tergo stans dextra sincipiti admota caput ejus pectori suo appressum tenebat, indice digito simul palpebram superiorem attollens, læva vero ita mentum prehendit, ut pollice inferiorem palpebram nasum versu, parumper deduceret. Capite sic firmatos patenteque oculo RIBE manus lævæ fronti oppositæ digito minimo superiorem palpebram juxta canthum externum elevatam tenens pollice et indice acum oblongam recurvam, huncce in usum paratam, in tumorem adnatæ immisit, immotum ut bulbum teneret, dextra vero apicibus obtusis præditi forficis ope cœpit omne tumens circum corneam, bulbum, ac palpebras abscindere. Quo factò deligabatur oculus linteolo quadruplicato, in decoctum ex herbis resolventibus in vino coctis intincto, rursusque expresso, quam calide ferri posset, applicato, et quoties refrixit, innovato; eluebaturque MRa ex aquis euphras. et chelidon. maj. cum $\frac{1}{4}$ ℥ Gallici mstis. Deligatus ita oculus continuo levamen sensit, succedente placido somno, quo æger triduum jam caruit. In usu itaque hujus fots et collyrii pergebatur, donec omnis inflammatio abiit. Interne decocta herbarum sanguinem depurantium data, et quavis heb-

domade catharticum. Atque lic æger citra periculum brevi convaluit, superstite tamen cicatrice, quam purulenta illa materia causavit. Verum et hanc lapis divinus s. YVESII in aqua rosar solutus, et oleum ex hepate lucii, aliaque collyria provide adhibita, aboleverunt. Huc forte etiam commodissime referri potest operatio pro curanda ophthalmia venerea metastatica seu chemosi venerea a J. F. BREYERO (m) descripta, tribusque illustrata casibus (n); quæ tamen hodie ob mitiores medendi methodos cognitæ non amplius adhibetur. Interea priorem illam adnatæ simplicissimam scarificationem in vigente adhuc chemosi olim jam commendavit F. PLATERUS (o), quam hodie J. JANIN in compluribus chemosis mirabili cum successu administrat, tresque in medium adducit ægros, queis celeriter saluti fuit. Primus (p) illorum vir erat Tolosanus, cui cataractam extraxit. Cum nec sub operatione nec primo curationis triduo

(m) l. c. §. 22.

(n) Ibidem §. 24. Cas. 1. 2. 3.

(o) Prax. med. Lib. 1. tit. de visus læsione.

(p) l. c. p. 253.

quidquam singulare accidisset; nocte 4^a æger mitram suam loco movit, et cum ea ipsum quoque deligationis apparatus, quo oculus affectus multumque prominens usque adeo premebatur, ut vehementissimus inde dolor oculi capitisque fuerit obortus cum insigni chemosi. Quæ cum V^x S^{as}, levera diæta, idoneaque remedia nullatenus minuerent, forfice adnata scarificata tantum profuit, ut et dolores brevi conquieverint, et bulbi tumor ac inflammatio præclare minuerentur, ægerque die ab operatione 42^o prorsus convaluerit. Visus mox principio sic factis erat distinctus, et abhinc magis etiam emendabatur. Porro (q) inter 12 ægros, qui operationem cataractæ sustinuerunt, fuit, cui biduo post illam adnata usque adeo intumuit, ut palpebræ coire nequiverint. Vehemens capitis oculique dolor, et levior suppuratio conjuncta cum celerrimum poscerent auxilium, sine mora instituta est adnata scarificatio; qua vix peracta, et sanguine inde elicitto, palpebræ jam rursus se se contingebant. Dolores ac suppuratio brevi disparuere, oculusque die 35^o sanatus. Verum

(q) Ilidem p. 254.

cum puris pars in anticis oculi cameris adhæsisset, irritata inde iris adeo se se contraxit, ut ne vestigium quidem reliquerit pupillæ. Cum autem oculus nativam suam globositatem conservasset, ægerque illius ope et lucem a tenebris et umbras corporum ante illum motorum distingueret, pupilla artificialis in eodem facta est: sicque æger bimestri post operationem hoc oculo omnia objecta rite distinguebat. Tertius (r) itidem vir erat, qui a drastico cathartico validam anginam inflammatoriam nactus est; hac autem desinente metastasis dextrum in oculum facta vehementem ejus ophthalmiam causavit cum tanta adnatæ intumescencia, ut ultra palpebras protuberans harum contactum mutuum prohiberet. Cornea parte sui opacata visum insigniter minuebat. Dolores capitis oculique, tum febris ac vigiliæ citam poscebant medelam; quæ interea vulgari methodo antiphlogistica instituta nihil attulit levaminis, imo pus in prima oculi camera colligebatur cum tanto simul puriformis materiæ profluvio, ut oculus palpebræ ac buccæ continenter ab illa inundarentur. Morbo ita intra aliquot dies usque

(r) Ibidem p. 301. 6q.

huc progresso consultus Auctor præter pediluvia imperata, et paregorica exhibita, pone aures epispasticum ex ungv. basilicon. et alb. RHASIS aa ʒʒ, ʒ cantharid. ʒjʒ paratum applicari iussit, oculoque collyrium anodynum ex M. P. de cynoglolf. ʒʒ in ∇^x rosar. ʒvj soluta, quo sæpius balnearetur, intermedioque tempore spleniolo in illud intincto foveretur, præscripsit. Ab his dolor insequenti nocte quievit, somnusque per vices obrepfit. At postero die pristina cum vehementia revertit dolor. Cum ergo status oculi nullatenus emendaretur, protuberans adnata undique curvo forcice percissa est. Hæmorrhagia subsistente oculo MR^a paulo ante dicta eluto applicatum est emplastrum ex unguento saturnino (s). Dolor brevi post remisit, febris sensibilibiter minuebatur, somnusque et vires una cum visu revertebantur. Ad accelerandam igitur curationem quolibet mane jejuno stomacho dabatur seri lactis ʒij haurienda, identidemque hydragogum purgans præbebatur, continuata simul unguenti paulo ante dicti ad oculum applicatione, quo-

(s) Constante ex axung. porc. butyro, sebo
vervec. cera, lytharg. et oleo oliv.

ad inflammatio penitus dissipata ulcusque confanatum fuerat. Die 22^o oculus optime erat constitutus, sed cum tanta imbecillitate superstita, ut eo æger uti nequiret. Postquam vero sæpius per diem vapore balsami ophthalmici albi LEMERYANI admissa eundem recreasset, oculus pristinum vigorem visumque recepit.

§. 56.

Modi demum varii mittendi sanguinem etsi vulgatissimi sint, satisque ex hætenus dictis etiam intelligantur; tamen non nulla adhuc de iisdem supersunt adjicienda. Adhibetur nempe ad vasa rubra aperienda

1. *Ferrum* scindens, idque aut simplex pro uno tantum vase majusculo vulnerando, quod *phlebotomos* audit, vel multiplex, quo plura simul cutanea vasa vulnerantur, quæ sanguinem vacuandi ratio nuncupatur *scarificatio*. Satis autem liquet, scarificatione parciolem placidiorque motu elici sanguinem, utpote ex vasis cutaneis exilibus convulneratis, dum phlebotomo e majoribus vasis sanguis viam exeundi nactus per amplius vulnus cum impetu multus intra breve tempus erumpit. Idcirco phlebotomo in vehe-

mentiore morbi gradu opus est; contra vero „ in leviori . . . repetitæ sæpius „ scarificationes et hirudinum applicatio „ sufficiunt, inquit BOERHAAVIUS (t). Porro cum scarificatio plerumque (ut vidimus) in partibus loco læso vicinioribus, collo nempe et pone aures, imo ipso in oculo instituat; ne sanguis abundans eo versus majore feratur (ut fieri amat) copia, morbumque augeat, phlebotomo prius in morbo graviore vena aliqua major et ab oculis remotior tundenda est, quam ad scarificationem deveniatur.

2. *Hirudines* vero etsi perinde ac scarificatio placide sanguinem eliciant, amplioris tamen sunt usus, quod ad ejusmodi loca, ubi scarificatio non facile peragi nec phlebotomus tuto aut expedite adhiberi potest, applicari queant, ut sunt tempora, palpebræ, canthi, anus, vulva, &c. Imo etiam phlebotomi vices apud infantes obire valent, quæ ferum tam difficulter sæpe admovetur, id quod e sequenti v. RIEDLINI (u) casu pulchre elucescit: „mercator quidam nobilis Venetiis degens, filiolumque

(t) l. c. §. 56. p. 47. sq.

(u) *Lip. n.ed.* ann. 3. Junii 13. p. 381.

„ habens 4 annorum, subinde sat mo-
„ lesta ophthalmia detentum, cum eo
„ aliquando Patavium profectus, cum
„ præsertim tumor quidam molestus circa
„ aurium glandulas in itinere accessisset,
„ medicum quemdam ibidem primarium
„ hac de causa consuluit; qui statim san-
„ guinis missionem svasit, matremque
„ inde perterritam, et anxie hinc quæ-
„ rentem, an non damni quid inde me-
„ tuendum esset, solatus est: quod com-
„ mode mediantibus hirudinibus institui
„ posset. Unde et eo lubentius consilio
„ paruit, hirudinesque puero in ambo-
„ bus brachiis in eo ipso loco, ubi
„ alias vena secari solet, applicatæ fue-
„ runt; quas cum tantum sanguinis,
„ quantum medicus jusserat, exfluxissent,
„ removerunt, et quidem tam feliciter,
„ ut ab illo tempore puer ab ophthal-
„ mia immunis vixerit,,. Ut ut vero
in superioribus præclarum hirudinum
temporibus palpebris canthive admota-
rum usum per observata viderimus; re-
pudiandum tamen illum ut inutilem ac no-
xium quoque M. E. BLOCH (x) arbitra-
tus est: „etenim ad internas (inquit ille)
„ oculi partes sanguinem ramus caroti-

(x) 1. a. No 7. Obs. 2. p. 58. sq.

„ dis internæ advehit, venæque se se in
 „ sinus encephali evacuant, ut in HAL-
 „ LERO (y) ac ZINN (z) videre est.
 „ Cum vero hirudines nullatenus ad hæc
 „ vasa accedere valeant, ad resolvendam
 „ ophthalmiam haud alioquin, nisi quod
 „ copiam sanguinis aliquatenus minuant,
 „ proderunt; quod utique phlebotomia
 „ celerius tutiusque obtinetur. Incom-
 „ moda quoque hirudinibus connexa nos
 „ ab earum administratione absterrent.
 „ Puellæ ophthalmia laboranti hirudines
 „ applicitæ fuere. Neminem latet, vul-
 „ nera ab iisdem facta difficulter quan-
 „ doquæ coire, ac proinde diu adhuc
 „ illis amotis hæmorrhagiam perstare;
 „ quod et hic accidit. Oportuit ergo
 „ ad eam cohibendam spleniola $\sqrt{\vee}$ Galli-
 „ co imbuta apponere: cujus cum ali-
 „ quid fortuito in oculum devenisset,
 „ symptomata magnopere increverant.
 „ Alias simili in casu acetum vini adhi-
 „ bitum vidi, quod teneram cutem ag-
 „ gressum humorum ad partes affectas
 „ affluxum doloremque causando mor-
 „ bum adauxit,,. At breviter adhæc
 J. L. SCHMUCKERUS (a) reposuit: „ D.

(y) Elem. physiolog. T. 5. p. 429. 439.

(z) Descript. ocul. human. p. 214.

(a) Vermischt, chirurg. Schrift, l. c. p. 101.

„ BLOCH (inquiring) adversus hirudi-
 „ num usum in interna oculi inflamma-
 „ tione varia in medium attulit , quo-
 „ rum aliqua jam confutata sunt (*b*).
 „ Addam tantum modo , nullatenus ne-
 „ cessarium esse , ut hæmorrhagia aceto
 „ aut spirituosius remediis compescatur ;
 „ sibi illa est relinquenda , quoad sponte
 „ substiterit , quod perquam est salutare ,
 „ eo quod ita vasa amplius depleantur .
 „ Hæmorrhagia plerumque aliquo post
 „ tempore per se cessat ; quam si tamen
 „ læsa fortuito arteriola quædam foveret ,
 „ ejus hæmorrhagiam sine ullo periculo
 „ agaricus cohibebit „

§. 57.

Contraindicant denique missionem san-
 guinis

I. *Morbus levis.* „ Modica , ait
 „ CELSUS (*c*) , inflammatio neutrum
 „ ex his auxilium (scil. nec V. S. nec
 „ purgans) desiderat , satisque est uti
 „ quiete et abstinentia „ . Quod idem

J. PRIN-

(*b*) Allgemein. deutsche Biblioth. 22 Band 1
 Stück p. 216.

(*c*) l. c. art. 1. p. m. 281.

J. PRINGLIUS (*d*) tuetur, præsertim si ophthalmiam levior externa causa (ut ventus, pulvis, &c.) concitavit; neque secus alii etiam hic sentiunt.

2. *Tenuitas acris humorum*, in primis cum insigni corporis laxitate conjuncta, ubi nimirum notante F. GEACH (*e*) præsentibus acris doloribus in augmento morbi sanguis tenuis coccineus apparet, ac pro lardacea crusta pelliculam viridescentem exhibet, pulsu post primam Væ Semperquam debili factò; enim vero sanguinem non ultra demendum esse monet. Accidit vero non nunquam, ut vigente epidemia aliqua diversus sit diversis in corporibus sanguinis status, tenuis in aliis, in aliis phlogisticus: quo fit ut V. S. tum vario eventu celebretur. Sic in Vratislaviensi A. 1699 epidemia (*f*) „ quibusdam hac „ oculorum inflammatione laborantibus „ V. S. profuit. . . alii ne minimam quidem utilitatem ex ea ceperunt. Hoc „ et DOLÆUS perspectum habuit, imo „ ausus est scribere: Væ So meo judicio „ hic magis obest, quam prodest, quia „ sanguis non est in culpa, nec ille est „ evasatus. Quæ quidem ratio satis je-

(*d*) l. c.

(*e*) l. c. p. 8.

(*f*) Histor. morbor. Vratisl. p. m. 62.

„ juna est, ut enunciatio ipsa minime
 „ vera; nam quod obfuerit Væ So, ne-
 „ mo nostrum unquam vidit,,. At ve-
 ro ut minime verum est, quod DOLAE-
 U S (g) contendit, inutilem semper, imo
 nocivam quoque esse Væ Sem, ita etiam
 haud verius est, nunquam ab eadem no-
 cumentum consequi; nam etsi id Vrati-
 slavienſes nunquam forte viderint, vi-
 derunt certe alii, ut ex GEACHII
 verbis liquet.

CAPUT II.

ENEMATA, BALNEA.

§. 58.

ENEMATA duobus præsertim in casibus hic adhibere oportet, videlicet ad febris vehementiam, si adest, moderandam, et ad alvum liberam (qua toto morbi tempore opus est) tenendam, in iis vel maxime, qui ad segnitiam alvi, ejusve difficultatem sunt a natura proclives.

(g) Encyclop. chirurg. L. I. C. 10. §. 19.
 p. m. 81.

§. 59.

BALNEA vero pluribus titulis in ophthalmiæ curatione sæpe indicantur, ea-que vel universi corporis, vel semicupia aut pediluvia tantum, vel capitiluvia; nunquam tamen præsentē adhuc vasorum plenitudine, sed post vacuatum debite corpus, sunt administranda: quandoquidem, si calida fuerint, ad sudores movendos, materiamque morbosam oculis impactam per eos diffundendam vel certe ad cutem, si ex hac introrsum compulsa fuerat (v. g. achores, herpes, scabies, &c.), revocandam, adhibentur. Unde iisdem hic opus est cautelis, quas in usu diaphoreticorum observandas diximus (*b*).

I. *Universalia* seu totius corporis balnea profuturane sint, GALENUS (*i*) ingeniose prius determinare solebat, ut sequens ejus casus docet: „adolescens (narrat ille) balneavi, cujus medicus non absque ratione in die 2^o ab initio venam secuerat, et deinceps curaverat medicinis, quas experientia

(*b*) Vide §. 43.

(*i*) Commentar. in HIPPOCRAT. sect. 6. aphor. 31.

„ cognoverat, cum inflammatio sola ob-
„ fideret oculos. Dolebat autem vehe-
„ mentissime per quosdam insultus, in
„ quibus aiebat ipse sentire se acres hu-
„ mores, qui universim fluebant ad ocu-
„ los, quibus excretis licet vehementia
„ doloris sedaretur, non tamen dolor
„ omnino cessabat; et hoc illi per totam
„ 5^{am} accidit diem, majus semper ha-
„ bens incrementum. Cum igitur dolo-
„ rem non posset tolerare, . . . atque
„ animadverterem humorem influentem
„ non paucum, valdeque acrem, et ca-
„ lidum, primum fomento utendum
„ censui experientiæ gratia, tamquam
„ ex ea certius cogniturus, qualisnam
„ foret dispositio; solet enim in his fo-
„ mentum parumper quidem dolorem mol-
„ lire, sed alteram fluxionem advocare:
„ qua enim ratione potest id, quod in
„ oculis continetur, discutere, eadem
„ ratione alteram quoque ex vicinis lo-
„ cis attrahere valet. Verum quam pri-
„ mum et aquam calidam et spongiam
„ afferri jussi, æger ipse dixit, expertum
„ esse sæpius tota die id remedium, ac
„ primum dolorem imminuere, sed pau-
„ lo post majorem adducere. Quæ ego
„ cum audissem, . . . solo balneo . . .
„ ita dolorem sedavi, ut tota nocte dor-
„ miret æger, nec semel aliquem eo-

„ rum, qui juxta dormiebant, advocaret.
 „ Ab hinc in reliquis, in quibus per
 „ signa cognovi influere quidem humo-
 „ res acres ad oculos, non tamen cor-
 „ pus esse plenum, balnei usu dolorem
 „ sanavi „. Hac itaque ratione, balne-
 umne an fomentum, quæ ambo ad oph-
 thalmiam commendat HIPPOCRATES (k),
 dato in casu sit profuturum, GALENUS
 dignoscere solebat. Sutoris filia apud
 PEZOLDUM (l) ex ophthalmia ab acho-
 ribus repulsis usu diaphoreticorum et bal-
 nei eosdem rursus nacta convaluit. Hinc
 balnea fontium soteriorum toties ophthal-
 mias chronicas sustulere. C. V. KIRCH-
 MEYER (m) meminit hominis rubo-
 rem oculorum a pueritia passi, aliquot
 balneis in aqua fontis Kukusensis et ocu-
 lis illa elutis plane sanati. Perinde in-
 fans ob ruberrimos oculos diu parum vi-
 dens post varia frustra tentata binis bal-
 neis, et ablutionibus hujus aquæ frigi-
 dis, convaluit. Haud secius mulier ali-
 quot balneis et oculorum lotionibus ab
 eorum fluxu cæcitatem minante liberata
 est.

(k) Vide §. 47.

(l) Vide §. 22. No 4.

(m) Uralter Kukusbrunn, Anhang p. 36. sq.

2. *Pediluvia* id ipsum, quod balnea, præstant; modo regimen accedat debitum. Enim vero „divertunt efficaciter „pediluvia, quibus ter intra 24 horas „ulurpatis, poto simul liberaliter infuso „theiformi, feliciter discussam esse oph- „thalmiam aliquoties vidit „F. HOFF-
MANNUS (n). Semel prævertendo iis frigus febrile accessionis ophthalmicæ morbum hunc periodice recurrentem profligavit, nempe (o) „juvenis generosus viginti aliquot annorum, constitu-
tionis teneræ, et a scorbuticis parentibus genitus, capitis dolores et narium hæmorrhagias crebrius expertus, de-
fluxionibus etiam catarrhalibus et coryzæ sæpius obnoxius, vitæque sedentariæ, literarum amore ductus, nimium indulgens incidit in cephalalgiam
gravem cum atroci oculorum dolore, alvo simul adstricta. Dolor hic erat
periodicus, ita ut matutino quotidie tempore cum rubore et feri falsi effluxu, præcedente refrigeratione et subsequente pulsu celeri, accederet, per
6 circiter horas insisteret, ac postea sensim discederet, die post rediturus,

(n) l. c. curat. §. I.

(o) Ibidem observ. 6.

„ ægro interim nec in somno nec appe-
 „ titu vitium observante, nisi quod sub-
 „ inde post cibos ructus experiretur.
 „ Detinebat singularis hic affectus per
 „ mensem ægrum, et frustra adhibita
 „ fuerunt præsidia varia, collyria, er-
 „ rhina, evacuantia, cephalica, nec
 „ non cucurbitulæ; tandem vero a me
 „ abactus est hisce: ter scilicet alternis
 „ diebus dedi pilularum harum 20:

℞. Extr. panchym. CROLL.

Gumm. ammon.

℥ ii dulcis

Cinnab. nat. ppt. aa ʒj

Extr. croci

Castorei aa gr. vj. M. F. cum

Bals. Peruv. pilulæ ex scrupulo

„ No 20. Una ante accessionem hora
 „ pedes immittere jussi ad genua usque
 „ pediluvio ex aqua fluviali cineribus
 „ clavellatis imbuta, ac dum sic in bal-
 „ neo pedes servabantur, ad mensuram j
 „ bibere infusum theiforme ex herba
 „ melissæ, floribus tiliæ, radice vale-
 „ rianæ, et semine sceniculi; quo sudor
 „ prolektus copiosus. Vesperis exhibui
 „ per aliquot dies ʒem ex pulv. Mar-
 „ chionis ʒss, succini, nitri puri, cin-
 „ nab. ʒ ii rectificati aa gr. viij. Oculo
 „ exterius applicare præcepi aquam Re-
 „ ginæ Hungariæ cum dupla parte aquæ

„ rofarum et camphoræ momento. Cri-
„ nibus quoque quotidie inspersus ☿ ex
„ succino ppt. radice ireos Florent. ca-
„ riophyllis aromat. et cardamomo. Qui-
„ bus per octiduum usurpatis discessit
„ malum; sed restitit nubecula quædam
„ visum quodammodo intercipientis: quæ
„ tamen crebriori instillatione pinguedi-
„ nis viperinæ recentis etiam sublata „
Alias (p) ophthalmiam a cohibita pe-
dum perspiratione recursantem isthac pe-
dilaviis restituta profligavit, videlicet
„ Princeps annorum 60 robusti et bene
„ valentis corporis per 20 et ultra annos
„ mense Junii singulis fere annis gravi
„ et acri oculorum fluxione cum rubore,
„ dolore, et visus obnubilatione ad 6
„ interdum septimanas moleste perseve-
„ rante torquebatur. Postea sponte ces-
„ savit malum. Ad avertendam hanc
„ molestissimam passionem claros et peri-
„ tos consuluit medicos, qui multiplici
„ medicatione usi sunt, quæ in sangui-
„ nis detractioe per V^a Sem in bra-
„ chio, in fronte, per hirudinum appli-
„ cationem circa aures, et scarificatione
„ in nucha et dorso consistebat. Appo-
„ sita quoque sunt vesicatoria et setacea

(p) Ibidem T. 4. P. 4. C. 5. Obs. 2.

„ nuchæ; sed omnia irritò plane effe-
„ ctu: nam appropinquante solstitio æsti-
„ vo protinus malum celerrime oculos
„ occupabat. Narravit mihi Serenissimus
„ hunc casum, eodemque malo denuo
„ affectus consilium a me petiit. Quæ-
„ sivi ex eo, an nunquam usus fuerit
„ pediluvii. Id quod vero factum esse
„ negabat, præsertim cum non perspi-
„ cere possit, quomodo læsis oculis suc-
„ currere valeant. Ego vero in multis
„ et permagnis oculorum vitiis mirabi-
„ lem me adnotasse eorum effectum affir-
„ mavi, et ut eorum usum admitteret,
„ maximopere svasi. Annuebat consilio,
„ et postquam modum præparandi et ap-
„ plicandi illum, qui ab ejus servitio
„ erat, edocui, bis de die mane et an-
„ te cubitum illis usus intra 3 dierum
„ intervallum tam præsens et efficax le-
„ vamen expertus est, ut oculis claritas
„ mox evanescentibus dictis incommodis
„ restituta fuerit . . . Ad illustrationem
„ hujus casus adhuc pertinet, personam
„ hancce Serenissimam mane a multis re-
„ tro annis nudis pedibus, nec tecto
„ satis abdomine, per aliquot horas sub
„ dio ambulasse, idque maxime æstivo
„ tempore: ex quo jam facile rationem
„ apparere existimo, quare hic affectus
„ quam maxime circa tempus solstitiale

„ affligerit . . . Cordatum itaque meum
„ fuit confilium, ut in posterum . . . a
„ prava illa confuetudine fe retraheret,
„ et matutinum frigus æftivo tempore
„ quam follicite caveret. Quo effectum
„ eft, ut fequenti anno ab hoc malo
„ plane liber evaderet „. Denique (q)
reliquias etiam ophthalmiæ admodum per-
tinaces longiore pediluviorum ufurpatione
delevit. Etenim „ vir generofus 50
„ et aliquot annorum, temperamenti
„ fanguineo-phlegmatici, vitæ aulicæ
„ jam per plures annos innutritus, in-
„ ordinatum habebat vitæ genus; fiqui-
„ dem crebro exceffum committebat in
„ potu vini dulcis, fructibusque ho-
„ ræis nimium delectabatur. In vena-
„ tione quondam autumnali caput ven-
„ tis fortiter fpirantibus inopportune
„ expofuit. Poftero die de capitis
„ dolore prefforio conquerebatur, quem
„ fluxio in oculis acris, afpectu lucis
„ femper increfcens, cum rubore et do-
„ lore fequebatur. Quod malum negle-
„ cta victus ratione, idoneisque mediis
„ contemptis, in dies majora cepit in-
„ crementa; et quia fimul rei veneræ
„ deditus erat, nec a vini potu libera-

(q) Ibidem Obferv. 5.

„ liori abſtinebat , tam grave factum eſt,
„ ut in utroque oculo pene viſum ami-
„ ſerit. Multos ideo conſuluit medicos,
„ et variis quæ hinc inde commendaban-
„ tur , collyriis ſed inani plane effectū
„ utebatur. Ranam per medium diſciſſam
„ interiori oculi parti ſuperimponebat ,
„ quod crebro uſu ab aliis comprobatum
„ ipſique commendatum nihil proficiebat.
„ Per annum et dimidium hoc moleſto
„ affectus malo petiit a me quoque opem.
„ Ego proſpexi primo loco diæteticis
„ remediis, et ne potui aſſumeret cere-
„ viſiam vel vinum ſed aquam frigidam
„ ſvaſi. Deinde pediluviiſ valde tem-
„ peratis frequentius ex meo conſilio
„ uſus eſt paulo longiori in iis mora.
„ Tum interdictis omnibus externis ſim-
„ plex tantum et vulgare ut in uſum vo-
„ cet remedium commendavi , ut vide-
„ licet ſaliva ſua jejunus antequam ſur-
„ gat et poſtea quoque oculos illinat
„ frequentius. Quibus ſimplicibus cum
„ diu uſus fuerit , accidit , ut diſcuſſa
„ prorſus vitiata materia viſus clarus cum
„ naturali oculorum conſtitutione reſti-
„ tueretur „. Aſt nihil pene his ipſis
„ pediluviiſ eſt præſtantius ad ophthalmiam
„ e retropulſa vel quacunque alia ratione
„ anomala podagra ortam diſcutiendam ,
„ podagricamque materiam ad pedes dedu-

cendam, id quod suo proprio facto edoctus est J. B. MORGAGNIUS (r): „contumacissima . . . me adolescentulum
„ (ait ille) sub hujus initium seculi Bononiæ prehenderat ophthalmia cum
„ acri subinde dolore conjuncta, ut sæpius capere somnum non possem, nisi
„ palpebris imposita pulpa tepida pomorum dulcium. Multa commendata sunt,
„ multa adhibui, frustra omnia . . .
„ Cum igitur omnia naturæ et tempori commissem, et non nihil jam levatus essem, non sic tamen, ut legere
„ et scribere tunc sine molestia adhuc possem . . . in patriam paulisper secessi, ibique . . . cum . . . utriusque
„ oculi inflammatione et jam propemodum chemosi confictarer, ceterisque
„ in casum remediis usus et sentirem ipse, et amici confirmarent, non esse
„ amplius differendam sanguinis missionem, animum subiit experiri antea,
„ quam mihi vena secaretur (neque enim unquam secta fuerat, ut neque
„ ad hoc tempus, quo undecogesimum annum ago, secta est), experiri inquam, an pediluvium cum lenibus pe-

(r) De sedib. et caus. morbor. Epist. 13 No. 24.
Epist. 57 No. 9.

„ dum frictionibus junctum satis levami-
„ nis adferret. Quæ cum secunda fie-
„ rent vespere, ecce dolor ad ipsam pol-
„ licis dextri cum metatarso juncturam
„ adventare podagram significat. Quæ
„ noctu leviter increfciens oculorum in-
„ flammationem statim minuit, et diebus
„ insequentibus sustulit. Mitissima fuit
„ illa arthritis, ut in homine, qui nun-
„ quam antea, ut neque parentes, ma-
„ joresque ceteri, morbo hujusmodi ob-
„ noxius fuerat, nec postea nisi 5° post
„ anno, sed vel multo levius, in fini-
„ stro genu se prodidit,,

3. *Capitiluvia* autem vel calida, ut Veteribus erat solenne, esse solent, vel frigida. Hæc præcipue tunc sunt usui, dum laxitas vasorum capitis oculorumque reversiones ophthalmiæ fovēt, eique continuo locum dant, ut primum vel levis quædam causa procatarctica accesse-rit, quæ sanguinem aut rarefaciat aut uberius versus caput determinet. Ejusmodi laxitati vasorum capitis nil felicius medetur, quam aquæ frigidæ crebra capiti applicatio. Egregium hanc in rem exemplum M. E. BLOCH (s) suppeditat de

literato 40 annorum, qui capite oculisque multa lectione debilitatis in itinere perfrigeratus incidit in ophthalmiam. Missus aliquoties sanguis, data refrigerantia et cathartica, tepida pediluvia imperata, admotaque vesicantia illam sustulerant quidem; at si vel per horam legit, aliudve egit, quod motum humorum augeret, cephalalgiam cum levi inflammatione patiebatur. Ne quid intentatum maneret, hirudines quoque applicatæ fuere; at in cassum. Plurimis ergo ad restaurandum vasorum capitis tonum, impetumque humorum versus caput minuendum tentatis, caput demum prorsus derasum principio aqua frigida lavabatur; deinceps vero assvesciebat sensim æger capiti linteis aqua frigida imbutis fovendo: intereaque pediluvium tepidum aquæ fluviatilis, cui furfures cum sapone incoctierant, usurpabat. Porro oculis admovebatur aqua ophthalmica leniter adstringens. Interne vero data infusio frigida corticis Peruv. cum cremore tartari, ea simul præscripta diæta, quæ nec plethoram causaret, nec humorum augeret motum. Ab his cum rubor oculorum tum cephalalgia desit, pristinaque visus acies revertit. Æger aliquot inde menses balneis frigidis vacans, ac deinceps mare quovis caput frigida abluens ab ulteriori recidiva prorsus immunis evaserat.

C A P U T III.

CUCURBITULAE, RUBEFACIENTIA.

§. 60.

CUCURBITULAE quoque revulsio-
nis scopo remotioribus ab oculis affectis
partibus (v. g. nuchæ) applicatæ, citra
îcarificationem etiam, sæpenumero egre-
gie profunt , utpote „ per quas in illo
„ loco , cui applicantur , tollitur at-
„ mosphæræ pressio, vel saltem insigni-
„ ter minuitur, inquit SWIETENIUS
„ (t), educito aere per antliam aut su-
„ ctionem, aut admodum rarefacto per
„ linum accensum cucurbitulæ cavo con-
„ tentum. Simul ac jam in hoc loco
„ minuitur æquabilis pressio aeris in cor-
„ poris superficiem , vasa omnia plus
„ distenduntur, tumet et rubescit pars,
„ et si diu maneant applicatæ cucurbitu-
„ læ, vera inflammatio imo et gangræna
„ nasci poterunt . . . Difficillimas oph-
„ thalmias vix ullis remediis cedentes
„ solis cucurbitulis nuchæ appositis sana-
„ tas fuisse vidi sæpius,,. Quemadmo-
dum vero cucurbitulæ sublata sola at-

(t) l. c.

mosphæræ in vasa subtus locata pressione illa relaxant, ut plus sanguinis recipere, qui alioquin ad vicinas partes, ac præsertim oculos, influxurus erat, queant, sicque humores ab oculis avertant: ita etiam

§. 61.

RUBEFACIENTIA ejusmodi locis applicata stimulo suo humores ab oculis illuc divertendo ophthalmiam imminuunt et dissipant. „ Debent ergo, inquit „ BOERHAAVIUS (u), applicari omni „ loco, ubi vasa nuda sunt, ad axillas, „ inguina, poplites, plantas pedum, &c. „ emplastra tenacia, ut ex galbano in „ aceto soluto et emplastro de meliloto „ ana mistis. Sic excitatur continuo sudor sub hoc emplastro. Si hæc non „ satis trahant, attemen violentius agendum est, nec cutis laceranda, tunc „ sequens conducit:

R. Alliorum contusor. ʒj

Fermenti pistorii q. s. Redige in „ cataplasma, et calide applica locis „ vasculosis. Hoc eousque trahit, ut cutim „ tim

(u) l. c. §. 58. p. m. 50.

„ tim leviter inflammet,,. Sic V. R I E D-
L I N I (x) matrona „ serum acre et in
„ corpore mire vagans nacta . . . olim
„ jam ulcuscula in naribus jam in ore
„ sat pertinacia aluerat, jam hæmorrhoi-
„ dum dolori subiecta fuerat, jam et
„ scabie laboraverat, et quæ sunt plura
„ mala, quæ commode modo dictæ cau-
„ sæ adscribi poterunt; quibus præsentibus
„ cetera sat bene valet, absentibus
„ vero et difficulter respirare incipit, et
„ intumescere pedes notat. Hoc anno
„ ophthalmia correpta fuit, et quidem
„ tam molesta, ut . . . vix hominem
„ dimiserit, quem non, ut remedium
„ suggereret, rogasset; nec quemquam
„ ferme frustra rogavit, omnibus sat
„ prompte remedium suggerentibus, et
„ ad cælum usque laudibus extollentibus:
„ tentavit etiam plurima; at quia nulli
„ sat diu institit, omnia frustra, malo
„ semper si non aucto eodem tamen per-
„ manente: donec tandem ipsamet, quia
„ emplastra temporibus applicata in do-
„ lore dentium profuisse noverat, haud
„ male eandem causam et hoc malum fo-
„ vere credens jam quoque eadem appli-

(x) Lin. med. ann. 3. Septembr. 9. p. 601.
sqq.

„ cavit, . . . fat etiam feliciter; ex il-
„ lo enim tempore ophthalmia in dies
„ magis remisit, tandemque plane . . .
„ cessavit „. Cujusmodi autem em-
plastrum illud fuerit, etsi Auctor notare
neglexerit, e vulgari tamen empyrico-
rum praxi colligitur, ea ut plurimum
rubefacientia esse. De sinapismis ad
plantas pedum admovendis, ut in malis
capitis febrilibus fieri vulgo assolet, non
est, cur multis agam, utpote de re ne-
mini ignota; at referendane aliquatenus
ad eosdem sit herba chelidonii, non in-
utile est, scrutari: quandoquidem refe-
rente eodem V. RIEDLINO (y) puero
non dum septenni e dentitione ophthal-
mia leviori correpto alligata per noctem
plantis pedum chelidonii herba, tanquam
euporisto nunquam fallente, illius vix
vestigium postridie superfuerit, et quo-
ties revertebatur malum, eodem rursus
remedio semper profligatum fuerit. Me-
retur sane remedium hoc in teneræ eta-
tis commodum ab aliis quoque tentari.
Idem remedium jam P. FORESTO (z)
notum fuit: „ Hollandiæ Prætes (ait ille)
„ narravit mihi, cum aliquando juvenis

(y) Ibidem Octobr. 5. p. 669. sqq.

(z) l. c. Obf. 5.

„ Colonix agens inflammationem ingen-
 „ tem et oculi inflationem pateretur, ei
 „ a medico consultum fuisse, ut albumen
 „ ovi ad $\frac{1}{2}$ horam concuteret, mox ad-
 „ jecta aqua rosacea panno lineo in eo
 „ humore intincto ac continuo oculo im-
 „ posito, deinde et radice chelidonix
 „ contusa, addito panis fermento et nu-
 „ chæ appposito, et foliis ejusdem una
 „ cum radicibus simul confusis pedibus
 „ admotis: quo facto egregie conva-
 „ luit. Ceterum in chronicis ophthal-
 „ miis acriora rubefaciencia sunt in usum
 vocanda, cujusmodi sunt

1. *Urtica urens*, de qua J. D. GON-
 LIUS (a) „ hoc saltem (ait) . . . memo-
 „ rare placet, quod ex (cujusdam) fe-
 „ minæ observatione annotaverim, quod
 „ urtica minor urens in gravi proprii in-
 „ fantis ophthalmia plus urendo vel ru-
 „ befaciendo præstiterit, quam vesicato-
 „ riorum usus „.

2. *Thymelææ cortex*. Apud LE
 ROY (b) infans pravo lacte enutritus
 incidit in atrophiam quotidie invalescen-
 tem non sine interitus metu. Circa 4^{um}

(a) l. c. Dec. I. Vol. 7. Sect. I. p. 52.

(b) Versuch über den Gebrauch u. die Wir-
 kungen der Seidelbastrinde § 17. p. 23. 199.

ætatis annum artuum paralyſi laborare eſt viſus, adeo ut dextri brachii, quod brevi poſt oedematofum evaſit, uſu prorfus caruerit. Quo facto infans melius valere cœpit, dolorum, quos ante ſæpe vehementerque ſenſit, jam immunis. Cum vero fruſtra tentata fuiſſet oedematis hujus critici diſcuſſio, malo demum conſilio apertum nil niſi ſanguinem præbuit; vulnus erat inſigne, et humor inde prodicens manum infantis ita peſſumdedit, ut arroſis mollibus partibus illam ex toto perforarit. Non nullas ejus partes caries vitiavit, fragmentis oſſium inde, dum ulcus jam ſanatum crederetur, prodeuntibus. Cumque tendines extremarum duarum in digitis phalangum, nec non primæ in medio et indice, humoris acrimonia depopulata fuerit, phalanges hæ ſponte ſeceſſerunt. Ulcera biennio manſerunt ex cruento purulenta, licet nil internorum externorumque remediorum ad cohibendum hoc malum fuerit neglectum. Anno ætatis 6^o puer malignis admodum variolis laboravit, nigræ papulæ exaruerè mox, ubi emerſerant, &c. Inde convaleſcenti peſſima ſupervenit ophthalmia, quæ poſt diuturnam curationem inſtitutam eradicari non potuit, ægro nec diurnam nec vespertinam candelæ lucem ferente. Idcirco fonticulus quolibet in

brachio excitatus; et cum parum inde proficeretur, nucha quoque setone trajecta, ac demum etiam vesicans ibidem superadditum. Jura medicata, serum lactis, et identidem cathartica; toto hoc tempore in usum ducta, idque per aliquot annos. At usque adeo frustra omnia, ut ne glandularum quidem colli prævertere quiverint tumores, brevi in ulcera abeuntes. Suppuratio tot locorum aliquatenus tantum oculis levamen attulit, malis ceteris ad 11 usque ætatis annum durantibus. Tum vero e mulierculæ cujusdam consilio thymelææ cortex adhiberi cœptus, sepositis omnibus aliis remediis, hac unica cum cautela, ut crudis falsisque cibis puero interdiceretur. Intra trimestre oculi sani effecti, ulcera manus parcius fluxere, tumores glandularum colli subsidebant, et post annum puer sanitatem consecutus videbatur: unde etiam deligationis pertæsus corticem porro gestare abnuit; at non multo inde post visus imbecillitas revertebatur, quam resumpta corticis gestatio brevi iterum sustulit. Verum cum immoriger puer denuo corticem gestare fastidivisset, diutiusque impune id laturum se se existimaret, aliquanto inde post nova imminebant reversuri mali indicia, quæis conterritus æger, jamque obsequentior,

corticem rursus gestandum admisit, quem ubi post confirmatam sanitatem in semestre adhuc portasset, sanus in posterum vixit, quod 3½ annis gestato cortici thymelææ in acceptis debuit. Quod cum circa 15 ætatis annum accidisset, 25° anno ex Anglia ad suos redux sanum se adhuc sensit, nisi quod palidula esset facie, halituque pravo. Cum vero thymelæa haud ubique locorum proveniat, ejus in locum suffectus est.

3. *Mezerei cortex* a L. F. E. RUMPEL (c), utpote earundem cum thymelæa cortice virium, imo majorum etiam; nam „ postquam Gnidii mihi „ (inquit ille) copia facta est, et alteri „ brachio ejusdem personæ cortex Gnidii, alteri cortex Mezerei a me impositus est, hunc præ illo multo citius et multo copiosius humores attrahere cognovi; mezereum enim intra 24 horas, Gnidium vero intra 48 horas demum hunc effectum produxit „ . . . Femina 40 plurimumve annorum, „ infirmi et tenelli corporis habitus,

(c) Act. acad. Electoral. Mogunt. A. 1778-9.
Comment. 19. p. 200.

„ vehemente feбри catarrhali invade-
 „ batur, qua per aliquot septimanas
 „ graviter decumbebat. Feбри aptis re-
 „ mediis expulsæ statim succedebat oph-
 „ thalmia serosa continuo adeo ingra-
 „ vescens, ut lucis aspectus sine acerbō
 „ dolore perferri non posset, ipseque
 „ visus sensim obnubilaretur. Cortex
 „ igitur noster impositus id effecit, ut
 „ malum quotidie decresceret, et post
 „ 14 dies plene sanaretur,, (d).

C A P U T IV.

ERRHINA, APOPHLEGMATISMI,

§. 62.

Inter ea remedia, quæ post humorum
 copiam sanguine misso, alvo ducta, &c.
 debite, si necesse fuit, imminutam
 affluxum eorundem ab oculis avertunt,
 et ad vicina loca et colatoria derivant,
 merito illa quoque sunt referenda, quæ
 humorum in ore naribusque secretionem
 augendo copiam eorundem ab oculis il-
 luc avocant, videlicet

(d) Ibidem p. 201. obs. I.

I. ERRHINA, quæ naribus immiffa majorem inde muci proventum caufant, et dum fternutationes quoque movent, concutiendo ftagnantia in oculorum vafis ea loco movent atque in circulum humorum reducunt. „ Ego, inquit GUE-
„ RIN (e), ptarmica sæpe magna cum
„ utilitate in ufum duxi; omnium vero
„ princeps erat ꝓ dulcis faccharo re-
„ mixtus, quo remedio humores ex
„ omni pituitaria membrana narium pro-
„ liciuntur . . . Vidi folius hujus pulve-
„ ris ufu magnas contumacesque oph-
„ thalmias fuiſſe proſtigatas . . . Obser-
„ vandum tamen eſt, ſenſilitatem pitui-
„ tarie membranæ narium, dum a ptar-
„ micis irritatur, non eandem eſſe omni-
„ bus, ac proinde a minore illorum do-
„ ſi initium eſſe capiundum; nam in
„ non nullis, queis conſilium hoc ſum
„ impertitus, ſolus ꝓ facchari ſufficien-
„ tes movit fternutationes: idcirco ꝓ um
„ dulcem non niſi aliquo poſt tempore
„ ei adjicio, refracta primum doſi, ean-
„ dem deinde ſenſim augendo, quoad na-
„ rium fluxus tantus fuerit, quantum
„ ophthalmia curanda exigit, . . Plura
etiam de hocce remedio in mea Amau-

(e) l. c. p. 29. ſqq.

roseos historia (*f*) videre est. „ Incidit
„ hic, refert etiam J. V. WILLIUS (*g*),
„ memoria restitutæ . . . 1672 Ratisbonæ
„ puellæ triennis, cui quidquid seroso-
„ rum erat excrementorum, ad oculi
„ dextræ regionem confluxerat, intume-
„ scentibus ita circa oculum partibus,
„ ut nequidquam videri posset . . . au-
„ cto præsertim circa noctem dolore . . .
„ Conclamata videbatur salus oculi; cum
„ tentata per plures dies omnia nucis ne-
„ cassæ pretium effecissent. Tandem
„ obstructio alvi syrupi rosar. s. s. exhi-
„ bitione debellata, . . . tum illitum
„ chrylina (*h*), et majorana recens na-
„ ribus eo successu admota fuit, ut alte-
„ ra statim die detumescere oculus et
„ conspectui se dare occeperit, brevi in-
„ tegra sanitate subsequente, materia
„ vero per nares evacuata tam acris, ut
„ etiam labia eroderet „. Diffidit qui-
„ dem errhinis præsertim ptarmicis M.
ETTMÜLLERUS (*i*), quod oculis etiam
sanis male cessisse sint observata; sed id
nunquam, nisi corpore humoribus pleno

(*f*) Part. 2. §. 101. p. 546. sq.

(*g*) Act. med. Hafniens. Vol. 2. Obs. 120.
p. 303.

(*h*) Vide §. 72. II. No 2. g).

(*i*) l. c. p. 596.

et imprudenti illorum usu, accidit: cautelæ tamen, quas præscribit, non sunt prætervidendæ, nempe „ si tamen inter-
 „ dum (ait) eadem usurpanda, 1) appli-
 „ canda sunt eadem non in principio,
 „ sed in declinatione, 2) sedata jam ma-
 „ xima ex parte inflammatione, quæ ut
 „ plurimum accedere solet, 3) mode-
 „ rata applicanda sunt sternutatoria, nul-
 „ lo vero modo acriora aut fortiora „.

2. APOPHLEGMATISMI, qui mu-
 cum oris uberius proliciunt, forma col-
 lutorii, masticatorii, fumi e fistula facti,
 &c. usurpandi. Sic narrante J. A. GEN-
 SELIO (k) „ septuagenarius quidam
 „ . . . perspicillis olim utens ophthalmia
 „ sæpius laboravit: hinc fumigationi ta-
 „ baci indulgens claram oculorum aciem
 „ recuperavit, et etiamnum nonagesi-
 „ mum sextum jam agens annum inteme-
 „ ratam usu nicotianæ huc usque reti-
 „ nuit „.

(k) Annal. Vratisl. Tentam. 8. A. 1719 Jun:
 Cl. 2. art. 3. §. 3. p. 675.

CAPUT V.

R A S U R A C A P I T I S.

§. 63.

RASURA *capitis* cum in ophthalmiæ curatione sæpe ex accidente sit necessaria, ut nimirum topica ei remedia aptius applicari queant, velut dum caput aqua vel balnei, iubente CELSO (l), vel frigida, ut in BLOCHII (m) literato, abluendum est, aut imponenda vesicantia (n); tum per se etiam quandoque inflammationes oculorum discutere est observata: quatenus videlicet ablata densa proluxaque cæsarie, quæ calorem capitis fovendo laxitatem quoque vasorum in illo oculisque tuebatur, aer frigidulus caput libere allambens et humiditatem exuberantem dissipat, et amissum vasorum tonum restaurat. Vix sane fuerunt et pueri molestos diuturnosque achores passi, quos ubi nulla medendi methodus profligare potuisset, sola capillorum detonsio brevi abegit. Verum cum ipsa hæc rasura capitis PREUSSII (o) ac

(l) Vide §. 47.

(m) Vide §. 59. No 3.

(n) Vide §. 64.

(o) Vide §. 37 No 3. a)

REIMANNI (p) in casibus metastasin tantum ophthalmiæ, et ad vitalia quidem, non sine metu gravioris ægritudinis effecerit, merito ambigere licet, num tuto unquam caput radatur? præsertim cum in achoribus quoque non raro pravæ inde metastases fuerint consecutæ. Siquid video, detondere caput in dictis malis non utile modo est, verum morbis his in diuturnitatem abeuntibus etiam perquam necessarium; at eodem utique tempore et cathartica per vices exhibere oportet, queis materia in majora vasa frigore retrocedens e corpore subducatur, et vesificantia aliave id genus cuti sunt apponenda, ut huc quoque illa pro parte, ubi nil periculi metuere est, deducatur. Quod quia in memoratis ante ægris præstitum non fuit, materia morbi sibi naturæque relicta ad pulmones confedit. Numquid PREUSSII ægro ortam inde tussiculam exhibitum purgans continuo sustulit? Interea tamen ubi diuturnæ ac variæ præmissæ sunt vacationes cum aliis præsertim idoneis etiam remediis, facta deinceps capitis detonsio lætum habere successum poterit. Sic

(p) Ibidem.

V. RIEÐLINO (*q*) alius medicus „recensuit,
„ se habere filium, qui 4^o fere ætatis anno
„ tam graviter hoc malo (ophthalmia) la-
„ borarit, ut aliquoties de visu ejusdem
„ actum esse metuerit; cumque præser-
„ tim malum semper exasperatum fuerit,
„ quando dens novus eruperit, inde qui-
„ dem originem suam præcipue malum
„ traxisse nullum unquam superfuisse du-
„ bium; at quoniam vel dentibus jam
„ luci expositis nihilo minus nunquam
„ plane cessaverit malum, ne graviora
„ subsequerentur, se quam plurima ad-
„ hibuisse remedia, quin tandem ad ge-
„ nerosa quoque se devenisse, et vix
„ quadriennis brachiolo fonticulum inus-
„ sisse. Ut ut vero hic non parum pu-
„ ris fuderit, levamentum tamen, quod
„ ejusdem inustionem subsecutum fuerit,
„ tam exiguum extitisse, ut non solum
„ qua oculos melius se non habuerit,
„ verum et difficilis respiratio, quæ si-
„ mul puerulum subinde noctu præser-
„ tim tantum torserit, ut fere eum suf-
„ focarit, eodem ut olim modo instite-
„ rit. Unde cum per integros 7 annos
„ sic frustra aluisset hoc ulcusculum arti-
„ ficiale, tandem se cicatricem induce-

„ re, locoque hujus capillos aliquoties
 „ rescindere jussisse: quod mala memora-
 „ ta sic DE I gratia imminuerit, ut jam
 „ eorum vix quædam memoria supersit,
 „ nisi quod pueri incrementum fonticu-
 „ lum impedivisse totus fere credat,,

C A P U T VI.

ULCERA ARTE FACTA.

§. 64.

VESICANTIA, quod ulcerando cu-
 tem humorum ab oculis fluxum ad lo-
 cum, cui applicantur, derivent, maximi
 semper a medicis habita fuere. Nescio
 tamen, cur iis diffusus sit BOERHAA-
 VIUS (r) „ derivantia quoque (dicens)
 „ ex omnibus maxime hic requiruntur;
 „ omnis enim cura hujus morbi . . .
 „ consistit in eo, ut suppuratio impedia-
 „ tur: ea autem impeditur, quando mo-
 „ tus imminuitur, et impetus sanguinis
 „ infringitur, eum aliorsum derivando
 „ . . . Omnes fere medici hic applicant

(r) l. c. §. 58. p. m. 50.

„ vesicatoria ex cantharidibus confecta;
„ verum dubii eventus sunt: quatenus
„ locum exulcerant, juvant egregie, et
„ si statim hoc fit, tunc ægrum sanare
„ possunt: sed quatenus partes sanguini
„ intermiscendo agunt, inflammationem
„ et ideo malum oculorum augent „.
Id ipsum etiam eadem pene sententia ob-
movit J. L. ODHELIUS (s). At nudam
hæc theoriam sapere merito regerit A.
G. RICHTERUS (t); quandoquidem ea-
dem etiam ratione vesicantia in pleuri-
tide futura essent noxia, quod experien-
tia abunde refellit. At inquiunt, ipsa
quoque experientia edocuit, vesicantia
in ophthalmia fuisse nociva; etenim
„ ante sexennium circiter, inquit C.
„ SCHWENKFELT apud W. GABEL-
„ CHOVERUM (u), vir nobilissimus ve-
„ hementi ophthalmia ex acri defluxio-
„ ne correptus chirurgum imperitum
„ ejus loci consuluit; qui cum fluxum
„ ab oculis ad cervicem retrahere moli-
„ retur, emplastrum ex cantharidibus

(s) Apud RICHTER chirurg. Biblioth. 2 Band
2 St. p. 177. sq.

(t) Ibidem.

(u) l. c. Cent. 4. schol. ad curat. 38. in fine
p. 76.

„ fuchæ impofuit : ex cujus ufu ulcus
„ fummx malitiæ , gangrænofum , late
„ ferpens enatum fuit cum epatis et re-
„ num inflammatione , comitante gonor-
„ rhœa ; ut ob id in fumum vitæ
„ periculum inciderit ; et nifi chirurgo-
„ rum peritorum diligenti opera fuiffet
„ malum repreffum , tabe confumptus
„ fuiffet „. Porro „ juvenis quidam Pa-
„ tricius , refert V. RIEDLINUS. (x),
„ ophthalmia gravi jam per aliquot men-
„ fes detentus , quoniam præfertim me-
„ tus subfuit , ne vifui malum tam diu
„ inflans damnum inferret , varia a va-
„ riis commendata remedia in ufum du-
„ cta fuere , et inter hæc veficatoria
„ quoque , quæ tum poft aures tum bra-
„ chiis applicata non parum quidem feri
„ e glandulis cutaneis elicuerunt ; at uti
„ nec minimum quidem profuerunt , cum
„ præfertim . . . apertæ fervari veficæ
„ nullo modo potuiffent , fed quævis ap-
„ licata , quin vel veficatoria iterata non
„ tam ferum novum elicuerint , quam
„ partem affectam exliccaverint , et do-
„ lores concitaverint : ut adeo brevi ci-
„ catricem inducere opus habuerimus „.
Verum enim vero quod primo in cafu
obfue-

(x) Curar. medic. millenar. No 295.

obfuerint loco, cui appofita funt, uti fatis liquet, oculis nocuiffe etiam, neuti-
quam liquet, uti id ipfum in altero quo-
que casu videre eft, ubi tantum modo
memorantur nil profuiffe. Et fi in utro-
que etiam casu ophthalmiam auxiffent,
quid mirum fuiffet, cum tam amethodice
fuerint in ufum ducta? Ceteroquin vero
teftante M. ETTMÜLLERO (y) „ vesi-
„ catoria nuchæ aut etiam pone aures
„ applicata . . . pro averfione ufitatiffi-
„ ma ac fane proficua funt. Ut ut enim
„ hæc faltem fint remedium palliativum,
„ et medeantur ophthalmiæ a posteriori;
„ tamen veriffimum eft, quod multum
„ illa valeant. Neque ipfe credidiffem
„ (ait) horum fructum adeo infignem
„ effe, nifi ipfe eundem vidiffem. Et
„ quidem nuchæ applicata juvant fenfibi-
„ liter, fi recte fluant; quia ibidem ar-
„ teria cervicalis fe dividit in duas par-
„ tes, internam etiam ad oculum pro-
„ gredientem, et in externam circa
„ nucham hinc inde diffeminatam: unde
„ veficatoria, dum in nucha faciunt do-
„ lorem, auctiorem eo fanguinis promo-
„ vent fluxum, dum ex ramo hoc inte-
„ riori fit derivatio quafi ad ramum ex-

(y) l. c. p. 592.

„ teriorem, ut minori impetu ac copia
 „ sanguis ad oculum affluat „ Et A. G.
 RICHTERUS (z) „ ortam (inquit) in-
 „ flammationem egregie dissipat usus em-
 „ plastrorum vesicatoriorum. In primis
 „ illa profunt, si magna sunt, et loco,
 „ qui ab oculo affecto non nimis distat,
 „ applicantur, sique exulceratio, quam
 „ pariunt, diu protrahitur. Inde nu-
 „ chæ . . . pone aures . . .
 „ imo ipsis temporibus impono hæc
 „ emplastra manum majorem aliquando
 „ æquantia . . . Vidi vero aliquo-
 „ ties sub usu vesicatoriorum rediisse
 „ corneæ claritatem spe et expecta-
 „ tione majorem „ (*). Et ophthalmiam
 in primo suorum ægro (a) solis iteratis
 catharticis ac vesicantibus percuravit.
 Perinde F. HOME (b) vesicantia tempo-
 ribus applicata, præsertim si ulcera eo-
 rum ope unguenti in fonticulis usitati
 dies aliquot in fluxu servantur, in per-
 tinacibus ophthalmiis optimum esse te-
 statur auxilium. Et R. RESTAURANT (c)

(z) Obs. chir. fasc. 1. Cap. 11. p. 113.

(*) Ibidem p. 115.

(a) Ibidem Cap. 13. obs. 1. p. 122. sqq.

(b) Clinische Versuche 2 Abschn. p. 35. sq.

(c) HIPPOCR. de inustionib. sive fonticulis
L. 2, Sect. 8. p. 162.

„ nihil (ait) utilius inunctionibus ad ca-
„ put, cervicem, sed præcipue ad tem-
„ pora e directo oculi laborantis, parvo
„ vesicatorio factis, quibus inflammatio-
„ nes gravissimas unius diei spatio ad sa-
„ nitatem perductas fuisse expertus sum
„ in quavis tempestate anni tum frigida
„ tum calida,,. Porro C. BISSET (d)
non nullis in casibus observavit vesican-
tia a capitis vertice ad synciput usque
applicata et dies aliquot in fluxu serva-
ta celerius revellere, quam si occipiti,
nuchæ, maxillæ, vel pone aures appli-
centur, adeo ut sæpe intra breve tem-
pus vehementissimam ophthalmiam humi-
dam vel sustulerint, vel minuerint ad-
modum. „ Ad illas autem partes, in-
„ quit A. STÖRCK (e), a quibus acris
„ materies oculos versus derivata fuit,
„ cataplasinata irritantia, et si possibile
„ sit, emplastrum vesicans apponendum
„ est, ut sic demum omnis acrimonia
„ ad eas revocetur,,. Videamus vero
jam exempla vesicantium artubus, nuchæ,
pone aures, ad tempora, imo ad ipsum
caput cum fructu hic applicatorum. „
„ Vetula quædam in Italia uxor cujus-

(d) l. c. p. 105.

(e) Præcept. med. pract. T. 1. p. 83.

„ dam serpentarii cum oculos haberet
 „ lippientes, lacrymantes, et saniosos
 „ cum intenso dolore et pruriginē, cum
 „ nullis remediis posset curari, tandem
 „ raso capiti emplastrum impositum est,
 „ quod constabat ex ♂^e cantharidum, et
 „ fermento ac melle, excitatisque vesi-
 „ cis ac ruptis butyro imposito ac de-
 „ mum caulis folio; quo præsidio perfe-
 „ cte curata fuit, ut ex arcanis GISB.
 „ HORSTII. . . Romæ exaravit „
 P. FORESTUS (*f*). Perinde refert
 L. HEISTERUS (*g*) puerum quadrimulum
 tanta utriusque oculi laborasse ophthal-
 mia, ut eos nec aperire fere, nec luci
 objicere posset, quam vitaturus omnimo-
 de pronus in faciem semper jacebat. Ve-
 teranus medicus octiduum efficacissimis
 remediis internis externisque in cassum
 datis, tandem raso capitis vertici ante
 somnum imposuit vesicans nummum im-
 perialem magnum. Et ecce mane poste-
 ro inflammatio tantopere jam imminuta
 vixebatur, ut puer oculos et aperire et
 circumspicere libere quiverit. Plaga in-
 de velicantis rite tractata oculi intra tri-
 duum ita emendati sunt, ut inflammatio-

(*f*) l. c. schol. ad obs. 12.

(*g*) Medic. chir. u. anat. Wahrnehm. I Band n. I.

ne prorsus ablata puer pristino gauderet
vili. Hoc ipsum remedium Auctor post-
modo similibus in casibus sæpenumero
egregio cum successu adhibuit. Apud
J. A. REIMANNUM (b) ,, femina nobi-
,, lis sanguineo-melancholica, aliquot
,, liberorum mater, chronica inflamma-
,, tione oculi sinistri, sæpiusque quam
,, primum se aeri liberiori exponeret,
,, recidivante correpta, nescitur qua ex
,, causa, fuerat. Hæc præter alia me-
,, dicamenta, quæ aversabatur. consilio
,, cujusdam medicastri utrisque tempori-
,, bus applicavit vesicatorium, et ex hoc
,, tempore ad præsens usque absque o-
,, mnino ulteriori recidiva sanissima degit.
,, Dolorosa equidem est vesicatorii effi-
,, cacia hac in parte corporis; experiri
,, tamen volumus in aliis simili morbo
,, affectis ægris, sed semper spe frustra-
,, ti sumus; licet enim præsentem in-
,, flammationem alleviarent, recidivam
,, tamen tollere non poterant,,. Id
utique raro admodum efficiunt; cum ul-
cera illorum in menses annosque aperta
teneri sine immenso ægrorum incommo-
do nequeant, quem in finem fonticuli iis
ac setacea substituantur: sed præsentem

(b) l. c. p. 119.

humorum in oculos fluxionem ab iis minui, aliorumque averti, satis utique est; quod quanti sæpe fit, dum post alia in cassum tentata solis id vesicantibus obtineri potest, docet V. RIEDLINI (i) casus: „ femina quædam 20 annorum, „ cetera quidem sana, at gibbosa, cum „ inde mensium fluxum nunquam ordinari- „ rium experta fuisset, via sanguini ad „ inferiores partes quodammodo inter- „ clusa ex eodem ad superiora regurgi- „ tante varia mala faciei in primis insi- „ dantia patitur, inter quæ bis terve „ jam ophthalmia præsertim molesta ex- „ stitit, quæ nempe oculo dextro tantas „ insidias struxit, ut bis terve jam illius „ usu per aliquot dies caruerit. Ut ut „ vero causæ præsertim, et quidem va- „ riis modis obviam iverim, et menses „ movere tentaverim, unde martis in „ primis usum aliquoties sic sat diu con- „ tinuavit, aliquoties etiam purgantia „ convenientia sumpsit, et quædam alia „ quoque diligenter in usum duxit. Si- „ cuti tamen scopum hunc assequi nun- „ quam potui, nam licet bis terve venæ „ uterinæ aliquantum, fuerint, statim „ tamen sanguinem profundere ulterius

(i) l. c. No 584.

„ iterum defierunt), ita ophthalmia cum
„ fœnore rediit. Unde aliquando post
„ aures vesicas excitari jussi: et ecce!
„ emplastro hunc in finem imposito vix
„ operationem suam exserente statim o-
„ culi dolor remisit, inflammatioque o-
„ mnis sic sublata fuit, ut vix indici-
„ um tanti mali superfuerit. Cumque
„ post aliquot hebdomadas malum redi-
„ illet, sponte ad prius remedium redi-
„ it; licetque nunc in brachio dextro
„ serum peccans sic elicuerit, quam pri-
„ mum tamen percepit emplastrum vesi-
„ catorium cuticulam aggressum fuisse,
„ summum statim iterum in oculo leva-
„ men notavit, qui paulo post integre
„ restitutus fuit „. Sæpenumero etiam
vesicantia mox post vacuationes alvi ac
sanguinis applicata ita ophthalmiam mi-
nuunt, ut reliquæ topicis ad oculos de-
inde adhibitis celerrime dissipentur. Sic
cum G. HORSTII (k) puella octennis e
copiosissimis faciei præsertim variolis am-
blyopiam oculi dextri cum macula ante
iridem et vicinarum partium inflamma-
tione pateretur, post datum hydragogum
e morfulorum mechoacannæ ℥iij applica-
tum pone aurem sinistram vesicans, et

(k) Obsc. . . medic. Lib. 2. Obs. 19.

plaga ejus per aliquot dies appositis bis quotidie brassicæ foliis in fluxu detenta, ita minuit inflammationem, ut reliquum illius facile abegerit sequens oculis admotum F. PLATERI (1) cataplasma:

℞. Pulpæ pomor. dulc. ꝑ℞. coq. in
 ∇^a fœnic. et ros. s. q. ad pult.
 consist. adde

Mucilag. sem. fœnugr. ℥ij

Lap. hæmat. ppt. ℥j. M. applicetur per dies aliquot, in primis somni tempore. Ad maculam porro abigendam roborandumque oculum post cataplasmatismum crebro eluebatur oculus MR^a sequenti (cujus folius crebro usu maculas et suffusiones plane sublatas vidit Auctor):

℞. ∇^a Rosarum

— Fœnicul. aa ℥iij

Margarit. pp. ℥j. M.

Interdum pertinacior morbus iteratam vesicantium applicationem exposcit, cujusmodi exemplum apud BAYRUM (m) reperire est de viro diuturnam ophthalmiam ferocem et ad remedia quæque contumacem passio, cui demum vesicans e fermento et cantharidibus ad collum se-

(1) Observ. med. Lib. I. p. m. 107.

(m) L. 3, C. 16. (v. FOREST. l. c.)

mel atque iterum applicatum, diuque in fluxu servatum sanitatem reddidit (inuncto tamen quotidie palpebris, quæ ruborem asperitatemque simul contraxerant, unguento rosaceo), nunquam abhinc amplius reverso morbo. Magis insignem ejusdem commatis casum G. SCHUSTER (n) iuppeditat de viro 50 annis majori, qui semper ante sanus nuper media æstate consiliari cœpit hemicrania dextri lateris cum oculi dextri taraxi. Cum medicum nactus fuisset æger remedium magis quam indicationum gnarum, præpostera eorundem sine discrimine per 4 menses administratione morbus uterque usque adeo in horas crevit, ut taraxis in gravissimam adoleverit chemosin cum aquei humoris conturbatione. Accersitus tum circumforaneus ophthalmiater adhibitis rursus aluminosis, spirituosus, aliisque calidis malum ita reddidit deterius porro, ut dextri oculi ex atro rubentis pupilla evaserit ovalis, et in lævum quoque oculum inflammatio serpsit. Inde ab Augusto in Martium usque afflictus æger Auctoris demum opem poposcit. Dempto itaque sanguine, subductaque alvo, vesicans palmam

(n) Obs. med. chir. de chemosi 4. Lipsiæ 1754.

latum ad processum mastoideum in occipite poni ac 10 dies in fluxu teneri ille iussit; cujus plaga non dum conſanata alia duo veſicantia internæ brachiorum ſuperficieſei admota rursus 8 aut 10 dies in fluxu ſervabantur; hiſque ad conſanationem tendentibus rursus alia ſuris pedum ſunt admota. Diætâ interea blanda, æquofa ac tenuis imperata. Oculis loco obſcuro non fumoſo commorantibus collyrium ex aqua ſclopetaria et ſambuci, croco, camphora, ac demum ſaccharo Saturni ope linteoli tepide applicarum, eique ſacculus vino calido imbutus et aqua Reg. Hungariæ camphorata conſperſus, cumque inaruit, rursus madefactus, ſuperimpoſitus. Interne infuſa idonea purificantia cum regulo ꝓ medicinali paratâ pro ſorbillando data. Queis effectum eſt, ut vehementes capitis dolores intra ſeptimanam levarentur, et rivi inflammatorii bulbum palpebrasque occupantes diſcuſſi plane exſiccarentur. Primis diebus æger meliuscule habens inſequentibus ex toto recte valere viſus eſt. Oculus lævus intra menſem proſuſ ſanatus fuit, dexter autem nativâ figura et colore recuperatis cicatricem cornæ non exiguam, a qua pupilla aliquatenus tangebatur, retinuit viſui magnopere offi- cientem, ut oculi hujus viſu æger ca-

ruerit. Cum autem plerique omnes vesicantia locis oculo affecto vicinis (capiti, temporibus, pone aures, nuchæ) imponi jubeant, sciendum est, interdum contra esse faciendum; namque F. HOFFMANNUS (o) „observavit, quod in „nucha non adeo conducant (puta semper), sed potius dolor inde augeatur; „cum contra pedibus admota sæpe simul „ac humor stillare incipit, dolorem levat, id quod pulchre confirmat casus OEHMBII, quem in superioribus (p) dedimus. Quod tamen cum a priori (ut ajunt) prænosci vix possit, ab effectu æstimandum erit. Denique ubi vesicantia inflammationem imminuunt quidem, et non ex toto abigunt, vel abactam prævertere nequeunt, eorum in locum diuturniora ulcera sunt excitanda, qualia præ primis in nucha vel artubus excitantur, nempe

(o) Diss. de vesicant. et fonticulor. circumspetto in medicina usu §. 12. Opp. T. 6. p. m. 69.

(p) Vide §. 48 No 4.

§. 65.

FONTICULI, *setacea*, quorum efficiendi modum in L. HEISTERO (q) videre est. Quantæ autem hæc ulcera ad ophthalmias pessimas conſanandas ſint efficaciæ, numeroſi caſus commonſtrant. Sic „ coquus monachorum . . . pituita ad „ oculos deſcendente graviter vexabatur: „ factis tandem evacuationibus univerſalibus ac particularibus laqueum ad „ nucham indidimus, inquit AMATUS (r), „ et bene habuit. Perinde G. F. HILDANUS (s) in continenti ad oculos deſluxione „ continua (ait) ut invenia- „ tur diverſio aliqua, necesse eſt; alio- „ quin reliqua omnia fruſtra adhiberen- „ tur. Nulla autem diverſio præſtantior, „ nulla utilior, imo et ſecurior inveniri poteſt ſetaceo et fontanellis, ut ego „ ſæpiſſime et in multis expertus ſum, et „ in dies experior. Inter quos (t) „ A. 1603 curandam habui puellam . . . „ 12 annos natam, quæ præ deſluxione

(q) Chirurgiæ P. 2. C. 19. & 101.

(r) l. c. Cent. 1. curat. 43

(s) Epist. med. 56. (Opp. p. 1001.)

(t) Obſ. et cur. medic. chir. Cent. 1. Obſ. 41. exempl. 4.

„ et inflammatione ad oculos visum pla-
„ ne amiserat. Purgato corpore, insti-
„ tutaque victus ratione, et setaceo ad-
„ hibito visum unius oculi recuperavit;
„ alterius enim oculi tunicæ ante annos
„ 4 ex simili defluxione et inflammatione
„ exesæ et plane corruptæ fuerant „.
Ita etiam „ dum ante 19 annos cel. chi-
„ rurgum J. CASSERUM Placentinum
„ . . . ad praxin comitarer, insit W. GA-
„ BELCHOVERUS (u), factum est, ut
„ vocatus fuerit ad puellam quamdam
„ ante semestrem modo natam, quæ infi-
„ gni utriusque oculi inflammatione la-
„ borabat, ita ut oculi vix videri pos-
„ sent. Is, ne excœcicaretur, ut humo-
„ res calidi ad oculum decumbentes
„ revellerentur, statim setaceum cum
„ ferro candente occipiti inussit, et post
„ triduum puella ab omni inflammatione
„ . . . liberata fuit . . . H. FABRICIUS
„ AB AQVAPENDENTE huiusd. JULII
„ antecessor, Præceptor meus, setaceum
„ in occipite pro ophthalmicis summo-
„ pere commendabat, quod in vita sua
„ bis se gestasse affirmabat, cum esset
„ adolescens et in consistenti ætate, ad-
„ debatque se fuisse semper curatum ab

(u) l. c. p. 75. 6q.

„ hac inflammatione , ut in extremam
„ usque ætatem spécillis ocularibus non
„ indiguerit „. Perinde J. D. METZ-
GERI (*) „ annosa mulier sclerophthal-
„ mia laborans atroces potius dolores
„ per 15 dies perpessa est , antequam
„ auxilium . . . efflagitaret. Bis venam
„ secari curaverat , purgans assumpserat
„ sine successu. Setaceum nuchæ injici
„ jussit. Suppuratione excitata dolores
„ quidem , rubor , durities , tumorque
„ palpebrarum cessavere ; sed visus ob-
„ scuritas remansit , cui ulteriora auxi-
„ lia adhibere recusavit „. Plures id
genus casus continuo in sequentibus vi-
suri sumus. Cum vero tanta sit fonticu-
lorum ac setaceorum hic energia , operæ
pretium est omnia uberius in medium
adferre , quæ legitimam eorum admini-
strationem concernunt , nempe loca , ubi
efficiuntur , indicantia , cautelas , et con-
traindicantia , ne uspiam in iis tiro
cespitet.

1. *Loca* pro his ulceribus solennia sunt

a) *Brachia* , in quibus fonticuli vul-
go excitantur ; qui etsi in femoribus
quoque , nucha item , et sagittalis futuræ

(*) l. c. p. 166. sq.

cum coronali concursu effici soleant (y), in ophthalmia tamen rarius in nucha, ut PLATERUS (z) fecit, plerumque vero in brachiis locum sibi vindicant, ubi excitatis a morbo convaluere duo Vratislavienfium (a) ægri, BIERLINGII (b) femina, HANNEMANNI (c) chiliarcha, mulier LENTILII (d), MUYSII (e) ac RUCKERI (f) puellæ, SCHULZII (g) juvenis, THONERIQUE (h) puer, et plurimi alii.

b) *Mentum*, vel *angulus maxillæ* alteruter. Testatur enim c. BISSET (i) in scrophulosa præsertim ophthalmia nihil juvantibus aliis ab setaceis menti, si uterque oculus affectus fuerat, vel alterutrius anguli mandibulæ in alterutrius oculi malo, sanitatem fuisse obtentam; quandoquidem isthoc setaceorum genus

(y) GEACH l. c. p. 9.

(z) Vide infra No 2. a).

(a) Vide infra No 2. b).

(b) Vide infra No 3. f).

(c) Vide infra No 2. b).

(d) Ibidem No 3. b).

(e) Ibidem No 2. b).

(f) Ibidem No 3. e).

(g) Ibidem f).

(h) Ibidem No 2. b).

(i) l. c. p. 102. seqq.

fetaceis nuchæ celerius, præsertim in ophthalmite VOGELII, opitulari. observavit: viro 56 annorum ex ischiadis metastasi ophthalmitem unius oculi in 6 hebdomades ad consveta remedia prorsus contumacem passo, jamque viribus prostratis, cum 7 hebdomade materiæ ischiadicæ per phlebotomiam pedis, cucurbitas et vesicantia ad externum lumbaris regionis latus, pediluviumque calidum semine sinapi acutum, pristinum ad locum revocatio perinde in cassum tentata fuisset; demum applicatum sub mandibula fetaceum intra 14 dies morbum sustulit, at superstite amaurosi, quam forte maturior fetacei usus avertere potuisset. Operationis hujus theoriæ non parum lucis affundere videtur sequens ejusdem Auctoris (k) observatio: homo 22 annorum incidit (e scrophulosa, ut videtur, diathesi) in vehementem oculi dextri ophthalmiam, corneam ex albido opacam reddentem, cum palpebris tumentibus et clausis, humorisque inde serosi ac puriformis effluxu: unde lævus etiam oculus affici, at levius, cœpit. Facta V^æ Sⁱ, data cathartica, cortex, et alia alterantia,

(k) Ibidem p. 100.

terantia, admotum vesicans, et demum idonea quoque ophthalmica; verum omnia in calsum. Nec plus profuit maris balneum. Auctor demum 4^e morbi mense accitus setaceum sub maxilla applicaturus, parvam ibi mobilemque glandulam repertam auferre prius decrevit. Hujus sub ablatione a læsa arteria maxillari externa vehemens oborta est hæmorrhagia; sed ocyus expleto spongia vulnere linteam carptum, splenium, ac plumbea lamella imposita, omniaque idonea fascia firmata sunt. Die inde 5^o aut 6^o sub alvi durioris exoneratione hæmorrhagia levis recrudit. Visum itaque est arteriam ligatura constringere, cum ad novam impediendam hæmorrhagiam, tum præsertim ad ophthalmiam celerius abigendam. Et vero intra 4 aut 5 ab ligato vase dies ophthalmia cum tumore palpebræ dextræ evanuit. Oculi inde ut ut aperiri potuerint, debiles tamen adhuc et sensibiles mansere; non multo tamen inde post per corticem et quotidianam aquæ frigidæ capiti affusionem tonum recuperarunt. Celeris hæc sanatio non tam duplici illi hæmorrhagiæ (cum per primam non nisi 16j sanguinis per alteram vero exiguum quid elapsum sit, et mox initio morbi Væ So facta morbum nihil mutarit), quam maxillaris

arteriæ, a qua notabilis ramus, arteria angularis nempe, ortus pro parte in musculo orbiculari palpebræ distribuitur, deligationi maximam partem debebatur. Quod autem eodem tempore sinister quoque oculus fuerit sanatus, in causa est et exilitas in eo inflammationis et forte consensus cum dextro. Abhinc oculi vigorem nacti sunt, neque multum dextra pupilla ex morbo passa est.

c) *Nucha* plerumque setaceis (quamvis, ut dictum, fonticulis quoque gerendis apta sit) trajiciendis inservit, queis ab ophthalmia vindicati fuere complures cum HILDANI (l) tum REIMANNI (m), et quos paulo post visuri sumus, ægri, uti et quorum jam ante (n) meminimus.

d) *Oculorum venæ* etiam ustione ulcerari olim solebant, at citra setonem vel globulum in ulcus inditum; narratque P. BORELLUS (o) „ quemdam me „ dicum ophthalmicum magnas sibi divi „ tias Lutetiæ comparasse, cauteria „ actualia venis oculorum debiliū et

(l) Vide supra p. 299. sq, et infra No 2. b.) d).

(m) Vide infra No 2. b), No 3. c) f).

(n) Vide supra pag. 299. sq.

(o) l. c. obs. 97.

„ rubrorum admovendo, quod sæpe ei
 „ feliciter successit, proque novo habe-
 „ tur remedio; sed . . . in libro HIP-
 „ POCRATIS de visu describitur, „ Per-
 tinet res nempe ad Veterum ophthalmox-
 ysin, de qua superius mentio facta (p).

e) *Mastoideæ apophyses*. J. B. MOR-
 GAGNIUS (q) „ pluribus . . . vidit
 „ plurimum profuisse, viroque præser-
 „ tim Bononiensi, qui sic abacta dextri
 „ oculi inflammatione, cum mox sinister
 „ eodem morbo caperetur, in cassum ad-
 „ hibitis ceteris, nullo potuit, nisi eo-
 „ dem auxilio, restitui, cute videlicet,
 „ quæ pone auriculam est, impositis iis,
 „ quæ erodendi vim habent, exulcerata „
 R. A. VOGEL (r) utilissima hic esse ul-
 cera, Londinensi caustico mitiori pone
 aures forma synapismi admota excitata,
 testatur. Primus, quantum e monumen-
 tis Medicis mihi constat, ulcera hisce
 locis ope lapidis caustici excitari cum
 fructu docuit A. BELLOSTE (s), rem
 olim a magistro suo PARIS edoctus.
 Narrat is casum hac occasione A. 1691--2
 ab se visum, ultra fidem humanam po-

(p) Vide §. 55. B. No 6.

(q) l. c. Epist. 13 No 24.

(r) Neue medic. Biblioth. 6 Band p. 401.

(s) Chirurg. d'Hopital T. 2, p. 282. sqq.

nendum, nempe miles juvenis in nosocomium venit cum bulbo unius oculi usque adeo consumpto, ut orbita inde cava majorem avellanam nucem facile recepisset, cujus in fundo particula tantum rubellæ carnis visebatur. Infortunium hoc citra ullam externam vim accidit. Ad alterum igitur oculum conservandum iussit Auctor modo ante dicto pone utramque aurem ulcera excitari. Post 3 hebdomades conspicatus ægrum binis oculis sanis præditum, noluit credere ipsum illum esse, donec ulcera pone aures nondum sanata fidem fecerunt. Nisi vero casus hic ad analogos superius (t) dictos referendus sit, tam parum nobis credibilis utique videri debet, quam parum illum Auctor ipse, si ab aliis eum sibi narratum accepisset, se crediturum fuisse affirmat. Interea quantum ad ulcera dicta attinet, DE LA METRIE (u) quoque testatur ophthalmias contumacissimas ab se visas fuisse, eorum ope conсанatas.

f) *Auricula.* „Singulare, inquit „ T. BARTHOLINUS (v), ophthalmiæ

(t) Vide §. 34 No 1. b).

(u) Observ. de Medecine pratique Obs. 62. p. III.

(v) Histor. anat. rar. Cent. 4. hist. 80. p. 395.

„ remedium ab amico mihi communica-
„ tum lectoribus non invidebo. Auris
„ lobulus lateris affecti perforetur, per-
„ que foramen factum trajiciatur turunda
„ longiuscula ex inverso et convoluto
„ cortice radice laureolæ. Sinenda eo
„ loco turunda, donec auris et vicinæ
„ partes intumescant; tum leviter turun-
„ da commoveatur, ut aquæ copia col-
„ lecta effluat, qua exhausta detumescet
„ auris, et ophthalmia sedabitur „. Pe-
„ culiari id observatione confirmat L. R I-
„ VERIUS (x), nempe „ puella 20 anno-
„ rum dolore intenso et rubore insigni
„ oculorum cum lacrymis fere continuis
„ laborans per multos menses tandem eo
„ redacta, ut per annum integrum vix
„ oculos attollere, et sine alterius ope
„ progredi posset. Huic varia remedia
„ omnis generis administrata sunt, sed
„ frustra, soloque setaceo auriculari...
„ curata est. Scilicet in extrema parte
„ utriusque auriculæ facto cum stilo tri-
„ angulari ferro candenti foramine, im-
„ missisque radice thymelææ frustulis,
„ postea emplastro diachylone gummato
„ obvolutis, et ad instar setacei vulgaris
„ bis aut ter quotidie, si opus sit, re-

(x) Observ. medic. Cent. 4. Obs. 100.

„ novatis, per longum tempus „ Subdit Auctor, sæpe se vidisse, plus per hæc ulcuscula intra nycthemeron effluxisse, quam per 10 dies e setaceo vulgari. Hinc etiam „ S A N C T O R I U S Venetum „ quemdam infertis radicibus thymelææ „ auriculis perforatis a suffusione diu præ- „ servavit „ teste G. H. V E L S C H I O (y). Loco thymelææ etiam mezerei radice vel esulæ cortex vel hellebori nigri sumi potest, cujus postremi radicem huncce in usum ægrorum cuidam svasit B. T I M A E U S (z). Prolixiorem autem setacei hujus auricularis descriptionem præbet M. E T T M Ü L L E R U S (a).

2. *Indicant* porro setaceorum, fonticulorum, hisque similium ulcerum excitationem præ primis

a) *Recidivæ* crebræ facilesque. „ Profunt ait S W I E T E N I U S (b), in „ primis fonticuli talibus ægris, qui „ adeo flexiles habent solidas partes, ut „ minimo excessu impetus facillime dilatentur vasa, et errore loci crassiores

(y) Mictom. Cent. 2 No 63 in Misc. nat. cur. dec. 1. ann. 4. append. p. 39.

(z) Epist. med. Lib. 1. Epist. 22. No 5.

(a) l. c. p. 592.

(b) l. c.

„ fluidorum partes admittant. Sic v. g.
„ illis, qui levissima de causa ophthal-
„ mia laborant, toties profuit fonticu-
„ lus,, : id quod BIERLINGII (c) fe-
mina est experta, et „ vir 28 annorum,
„ refert J. A. REIMANNUS (d), san-
„ guineus, obesus, sedentariæ et otio-
„ læ vitæ deditus, oculorum inflammatio-
„ nem incurrere solebat, quoties frigi-
„ dior aura eum afflaret. Hic ex quo
„ in brachio opposito fonticulum sibi
„ inuri passus esset nostro consilio, nun-
„ quam amplius eam sub maximis etiam
„ aeris tempestatibus expertus est; quam
„ prius frustra præservatorio sine adhi-
„ bita Væ Se in pede suppressere ten-
„ taveramus,,. Idem etiam seracea præ-
stant. AMATI (e) „ puella nata annos
„ 17, sanguinea, obesa, obesitate qui-
„ dem carnosa, in ophthalmiam incidit
„ (absque procatarctica causa). . .
„ Cum morbus hic a variis humoribus
„ fieri soleat; in hac tamen puella a
„ plenitudine universum corpus gravan-
„ te ortum traxit: quod dignoscebatur,
„ quia . . . membrana conjunctiva dicta,

(c) Vide §. 65. No 3. f).

(d) l. c. p. 120.

(e) l. c. Cent. 4. curat. 68.

„ quæ natura alba est, ob sanguinis
 „ confluxum rubra apparebat, simulque
 „ ob habitum totius corporis, et ipſius
 „ calorem, ac ante habitum victum,
 „ non minus ex dolore oculi et partium
 „ illi circum vicinarum, et maxima ten-
 „ sione, simulque lacrymarum fervida-
 „ rum copia, hoc percipiebatur . . .
 „ Subtili admodum constituto victus or-
 „ dine, prout expedit, e sanguinis mis-
 „ sione (curam) auspicati sumus, illius
 „ præcipue venæ oculum affectum re-
 „ spicientis, quam cephalicam . . . ap-
 „ pellamus, ex qua sanguinis integram
 „ libram minui fecimus, et syrupum
 „ hunc ebibere:

℞. Syr. rosac. simpl.

— acetosi simpl.

— de endivia aa ʒʒ

▽^æ endiviæ.

— buglossi

— acetosæ aa ʒj. M. et quin-

„ quies iteretur. Porro cum syrupos
 „ bibebat, fomento quodam leviori ocu-
 „ lum lavabat, quod ita habet:

℞. Rosarum

Malvarum

„ Fœnugræci optime lavati aa p. j.
 „ in libris ij aquæ fiat decoctio suffi-
 „ ciens, et excolato decocto sponsia im-
 „ buta fiat fomentum; et postea linteo

„ absterfo oculo album ovi aqua rosacea
 „ exceptum et bene concussum, exce-
 „ ptum linteis illi admove. Ebibitis
 „ vero syrupis catapotia hæc deglutivit:

℞. Pil. Cōchiarum

— de luce maj.

— aurearum

— aggregativar. aa. ʒj

Diagrydii gr. v. cum

Syr. rosac. F. pil. quinque, inau-
 „ rentur. Capiat hora 2^a post mediam
 „ noctem. Tunc vero ejus caput attre-
 „ ctans in eo ulcuscula emanantia compe-
 „ rio, quæ an a morbo Gallico origi-
 „ nem traherent, in dubium vertebatur.
 „ Tunc vero apozemate hoc usa est:

℞. Borruginis

Lupulorum

Fumiterræ aa M. j

Polypod. querc. recent.

Fol. Sennæ aa ʒj

Hordei integri pug. ℥

Cort. myrobal. citr.

———— indor. aa. ʒj

Pass. de Corintho ʒiij. In ℥v
 „ aquæ F. decoctio, quousque maneant
 „ ℥iij. Facta colatura ac expressione
 „ adde syr. de fumoterræ ʒjv. M. F.
 „ apozema, de quo in aurora singulis
 „ diebus singulas octo uncias bibat. Quo
 „ ex integro epoto iterum catapotia de-

„ deglutivit , et optime purgata fuit.
„ Tunc collyrio albo et viridi usi fumus,
„ ac altero ex aloe lota et tutia præpa-
„ rata. Ceterum cum bene per 3 vel
„ 4 dies valeret, denuo fluxio reverte-
„ batur, et inflammatio pullulabat: tan-
„ dem ad laqueum supra nucham deve-
„ nimus; et optime valuit „. Perinde
„ dixit mihi nuper chirurgus , inquit
„ C. F. PAULLINI (*f*), . . . se in in-
„ veterata sæpiusque redeunte ophthal-
„ mia . . . usum setacei . . . fauste ex-
„ pertum fuisse „. Et J. A. REIMAN-
NI (*g*) puero solum setaceum ophthal-
miam plenilunio quoque reverti solitam
cohibuit. Ejusdem quoque utilitatis sæ-
pe sunt ulcera causticis excitata sine in-
dito vel setone vel globulo. F. PLA-
TERI (*b*) aurifaber oculum lævum ru-
brum tumidumque cum fluxu inde seroso
ac pupillæ obscuritate a longissimo tem-
pore per intervalla nactus, cum varia
usurpando morbum sæpius iis depulsum
denuo experiretur; tandem cauterio po-
tentiali ulcus in nuchâ factum eum a re-
cidivis præstitit immunem. Eadem ra-
tione „ quidam annos natus 30 , inquit

(*f*) l. c. p. 259.

(*g*) Vide infra in No 3. f).

(*b*) Obs. medic. Lib. 2. p. m. 359. sq.

„ J. MARFINUS apud L. RIVERIUM
 „ (i), temperamento sanguineo, sed ce-
 „ rebro admodum catarrhoso donatus,
 „ laborabat a longo tempore inflamma-
 „ tione, quæ tum adnatam tum utram-
 „ que palpebram occupabat. Affectus
 „ non erat continuus, sed recurrens.
 „ Varia usurpata fuerant antea remedia;
 „ sed frustra: tandem præscripsi duo cau-
 „ teria inter duas scapulas gestanda, nec
 „ non cucurbitulam, utramque ample-
 „ ctentem, applicandam, urgente nimi-
 „ rum fluxione. Quod cum præstitisset,
 „ sani omnino illius oculi evasere. Non
 „ parum ad illius curationem contulit
 „ unguentum sequens, quo in ipso cura-
 „ tionis initio usus fuit, purgato prius
 „ corpore sectaque vena:

℞. Viridis æris gr. xij

Camphoræ et

Lap. calamin. aa ʒss

Tutiæ ppt. ʒss

Butyr. rec. ∇^a ros. loti ʒij. M. F.

„ Unguentum „

b) *Contumacia* morbi præsentis
 ad alia remedia. Sic in Annalibus Vra-
 tislaviensium (k) describitur ophthalmia

(i) Observ. communic. 7. (Opp. p. m. 666.)

(k) Tent. 29 A. 1724 Aug. Cl. 2. art. 3. §. 1,
 p. 149.

popularis Eperjesiensis perquam contumax, ardente æstate A. 1724 observata in adultis, quæ sanguinis missionibus, catharticis, vesicantibus, diaphoreticis, topicisque oppugnata nihilo minus ægros, solem noctuarum instar fugientes, detinebat; cathartica minuebant quidem malum, tollere vero nequibant. Duobus ejusmodi ægrorum ob inflammationis vehementiam excitati fonticuli præsentissimum attulerunt levamen. Apud A. THONERUM (1) „ puer lue Gallica infectus, „ in simul oculi sinistri rubedine defœ- „ datus, cum alia remedia nihil confer- „ rent, tandem fontanella in sinistro bra- „ chio impressa, et vesicatorio in nucha „ admoto, immunis evasit „. Pariter J. MUYERS (m) „ puella (ait) 13 annorum „ jam per multos annos laboraverat do- „ lore et rubore oculorum ac palpebra- „ rum tumore, earumque post somnum „ absolutum coalitu ab humore viscido „ in materiam resinæ non abfimilem con- „ creto; hæcque ophthalmia jam per „ longum temporis intervallum a duo- „ bus chirurgis impugnata fuerat, ex-

(1) Obs. med. Lib. 2. Cap. de affect. ocul.
Obs. 5. p. 117.

(m) Prax. chirurg. rat. Dec. 1. Obs. 2.

„ pugnata minime . . . Quapropter usus
„ lum collyrio, quod constabat ex medica-
„ mentis multum salis continentibus,
„ ac præterea emplastrum ex similibus
„ paratum super oculos applicabam. His
„ autem parum profeci . . . Qua de
„ causa ægrotulam singulis septimanis bis
„ purgavi per alvum; sed frustra . . .
„ Tandem in ægrotulæ brachio secui vul-
„ nusculum, quod vulgo fonticulum di-
„ cunt . . . Interea temporis . . . ca-
„ taplasmate parato ex sola argentina in
„ aqua cocta ad mollitiem . . . poros
„ oculorum et palpebrarum blande ad-
„ stringebam . . . Atque ita hæc ægro-
„ tula vix uno mense a vulnere infli-
„ cto elapso incolumis evasit et per-
„ mansit. Ac eadem ratione plures post
„ hanc puellam pro voto sanavi,,. Haud
„ fecius narrante J. L. HANNEMANNO (n)
„ Chiliarcha . . . visus imbecillitate acri-
„ que defluxu cum rubedine oculorum
„ laborans, cum adversus hoc malum
„ omnia præsidia frustra experiretur, fon-
„ tanellam ipsi svasit medicus: cui consilio
„ obediens tam singularem successum jam
„ experitur, ut et ea, quæ antehac vix ocu-
„ lo perspicillis armato conspiceret, nunc

(n) Act. med. Hafniens. Vol. 3. obs. 12.

„ acute sine conspiciillis cernat, et qui-
„ dem senex melius, quam ante decen-
„ nium,,. Eadem sæpe est setaceorum
necessitas. A. HAEN (o) ubi multa ex-
perientia probata ad ophthalmias reme-
dia memorasset; „ quasdam tamen (sub-
„ dit) inflammationes ita ad omnia perti-
„ naces offendimus, ut visus minentur
„ jacturam: quibus una cum remedio-
„ rum dictorum plerisque setaceum nu-
„ chæ reperimus utilissimum,,. Ita
apud C. F. PAULLINI (p) „ puellæ...
„ ophthalmia multis jam annis laboran-
„ ti, et omnia in cassum tentanti...
„ efficacissimum remedium fuit evacua-
„ to prius corpore setaceum,,. Perinde
J. A. REIMANNI (q) „ 8 annorum
„ puer... diuturna scabie affectus, et
„ nescio quali medicatione usus, tantam
„ tandem incurrit ophthalmiam, ut nec
„ minimam perferre posset lucem, sed
„ vespertilionis instar obscura incoleret
„ continuo loca adeo, ut jam jam cæcitas
„ ex suffusione incipiente deturpato læ-
„ vore corneæ et humorum pelluciditate
„ immineret. Frustra per notabile tem-

(o) Rat. med. P. 9. C. 6. §. 3.

(p) De theriac. cœl. S. 2. P. 1. M. 2. §. 4. p. 126.

(q) l. c. p. 121.

„ poris spatium a suo medico tractatus
„ . . . nostro consilio uti vult . . . Ad
„ laqueum in nucha . . . confugio.
„ Quo facto quamvis copiosum viscidum-
„ que serum ploraret ulcus, transacto
„ integri mensis spatio paucula spes af-
„ fulgebat tandem; nil enim levaminis
„ conspeximus, nisi quod vespertinis
„ horis candelæ debile e longinquo lu-
„ men inspicere posset. Magnam nihilo
„ minus parentibus anxiiis de filii unici
„ statu fecimus spem, nec frustra; suc-
„ cessu enim temporis oculi serenari,
„ et omni inflammatione vacui et libe-
„ ri esse inceperunt, ita ut post 9 men-
„ sium spatium in integrum quoad utros-
„ que oculos convaluerit, relicta saltem
„ nubecula in uno horum, quam pingue-
„ dinis viperinæ usu feliciter sine omni
„ visus noxa . . . sustulimus,, Denique
et „ nobilis quidam . . . cum propter
„ diuturnum catarrhum ad oculos deflu-
„ entem visum fere amisisset . . . pur-
„ gato corpore, adhibitis quin etiam
„ cucurbitulis, setaceum nuchæ appli-
„ cuit G. F. HILDANUS (r), quo etiam
„ nunc absque magna molestia utitur;
„ visus quoque ita restitutus fuit, ut

(r) Epist. med. 59. (Opp. p. 1004).

„ nunc 60 annum ætatis prætergressus
„ absque perspicillis et legere et scribere
„ re possit „. Non nunquam vero nuchæ
ulcus caustico effectum sine fetone etiam
profuit. Apud F. PLATERUM (s) centu-
rio a largo vini potu hemicraniam dex-
tri lateris vehementem pati cœpit, do-
lorque circa meridiem exacerbatus ve-
speri mitescebat, aliquando etiam plane
remittebat. Accessit intensus oculi dextri
dolor, ruborque totam adnatam occu-
pans venis adeo turgentibus, ac si ru-
bra carnosâ pellicula ei esset instrata;
sicut et ambæ palpebræ intus forisque,
pupillaque obfuscata adeo, ut licet splen-
dorem videret, res tamen discernere ne-
quiret. Malum jam 6 hebdomades dura-
verat. Post plurima in cassum tentata
demum caustici ope ulcus in nucha ero-
sum, diuque in fluxu servatum ophthal-
miam sustulit, superstiti nihilo minus
corneæ macula alba pupillæ opposita,
visum adeo impediens, ut cum lucem
oculo æger perciperet, res distinguere
nullatenus quiret. Verum indita oculo
aqua ophthalmica ex fellibus, terebin-
thina, melle, sulphure, vinoque destil-
lata omnia in melius cesserunt.

c) *Epi-*

c) *Epiphora acerrima*, erodens. „ Si
„ effluens materia, inquit F. GEACH (t),
„ nimis quam acris est, ut cilia erodat,
„ carnosasque partes crudas reddat ac in-
„ flammēt, revellere eam oportet per
„ continenter applicata vesicantia aut se-
„ tacea „: illa in recenti malo, hæc
vero in vetusto jam, aut si vesicantia
minus fuerint efficacia, locum habent.

d) *Acrimonia humorum* tenuiorum
sanguine, lymphæ præ primis, ut mor-
billosa, variolosa, scrophulosa, arthriti-
ca, scabiosa, &c. „ Cum . . . grassanti-
„ bus epidemice inter pueros et infantes
„ variolis . . . plurimi horum, inquit
„ REIMANNUS (u), ophthalmiis va-
„ riisque visus per nebulas, ungues,
„ pterygia, suffusiones &c. deturpatio-
„ nibus et corruptionibus affligerentur,
„ infidam vesicatoriorum . . . pone au-
„ res aut in nucha vel brachiis aut pe-
„ dibus . . . locatorum deprehendi effi-
„ ciam; morbum enim non tollebant,
„ sed ad pauculos dies, durante nempe
„ effluxu materiæ serosæ, mitigabant:
„ taceo dolorum impatientiam in simili-
„ bus ægris et inquietudinem inde pro-

(t) l. c. p. 9. sq.

(u) l. c. p. 120.

„ gnatam, qua impediēbamur uti recen-
„ tiorum artificio, admixtione scilicet
„ emplastri veficatorii portiunculæ ordi-
„ nario veficatis locis apponi solito em-
„ plastro pro consolidatione ita impe-
„ dienda et ad plusculos dies adaper-
„ vefica conservanda, utpote ex quo
„ ipsi adultiores majores fere quam ex
„ ipso veficatorio sentire querulantur do-
„ lores. Substituimus vero optato sane
„ cum successu fonticulos in brachiis,
„ qui minori cum molestia ope cauterii
„ potentialis excitabantur et gestaban-
„ tur, continuatoque effluxu feri visci-
„ di malum non tollebant saltem, sed
„ ab omni recidiva et ulteriori noxa cer-
„ to et constanter tutabantur,,. Perin-
de J. G. GULBRAND (x) „ post variolas
„ naturales . . . ultimi stadii (inquit)
„ suborta fuit inflammatio oculi sinistri
„ in puella 12 annorum ante morbum
„ sanissima; evasit inflammatio in dies
„ gravior, tota cornea intense rubuit,
„ lucem ferre nequit ægra, lacrymatio-
„ nes calidæ super genam sæpissime ca-
„ dunt, palpebræ noctu conglutinantur.
„ Diem ultra 15^{um} nec parentum indul-

(x) Act. soc. med. Hauniens. Vol. 2, Obs. 25.
P. 309.

„ gentia , nec prava puellæ educatio
„ permittit ulteriorem usum remediorum,
„ quam laxans ex aqua lax. Vienn. sale
„ polycresto nupta omni 3^o die, fotum-
„ que externum ex solutione sacchari sa-
„ turni granis aliquot cum aqua rosarum.
„ Respuere hortatione quotidiana usum
„ applicationis hirudinum et Væ Sis ;
„ consentiebant demum vesicatorium in
„ nucha bis applicatum. Status oculi
„ idem persistit finita jam hebdomade
„ 4^a , dum collectio purulenta conspi-
„ citur retro corneam , visum ejusdem
„ oculi abolitum esse tantum judicari
„ potuerit , quando vi ob intolerantiam
„ lucis palpebræ a se invicem disjunctæ
„ sunt. Parentes denique obstupefacti
„ auxilium implorarunt , ægramque filiam
„ curæ meæ , quidque bonum mihi vi-
„ deretur faciendum , tradebant. Adhi-
„ bui remedium a D. JANIN (y) maxi-
„ me laudatum pro oculi fomento , quod
„ sequenti modo paratur :

℞. Flor. malvæ pug. j. coqv. in

Aqv. font. per 5 vel 6 minuta pri-
ma, filtratur , et adde

℥ camphorati gtt. vj. Quod re-
„ center quaque vice pro usu adhiben-

„ dum sit . . . Hoc remedio sæpius de
„ die tepide fomentatur oculus morbo-
„ sus, linteamina hoc decocto humecta-
„ ta super palpebras applicata ad perfe-
„ ctam sanationem usque; nec omisi D.
„ JANIN svadente ad solvendum hypo-
„ pion remedia derivantia, uti purgan-
„ tia et vesicatoria. Cum vero vesican-
„ tia antea sine fructu adhibita fuere,
„ fonticulum brachii sinistri ejusdem ac
„ oculi lateris posui, majus inde exspe-
„ ctans auxilium . . . Præterea quoti-
„ die ter electuarium mundificans sumen-
„ dum jussi, diætamque tenuem anti-
„ phlogisticam, laxationem omni 8^o die
„ ex rad. jalapp. gr. xv. calomel. opt.
„ gr. v dedi. Peractis 3 hebdomadibus
„ inflammatio oculi pedetentim evanuit,
„ et ante 2 hebdomades collectio puris
„ retro corneam disparebat. Pupilla cla-
„ ra est, lucem perferre potest. Præ-
„ senti tempore solum fonticulum gerit,
„ et nullis remediis, si exceperis diæt-
„ tam supra descriptam, utitur: oculum
„ tamen cum debita præcautione conser-
„ vare svasi,,. Ophthalmiæ ab arthriti-
„ ca depositione curationem per fetaceum
„ ab eodem Auctore factam alibi (z) dabi-

(z) Vide infra No 3, d).

mus. Similia quoque duo exempla narrat G. F. HILDANUS, nempe (a) puella „ post variolas ophthalmia ex utroque „ oculo adeo laborabat, ut de visu periret, clitaretur. Multa ipsi quoque, sed „ frustra, præscripta fuerunt remedia „ . . . Tandem . . . setaceum ipsi . . . „ applicavimus, cujus beneficio . . . „ brevi quoque curata fuit „. Porro (b) „ filia mea ætatis suæ (anno) 50, cum „ A. 1596 gravissime ex variolis laborasset, et hinc inde defluxione ad oculos duorum annorum spatio misere vexata fuisset, nec ullis remediis curari „ posset, setacei tandem A. 1589 adhibitione, quo defluxus ad nucham revocatus et evacuatus fuit, paulatim et „ ipsa et oculi ejus defluxionum immunes . . . convaluerunt „.

3. *Cautelæ* porro in fomiculis ac setaceis et analogis ulceribus administrandis non nullæ sunt tenendæ; ne improvide cruciatus ægris causemus. Harum præcipuæ sunt, ut

a) *Vacuationes præmittantur universales*, ubi humores vel copiosi vel pravi eas

(a) Obs. et cur. med. chir. Cent. 1. Obs. 41. exempl. 2.

(b) Ibidem exempl. 3.

exposcunt; ne fecus impetu eorum sursum per ulcerum stimulos converso morbus augeatur. Hinc F. HOFFMANNUS (c) „setacea et vesicatoria (inquit) „non facile applicanda in plethoricis, „nisi soluta prius plethora, et alvo præ- „sertim in cacochymicis subducta „.

b) *Fonticulus brachio lateris ejusdem cum oculo affecto inesto*; imo si uterque oculus inflammatus fuerit, haud raro utriusque brachii fonticulum poscit. Sic in brachio sinistro excitatus fonticulus ophthalmiæ ejusdem lateris in puella GULBRANDI (d) pueroque THONERI (e) medebatur. Perinde R. LENTILII (f) mulieri post diuturnam in infantia crustam lacteam illito demum flore lactis cum oleo amygd. depulsam cum ophthalmia oborta fuisset lucis omnis impatiens, atque ad omnia rebellis, inustus tandem uni brachio fonticulus oculum ejusdem lateris sanavit, non item alterum; donec in altero quoque brachio fonticulus excitatus plenam attulif-

(c) Med. rat. syst. T. 4. P. 1. S. 2. C. 11. cautelar. §. 2.

(d) Vide præc. No 2. d).

(e) Ibidem b).

(f) Eteodr. med. pract. A. 1709. Jul. 2. p. 659.

set sanitatem. Inde post aliquot annos fonticuli sibi relictī coaluerunt sine ullo alio consecuto incommodo. Similem quoque casum deinde ex BIERLINGIO (g) videbimus.

c) *Setaceum fonticulis non juvantibus sufficiatur* ; aut si illis binis opus esset ob ambos oculos laborantes, utrique setaceum æquipollere creditur. Ita consultus HILDANUS (b) a quodam utriusque oculi ophthalmiam passō „ hu- „ mores et vapores (ait) ad oculos „ affluentes fonticulis ad partes minus „ nobiles perbelle revocabis; sed quia „ malum utrumque oculum occupat, ac „ proinde utroque brachio causticum applicare necesse esset, svaderem potius „ setaceum; cum quia minus erit molestum quam duo fonticuli, tum etiam „ quia major per illud fiet a capite et „ præcipue ab oculis evacuatio humoris „ peccantis „. Quantum vero fonticulis hic præcellant setacea, sequentes observationes nobis documento esse poterunt. G. A. MERCLINI (i) „ juvenis . . . „ 19 circiter annorum, bilioso-sanguini-

(g) Vide infra in f).

(b) Epist. med. 59. Opp. p. 1004.

(i) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 1. obs. 94.

„ nei temperamentis, optimoque et robu-
„ sto alias corporis habitu præditus, nisi
„ quod defluxionibus capitis subinde ob-
„ noxius a 9^o jam ætatis suæ anno fon-
„ ticulum gestare coactus sit, utriusque
„ oculi ophthalmia gravissima, alias qui-
„ dem etiam satis sibi familiari, corri-
„ pitur, qua cum jam pene ultra octi-
„ duum laborasset, frustra adhibitis eupo-
„ ristis quibusdam remediis me tandem
„ ad se accersit. Svadeo cucurbitularum
„ in dorso applicationem cum scarifica-
„ tione etiam auricularum, applicatur
„ cum stupa utrique oculo alumen cra-
„ dum cum albumine ovi agitatum, in-
„ que unguenti formam redactum, . . .
„ et lac muliebri tepidum subinde instil-
„ latur, quin et Væ S^b in brachio cele-
„ bratur. Et hæc omnia remedia, quam-
„ vis non sine euphoria adhibita sint,
„ tamen 3^o statim a Væ Se die, nobis
„ nil tale metuentibus, exorta in sinistro
„ oculo pustula visum ante triduum de-
„ mum adhuc saluum penitus obfuscavit.
„ Actum esse de oculo adstantes uno ore
„ clamabant; sed ego . . . actutum
„ pilulas purgantes exhibeo, . . . et
„ collyriam aquam præstantissimam in-
„ stillari jussi; imo altero mox die . . .
„ Ophthalmicum dextrimum . . . in
„ consilium convoco: is pulvisculum o-

„ culo inspergit, fecitque, quod suarum
„ erat partium, egregie. Quarto post
„ die setaceum in nucha posuimus; quod
„ adeo bene successit, ut mox pustula
„ non nihil discussa oculus in dies pro-
„ pius ad pristinum statum redire, ac
„ visio tandem perbelle restituta visa fu-
„ erit, relicta solum super oculo exigua
„ nubeculae quasi cujusdam portione „.
In hoc itaque ægro fonticulus a 9^o æta-
tis anno gestatus ophthalmiam præpedire
nequivit, quam setaceum, frustra aliis
quoque tentatis, brevi profligavit. Non
minus insignis hanc in rem est casus
J. A. REIMANNI (k): „ juvenis nobi-
„ lis 23 annorum, sanguineo-melanchol-
„ licus, . . . scabiem contraxit, cujus
„ tædio captus et citam liberationem ex-
„ petens, linimento sulphurato ex con-
„ filio muliercularum usus, liber ab ea
„ evasit; sed mox inflammationem oculi
„ sinistri insignem incurrit, quo hæredi-
„ tario quasi vitio fratres etiam pleros-
„ que affligere solebat. Hæc quamvis
„ primo tempore sæpius discussa fuerat;
„ progressu tamen temporis ita invaluit,
„ ut totaliter nunquam abigi potuerit,
„ et æger hinc plane libero aeri se ex-

(k) l. c. p. 122. sq.

„ ponere non auderet, nec lucem ali-
„ quam perferre posset; palpebræ somni
„ tempore præter hæc adeo conglutina-
„ bantur, ut evigilans absque externa
„ ope diducere palpebras non potuerit.
„ Usus est hinc consilio celebris . . .
„ medici, qui præmissis methodice uni-
„ versalibus, Væ Se, scarificatione repe-
„ tita, multisque internis, et topicis ex-
„ quisitis remediis malum tollere frustra
„ conabatur: donec setaceo in nucha
„ exstructo in tantum ægrum restitu-
„ erit, ut jam in aperto aere quoque,
„ sed tranquillo, iter facere posset.
„ Cum vero setaceum partim molestum
„ esset, partim non ploraret humidita-
„ tem ita, sicut ab initio, excitato fon-
„ ticulo in brachio collaterali illud co-
„ alescere passus est. Durabant ita in-
„ duciæ per $\frac{1}{4}$ anni fere; posthac vero,
„ fluente licet fonticulo satis copiose,
„ pristini recruderunt labores cum con-
„ sumptione corporis hectica et sudori-
„ bus nocturnis. Hic multa rursus, quæ
„ ratio et experientia svadebant, . . .
„ adhibuimus; sed laterem lavimus: do-
„ nec reparato corporis habitu ex parte,
„ et hectica ablata, setaceum iterum po-
„ neremus, cum prius vesicatoriis in
„ temporibus et hirudinibus positis ne-
„ gotium absolvere frustra tentassemus;

„ etfi ex hirudinum usu ad aliquot dies
„ insigne emolumentum conspexerimus.
„ Cum sic per setaceum affluxum humio-
„ rum divertissemus, rediit, tardius li-
„ cet, tolerabilis sanitas, ut se etiam
„ libero aeri tuto jam exponat, nec
„ tam gravi malo recidivanti amplius ob-
„ noxius vivat. Inter topica . . . opti-
„ me se gessit linimentum ex bolo Ar-
„ mena, saccharo Saturni, et pingue-
„ dine viperina conflatum; quoties enim
„ palpebras inungeret, toties inflam-
„ mationis decrementum notabile ex-
„ pertus est, nec palpebrarum tanta fuit
„ conglutinatio „. Docet igitur hæc
historia, quam impari cum effectu fon-
ticulus setacei in locum fuerit suffectus
morbo non dum penitus profligato.
Vel maxime autem luculentus est casus
C. PEZOLDI (1), qui setacei præ fon-
ticulo virtutem commonstrat: „ juvenis
„ 19 annorum, cocturæ cerevisiæ va-
„ cans, plethoricus et carnosus, faciei
„ rubræ, a pueris defluxionibus oculorum
„ frequentibus laborans, et semel brevem
„ ophthalmiam passus, cum ante 7 septi-
„ manas eodem morbo corriperetur,
„ V. S. tunc, purgans, et velicatorium ad-

(1) Obs. med. chir. select. 80 p. 165. 179.

„ hibuic , ast inconstanti cum effectu;
„ siquidem paulo post iterum uterque
„ oculus ophthalmiam patiebatur cum
„ cephalalgia, effluxu lacrymarum et fu-
„ ga lucis. Quia igitur valde carnosus
„ esset, cum pulsu magno et pleno, die
„ 9^a Decemb. A. 1713 (quo anno et
„ sequente etiam ob pluvias creberrimas
„ et ventos multos ophthalmiæ epide-
„ micæ grassabantur) iterum Væ Sem in
„ pede . . . præcipiebam, readhibito
„ quoque vesicatorio, præter interne
„ datam 1^o MR^{am} ex ess. lignor. succ. l.
„ alb. 0° assafr. 2^o Sem cachect. cinnab.
„ WEDEL. c. 0° assafr. His adhibitis
„ die 13^a oculum unum jam aperire po-
„ terat, et cephalalgia carebat. Pilulis
„ cephalicis hodie corpus lustrabam; in-
„ stillatum deinceps collyrium ex ∇^a
„ rosar. chelidon. maj. sacch. Saturn. et
„ tutia. Die 16^a vesicatorium multum
„ ichoris proliciebat. Quia vero jam
„ sub introitu valetudinarij unus oculus
„ macula . . . laboraret, instillabatur
„ 1^o ∇^a rosar. c. vitr. cypr. quod
„ collyrium e vestigio aliud ex ∇^a ro-
„ sar. cum sacch. Saturni excipiebat. His
„ efficiebatur, ut illacrymantes oculi sic-
„ carentur, interim dum sequentibus die-
„ bus prius collyrium cum vitriolo cypr.
„ paratum nimis urere sentiret. Die

„ 20^a aliud ex ∇^a rosar. chelid maj.
 „ c. croco metallor. edulc. et sacch. \mathfrak{b}
 „ substituebam, non neglecto etiam usu
 „ MRæ ex essent. lignor. succ. castor. et
 „ \mathfrak{d}^e ex bezoard. \mathfrak{z} , cinnab. lap. 69 et succ.
 „ Quamvis igitur collyrii nuperrimi ap-
 „ plicatione (quo melius se juvatum,
 „ quam a prioribus sentiebat), et reli-
 „ quorum dictorum usu die 23^a dolor,
 „ rubor et lacryma cessarent (licet lu-
 „ cem non dum oculi ferrent), imo die
 „ 27^a utroque oculo optime cerneret;
 „ tamen ingruentibus die 29^a multis plu-
 „ viis aereque ventis turbato $\xi\epsilon\upsilon\mu\alpha\tau\iota\sigma\mu\omicron\varsigma$
 „ iterum in oculum sinistrum irruebat
 „ cum hemicrania simul ejusdem lateris.
 „ Proinde denuo vesicatorium prope
 „ aurem sinistram applicabatur, quo præ-
 „ ter adhibitam 1^o MRam ex essent. succ.
 „ lignor. l. alb. 2^o specif. cephal. 3^o col-
 „ lyrium ex ∇^a chelid. maj. rosar. c.
 „ croc. metall. edulc. sacch. \mathfrak{b} et gr. j
 „ camphoræ, obtinebatur, ut die 1^a Jan.
 „ ophthalmia iterum ferme penitus fu-
 „ garetur, quamvis oculo sinistro valde
 „ parum cerneret: cui proinde pingued.
 „ viperin. medicari conabar; a qua tamen
 „ oculo instillata is magis dolere inci-
 „ piebat, interim simul mox cum leva-
 „ mine capitis multum muci e' faucibus
 „ delabebatur: quem pituitæ defluxum

„ ut juvarem , ægrum mastich. cubeb.
„ et fœnic. masticare jubebam. Inde
„ (adhibitis præsertim etiam interne aliis
„ prædictis) sinister oculus ita emenda-
„ batur , ut eodem bene cerneret. Die
„ 8^a dextrum hætenus sanum oculum
„ ophthalmia iterum cum hemicrania
„ dextri lateris affligebat. Pertinaci
„ proinde affectui debellando pilulis
„ cephalicis denuo præmissis fonticulus
„ in brachio dextro exsculpebatur ; lym-
„ phæ quoque alterandæ decoctum li-
„ gnorum c. fœnic. ordinabatur , cui
„ ultimis diebus fol. senn. simul adjicie-
„ bam. Ast quod parum sic proficerem,
„ die 17^a Jan. ad setaceum . . . deve-
„ niebam , quo glutinosa materia instar
„ terebinthinæ proliciebatur , qualem
„ etiam fonticulus præbebat. Effectus
„ hinc erat quidem exoptatus ; interim
„ quod oculi nihilo minus adhuc subinde
„ laborarent , & dulcem prioribus §bus
„ adjeci, infusumque theiforme ex rad.
„ valerian. helen. pimpin. herb. nepeth.
„ hyssop. beton. trifol. fibr. sem. fœnic.
„ præter §em cachect. WEDEL. assafrat.
„ ad tempus propinavi , et die 14^a tertia
„ vice pilulis cephalicis corpus purga-
„ vi. His et setacei fonticulique con-
„ tinuato usu id obtinebatur, ut die 14^a
„ Febr. materia a setaceo et fonticulo

„ manans e glutinosa tenuior reddere-
„ tur, adeoque æger post iterata colly-
„ ria, V^x Sem que, et purgans porro
„ repetitum (ne roborantium aliorum
„ denuo mentionem faciam) die 8^a Mar-
„ tii oculis sanis redditis valetudinario
„ quidem valedicere posset, non tamen
„ (quod metuebat) opificio suo valedi-
„ cere cogeretur. Sub abitum sedulo
„ svasi usum solennem scarificationum et
„ V. S. ante æquinoctia, purgantia iti-
„ dem circa eadem, et frequentia pe-
„ diluvia „.

d) *Setaceo sanato fonticulus sub-*
stituatur post morbum sanatum, ne for-
te revertatur; quod prudenti consilio
cavit J. G. GULBRAND (*m*), cujus
„ centurio 36 annorum arthritide cum
„ exostosis in dorso manus sinistrae
„ per 3 lustra laboravit post suppressam
„ gonorrhœam malignam; adhibitis mul-
„ tis postea remediis restabant tamen
„ dolores vehementes artuum, ischio-
„ rum præsertim et genuum, ut diffi-
„ culter ambularet. Adhibuit æger sub
„ cura nostra succos expressos herbarum
„ recentium antiscorbuticarum, serum-
„ que lactis, interpositis laxantibus tem-

„ pore vernali, postea pilulas HOFF-
„ MANN. majores, decocta lignorum,
„ adque exostoses unguentum ꝯ le cam-
„ phoratum omni vespera, et balnea va-
„ porosa tria quavis hebdomade. Sen-
„ sim sic evanuerunt dolores et exostoses,
„ bene ambulavit æger; sæpissime vero
„ vertigini caducæ subiciebatur. Reme-
„ dia præscripta ultra 2 menses conti-
„ nuata seponere jussi. Detractis 10 un-
„ ciis sanguinis haud coagulati decoctum
„ corticis Peruv. acido vitrioli nuptum
„ omni trihorio sumpsit, quo adhibito
„ post 14 dies sanum se prædicabat, ex-
„ cepta levi intercurrente vertigine.
„ Circa insequens brumale tempus sub
„ libero aere capite nudato corpore
„ æstuante negotia perficiens levi oculi
„ dextri inflammatione corripiebatur;
„ flocci hoc faciens aeri quotidie se ex-
„ posuit: inflammatio per quatrimum
„ ita increvit cum adeo intolerabili do-
„ lore oculi et capitis ejusdem lateris,
„ ut vix mentis compos esset. In auxi-
„ lium vocatus Væ Ses, pediluvia for-
„ tiora cum sinapi Anglicana et aceto
„ vini parata, laxantia, emetica, tem-
„ perantia antiphlogistica, hirudines cir-
„ ca oculum et tempora, vesicatoria po-
„ ne aures, in nucha et brachiis appli-
„ canda ordinavi; at omnia in cassum:
„ „ oculus

„ oculus intense adeo rubuit, ut cornea
 „ tota speciem carnis ruberrimæ tulerit :
 „ intra pupillam fluctuavit quasi pus al-
 „ bum tenue ; visus omnino abolitus
 „ erat, et de oculo fere conclamatum
 „ esse credidi, dum setaceum nuchæ ap-
 „ plicandum, et electuarium mundificans
 „ quater in die sumendum jussi. Suppu-
 „ rato per 3 hebdomadas setaceo dolores
 „ capitis et oculi decreſcebant, pus in-
 „ tra pupillam ruborque oculi dispare-
 „ bant, et visus pedetentim restitueba-
 „ tur. Antequam setaceum ſublatus
 „ fuit, fonticulus ad brachium ejusdem
 „ lateris applicatus fuit. Sanitati per
 „ hæc remedia redditus perfecte centu-
 „ rio jam ultra annum a doloribus oculi
 „ atque vertigine imminis, viſumque
 „ fonticulo bene ſuppurante lætatur in-
 „ tegrum „,

e) *Ulceræ hæc diutiſſime aperta ſunt* ;
 ne coalitis iis morbus repullulet : quod
 toties obſervatum fuit, velut paulo poſt
 (n) viſuri ſumus. Quod enim in LEN-
 TILII (o) femina impune ambo fonticu-
 li coiverint, in cauſa forte fuit, quod
 vel diſpoſitio ad morbum poſt plures de-

(n) Vide ſeqv. f).

(o) Vide præced. b).

mum annos defierit, vel catameniorum
 fluxus in pubertate obortus morbi rever-
 sionem prohibuerit; quod posterius quan-
 tum ad recidivas inhibendas valeat, do-
 cet observatio J. D. RÜCKERI (p);
 „ virgini probæ educationis a prima ju-
 „ ventute ophthalmiæ obnoxia integer-
 „ rimi parentes domestica varia externa,
 „ his vero in cassum adhibitis mitiora
 „ nunc, mox fortiora et generosiora re-
 „ media interna ad debellandum malum
 „ multa sollicitudine dederunt; verum
 „ ruborem bulbi oculorum auctum potius
 „ quam diminutum in dies conspexere.
 „ Hinc omnibus nihil omnino conducen-
 „ tibus optimi parentes fonticulum in
 „ brachio sinistro ea cum felicitate inuri
 „ iusserunt, ut ex ulcusculo hocce pus
 „ probe coctum et copiosum posthac
 „ emanaverit, ac ophthalmiâ plurium
 „ annorum plenarie ferme sublata fuerit,
 „ licet fila ducendo, acu pingendo, alia-
 „ que peragendo malum quandoque, mi-
 „ tius licet, recruderit. Ad puberta-
 „ tis annos provecta virgo menstruorum
 „ fluxum ad 26 annum usque, quem agit,
 „ nunquam experiebatur; nausea vero

(p) Commere. Nor. T. 4. A. 1734 hebd. 25
 No 4. p. 198.

„ ulcusculi ducta fonticulum ante se-
 „ mestre spatium coalescere passa est.
 „ Hoc peracto anxietas quædam præcor-
 „ dialis et phlogoses in facie per aliquot
 „ dies subsequiebantur, quæ sub diligen-
 „ ti pediluviorum et nitroforum usu ca-
 „ tamenia exoptato eventu excipiebant,
 „ et huc usque legitimo tempore rite
 „ fluunt, virginemque incolumem ser-
 „ vant „. Ceteroquin autem F. HOFF-
 MANNUS (q) „ nos certe (ait) sæ-
 „ pius observavimus post morbillos vel
 „ variolas in pueris oculorum acres de-
 „ fluxiones, quæ non nisi appposito in
 „ nucha setaceo cessarunt, sublato au-
 „ tem postea setaceo protinus de novo
 „ oculos infestarunt „.

f) *Eadem sanata morbo repullulante renovanda.* C. T. BIERLINGII (r) se-
 mina 55 annorum quotannis præ primis
 hyeme, idque per multos annos, gravis-
 sima et dolorifica ophthalmia, ad trime-
 stre spatium recurrente, tentata omnibus
 cum therapeuticis tum prophylacticis
 frustra adhibitis, solis recusat fonticu-

(q) Diff. de vesicant. et fonticul. circumspecto
 in medicina usu §. 45. (Opp. T. 6. p.
 m. 76.)

(r) l. c. Obs. 20. p. 255.

lis, cum gravior semper morbus rediret, cœcitatem minitans, demum ab admissio in brachio lævo fonticulo egregie levata, et altero quoque in dextro brachio factio prorsus curata, plures inde annos ^{ab} hoc morbo immunis fuit. Sanatis autem iisdem rediit morbus, nec cessit, donec apertis iterum fonticulis ad summum usque senium ab eodem libera mansit. Perinde apud A. PARÆUM (s) quidam vir cum ex oculorum inflammatione visum prope amisisset, frustra omnibus tentatis, nuchæ indito setone sensum convaluit; quo vero post annum educto, ulcereque coeunte, morbus cum cœcitatibus periculo reversus ad renovatum setaceum rursus disparuit. Haud secius octennis J. A. REIMANNI (t) „ puer . . . „ adhuc gestat setaceum, cum post variolas . . . superatas inflammationes „ oculorum singulo plenilunio recidivantes cum narium obstructione continua, „ fœtore, et tumore, metuque sic ozæ- „ næ experiretur, simulque diuturnitate „ mali suffusionis initia in oculis monstraret, hic hoc ipso remedio in tantum convaluit, ut nil nisi nubecula te-

(s) Opp. L. 9. C. 24.

(t) l. c. p. 121. sq.

„ nuis visum tamen non impediens su-
„ perfit in cornea, nec recidivæ am-
„ plius obnoxius fit. Contigit autem
„ quodam tempore, quod setaceum pro
„ more suo serum excrementitium non
„ ploraret; unde statim gravius quoad
„ nares et oculos habebat: iussimus ergo
„ zonam inungere unguento digestivo,
„ quod cum Æ^e cantharidum roboravi-
„ mus cum præsentaneo effectu; prorita-
„ to namque pristino effluxu sanitas etiam
„ redire cœpit posthac constans „. In-
terdum occlusis ejusmodi ulceribus pro
ophthalmia aliud aliquod oculorum ma-
lum consequitur, quod illustri exemplo
ostendit J. H. SCHULZE (u): „ adole-
„ scens temperamenti sanguineo-melan-
„ cholici variis defluxionibus pituitosis a
„ pueritia inde obnoxius ita tandem illis
„ male affligebatur ad oculos pertinacius
„ corrivatis, ut Pater celebris medicus
„ vereretur, ne omnino jucundissimum
„ videndi sensum corrumperent, aut pe-
„ nitus auferrent. Cum varia tentasset,
„ neque ab ullo auxilio vel præsidio so-
„ lidum fructum reportasset, confugie-

(u) Diff. de fonticulis caute occludendis ca-
sus 4to Hale 1741. Resp. E. G. BURG-
HARDTO.

bat tandem ad fonticulum in brachio
excitandum. Non longo interjecto
tempore luculentum hujus auxilii fru-
ctum cum gaudio intuebatur. Nam
ita omnis ab oculo ad fonticulum deri-
vabatur pituita, ut omnino nihil, de
quo quereretur aut metuëret, superes-
set. Adveniebat inter hæc tempus,
quo filium ad ingenii culturam susci-
piendam domo sua Pater dimittendum
judicabat. Serio autem obtestabatur
abiturum, ne unquam immemor esset
fonticuli probe mundandi, et ut sæpe
præceperat, procurandi. Sed ut so-
let illa ætas sæpe alia probare, quam
quæ parentibus visâ sunt, ita noster
cum prima nocte hospitium subiisset,
se a custode remotum vel ideo lata-
batur, quod impune sibi liceret glo-
bulum in ulcere artificiali gerendum
abjicere, et sordidi incilis exsiccatio-
nem proximam exspectare. Ab eo
tempore in 4^{um} annum non quidem
omnino immunis a pituitæ ad oculos
defluxione mansit, neque plane care-
bat aliis, quæ ipsum jubebant de con-
servanda oculorum acie serio cogita-
re. Consulebat subinde medicum, in
cujus ædibus habitabat, qui pilulis
quibusdam cephalicis et §io dolci
exhibito metum omnem semel iterum-

„ que avertebat. Cum autem aliquando
„ accideret, ut cum sodalibus genio
„ per complures dies liberalius indulge-
„ ret, et se vino largius perfunderet,
„ autumno jam tunc ingresso, forte
„ etiam alia in rectam diætam peccata
„ non satis vitaret; mane cum exper-
„ gefactus esset, et noctem jam præteri-
„ ille satis intelligeret, maximo suo ter-
„ rore et incredibili tristitia nimium
„ sentiebat, quam prave sibi consuluis-
„ set, qui optimi Parentis et tam artis
„ consulti quam suæ salutis cupidi præ-
„ ceptum neglexerat. Advocandum illi-
„ co curabat hospitem, cui cum mul-
„ tis lacrymis, quid admisisset, quid-
„ que pateretur, exponebat, et auxili-
„ um anxie requirebat. Primam tunc
„ mentionem injiciebat fonticuli diu ge-
„ stati, et fructus ab illo percepti. In-
„ spiciebat is oculum utrumque: vide-
„ bat per corneam tunicam satis pellu-
„ cidam transparere aliquam quasi telam
„ subtilissimam, coloris ejus æmulam,
„ quem spicæ prope maturitatem adeptæ
„ monstrant, pallide viridescentem. Cum
„ judicaret id crystallinæ lentis vitium
„ esse, cujus tenuissimos utriculos te-
„ nax aliquis et coagulum inducens hu-
„ mor subiisset, audissetque de fonticu-
„ lo, quæ æger antea sollicitè celaverat,

„ nulla interjecta mora fonticulum pri-
„ stino loco reparandum curabat. Tam
„ autem felix erat auxilii hujus succes-
„ sus, ut cum ichores suos quotidie ex-
„ spuere more pristino cœpisset, pauci
„ omnino dies intercederent ad optatam
„ usque et perfectam pupillæ claritatem,
„ et oculi utriusque optabilem in viden-
„ di officio integritatem „.

4. *Contraindicatorum* denique ulcerum horum excitationem subinde indicia manifesta, subinde vero occulta quædam idiosyncrasia corporis ulcera ejusmodi non ferens, aliæve causæ iis non abolendæ et in solidis magis quam fluidis querendæ; quod sæpe non nisi a posteriori ediscimus. „ Sacra anchora in inflam-
„ mationibus oculorum est setaceum, in-
„ quiunt Vratislavienses (x); non tamen
„ vanus est PLEMPIUS scribens quod
„ in siccioribus magnoperè læsionem ad-
„ augeat „. Et vero corporibus macris, exsuccis, atrophicis, laxis item debilibusque vasis existentibus, præsertim cum aliqua cachexia conjunctis, raro unquam ulcera hæc proficua fuisse sunt observata, ut documento sunt pueri, quorum FORDYCE (y) et

(x) Histor. morbor. Vratisl. p. m. 63.

(y) Vide §. 48. No 3.

RIEDLINUS (z) et LEROY (a) meminerunt; quibus etiam accensenda est REIMANNI (b), „ femina 26 annorum, densioris corporis habitus, quæ licet menstruum fluxum debitum experiretur, in „ sterili tamen conjugio hætenus vixit. „ Erat hæc a multis annis cephalææ obnoxia, et leviori oculorum inflammationi, cum aciem eorum intendere „ valde debuerit in juvando suo marito, „ qui aurifaber fuerat. Facto vero æstusosa admodum tempestate itinere quodam, cum radiis solaribus toto die expositum caput haberet, gravem incurrit ophthalmiam; qua discussa ex parte animadvertit in dextri oculi pupilla foveolam obscuram visum impedi- „ dientem; simulque observat oculum „ hunc altero contractiorem, nec se „ palpebras in oculo affecto debite deducere posse, sicut fit in sano. Initium suffusionis adesse rata ex consilio „ chirurgi formicarum acrem liquorem „ instillavit; sed post magnos exinde „ natos ardores ob acrimoniam malum „ deterius esse potius animadvertens,

(z) Vide §. 63.

(a) Vide §. 63. No 2.

(b) l. c. p. 123. sq.

„ intermisit usum. Ruborem et ardorem
 „ fere constantem posthac oculi solaba-
 „ batur cum flore lactis et viridis æris
 „ portione in linimentum redactō, quo
 „ palpebras inungebat. Oculus semper
 „ hīnc ficcus fuerat, nec ulla unquam
 „ serofitas observari poterat; imo si flens
 „ humectaret eundem, melius sibi esse
 „ laudabat. Consilium nostrum expetens,
 „ . . . quamvis malum fore incurabile
 „ suspicaremur, quod foveolam illam
 „ vel ex resiccatione crySTALLINI (refere-
 „ bat enim circulum), vel corneæ ali-
 „ qua lamellarumque hujus ruptura pro-
 „ ductam judicaremus; tamen experiri
 „ volumus, utrum aliquam alleviatio-
 „ nem conferre ægræ liceret. Fonticu-
 „ lum, quem in brachio sibi jam ante ex-
 „ citaverat, ficcum esse continuo fateba-
 „ tur; et cum topicis nullum levamen
 „ procuraretur, a pinguedine viperina
 „ in pejus haberet, experiri voluit se-
 „ tacei efficaciam; sed sine ullo effectu:
 „ quamvis enim aliquantum flueret hæc
 „ materia serosa plus quam ex fonticu-
 „ lo; tamen ardorem et ruborem ocu-
 „ li . . . tollere non licuit. Ita quo-
 „ que viro quadragenario majori ex V
 „ abusu ophthalmia seu rubore oculorum
 „ continuo et trachomate affecto recor-
 „ damur . . . frustra adhibitum fuisse

„setaceum „. Scorbüticis vero maxime omnium id genus ulcera obfunt. Ita S. ALISCHERI (c) puellæ novenni admodum ſcorbüticæ , et ſceleti inſtar emaciata, ambosque oculos rubros habenti fonticulus in brachio excitatus vix 8 hebdomades aderat, cum non modo oculos non emendaret, ſed fungoſæ quoque carnis proventum in ulcere cauſarit, ac dolentiſſimum toti brachio eryſipelas acciverit. Pulchre etiam hætenus dicta confirmat obſervatio S. A. D. TISSOTI (d) de matrona 60 annorum, obefa, ſævam plurium annorum lippitudinem experta, quam depulſuri medentes ubi lævo in brachio fonticulum excitaffent, ocyus ſævi circum dolores, inflammationes, lichenes, herpetesque orti, totum cito ſcædantes corpus hætenus omnis cutanei morbi experts. Lippitudo etiam gravior abhinc facta, amiſſo pene viſu, ob cataractam utroque in oculo natam. Claſſo primo cauterio muſculoſæ nimis parti ap- poſito, ſectoque alio (ita volente ægra), adhibitis brachio Saturninis, datisque le-

(c) Annal. Vratiſl. Tent. 23. A. 1723. Febr. Cl. 4. art. 13. §. I. p. 214.

(d) Epiftola ad A. HALLERUM de variolis, apopl. et hydrope p. m. 128. ſq.

nibus catharticis e Ʒo dulci et sulphure aurato, sanata cutis, cataracta utraque superstite solo ferro tollenda.

§. 66.

PERISCYPHISMUS autem, quem ita P. AEGINETA (e) compellat (id est cutis cranii eum ad modum incisio, ut detonso ad cutem usque capite, vasisque temporum vitatis, transversa instituitur sectio a sinistro tempore ad dextrum usque, paulo supra frontem; osse autem nudato pluribus diducatur linamentis; ac post solutionem, declinante jam inflammatione, os radatur, donec producere carnem incipiat, et ductu concarnationis pulvillis incarnantibus curetur), et alii secandi urendique ab HIPPOCRATE (f) traditi modi, etsi R. A. VOGEL (g) iis hodie quoque locum esse dandum censet, partim ob crudeliorem operationis

(e) De re medica L. 6. C. 7.

(f) De locis in homine pag. FOES. 413. sq. & de videndi acie p. 688. sq.

(g) Diss. de prerogativa Væ Sis in partib. laborantib. §. 19. 4. Gott. 1756. Resp. L. F. B. LENTIN (in Opusc. Med. select. No 3. p. 106. sq.).

naturam, partim vero, quod methodus ophthalmiis gravissimis etiam medendi usque adeo hodie sit præclara, ut vulnorum horum necessitatem prorsus submo-
verit, præsertim suffectis eorum in lo-
cum fenticulis ac setaceis, nusquam am-
plius exercentur.

C A P U T VII.

INOCULATIO MIASMATUM RE- TROGRESSORUM.

§. 67.

Inter procatarcticas ophthalmiæ causas vidimus (*b*) a varia materiæ morbosæ ad oculos metastasi ophthalmias generari cum graves sæpenumero tum plerumque ad omnia quæque præsidia rebelles, nec ante ab iis liberos evadere ægros, quam materia illa ad pristinas suas sedes revertatur. In primis vero id a scabie et gonorrhœa virulenta accidit. Eapropter omnem semper operam impendunt medici ad revocandam vel scabiem vel gonorrhœam. Quarum revocandarum cum

(*b*) Vide §. 22 No 4. 7.

plura suppetant artificia, nullum tamen horum præstabilius esse observatur, quam *inoculatio*; ut quæ et ocyus et facile administrari possit. Enim vero

I. GONORRHOÆÆ *virulentæ inoculatio* ita habet: „ immittitur, inquit M. „ LANGE (i), in urethram viro gonorrhœa virulentissima laboranti bacillus cereus, isque per aliquod tempus (differt tempus hoc, et prout materia gonorrhœica plus vel minus virulenta, plus vel minus temporis poscitur) in ea relinquitur, donec bacillus bene materia gonorrhœica inunctus fuerit. Nunc introtruditur confestim bacillus venereus iste in urethram hominis adstantis, morbo ex gonorrhœa suppressa laborantis, ibique per 3--6 horas asservatur, donec ardor et reliqua gonorrhœæ veræ symptomata apparuerint. Gonorrhœa præsens dein tractatur secundum artis principia, „ Hocce artificium A. 1764 MARIGUES (k) in curatione ophthalmiæ venereæ a gonorrhœa repressa ortæ pulchro cum successu adhibuit. Ii, qui crimina parvi pen-

(i) Diss. cit. §. 41. p. 76.

(k) ROUX l. c. T. 36 Aout 1771 p. 160. 199.

dunt, aliam inoculandæ gonorrhœæ viam præferunt. „ Mira nuper hic, inquit „ J. J. PLENCK (1), loci (Budæ) con- „ tigit historia hujus morbi: lanio ex „ gente Rasciana gonorrhœa laborans ali- „ quot uncias olei terebinthinæ hausit, „ ut sibi gonorrhœam curaret. Sup- „ pressa gonorrhœa subito vehementis- „ sima ophthalmia gonorrhœica utriusque „ oculi afficitur. Chirurgus, qui me hac „ de re consuluit, ægroto gonorrhœam „ ope candelulæ infectæ inoculare tenta- „ vit; at ægrotus id non admisit, dicens „ se leniori via sibi revocaturum esse „ gonorrhœam. Adiiit ideo eandem, a „ qua gonorrhœam obtinuit, meretri- „ cem, ac altero jam die profusissima „ gonorrhœa laborabat: oculi inflamma- „ tio remisit; et solo interno usu § ii „ gummosi intra 6 hebdomadas ab utro- „ que vitio perfecte curabatur „. Ita scelera etiam non svadenda, ubi com- „ missa sunt, scientiæ humanæ proferendæ inserviunt. Quod si vero ejusmodi aut loco sit æger aut animo, ut inoculatio hæc institui nequeat, SCHMUCKERI methodus antiphlogistica virus ex oculis ad genitalia derivans est adhibenda; demendus nempe pro morbi magnitudine

(1) Doctr. de morbis venereis p. 83 nota (*).

sanguis, alvus rheo cum nitro ducenda, pudendis fatus emollientes late admo-
vendi, &c. ut SCHMUCKER suo in
ægro (*m*) diligenter perfecit. Imo secu-
ritatis ergo hæc ipsa methodus etiam ubi
inoculatio fit, haud est negligenda; ut
quæ istam celerius reddat efficacem:
Porro.

2. SCABIEI *inoculatio* peragitur vel
crebra scabiosorum contrectatione vel no-
cturno accubitu eodem in lecto, vel ge-
statione indusiorum, manicarum, tibia-
liumve a scabiosis gestatorum, sanieque
adhuc scabiola sordidatorum. Illustre
prorsus hujus rei exemplum literis pro-
didit J. G. HALLMANN (*n*): fabri li-
gnarii filia 12 annorum post malignas va-
riolas confluentes ante biennium male
tractatas contraxit plus quam biennalem
utriusque oculi inflammationem ad pluri-
ma remedia (scilicet Væ Ses, scarificatio-
nes, hirudines, cathartica, & lia cum
purificantibus, vesicantia, idoneaque oph-
thalmica) contumacem cum floccorum
oculis oberrantium illusione, ac palpe-
bræ tumore, duritie, pruritu et ulcera-
tione,

(*m*) Vide histor. 16.

(*n*) Act. Svec. Vol. 38. trimestr. 3. No 3.
p. m. 212. 6qq.

tione, purisque inde lenti et acris pro-
ventu, ac insigni rubore erysipelatolle
se se late circa inferiorem palpebram ex-
tendente. Puella cutem flavam ac ten-
sam habebat, debilis et macra; nihil ta-
men ceteroquin querebatur: vige-
bant appetentia somnusque, nisi dum remit-
tentis indolis morbus per punctorios do-
lores geminatumque palpebrarum pruri-
tum gravissime exacerbabatur. Toto au-
tem infantiae tempore passa est puella in-
signem pedum scabiem cum magnis po-
plitum ulceribus; quam cum ingruentes
variolae in totum abolevisent, vero erat
simile, miasma variolosum se se cum sca-
biofa materia univisse, atque deinceps
metastasin illius ad oculos accidisse. Id-
circo post sepositam aliquamdiu medica-
tionem, viresque analepticiis resectas,
siccamque cutim prius balneis tepidis hu-
meclatam et emollitam, vespere quodam
egressa e balneo agra iussa est perfrictos
prius probe calideque pedes induere la-
neis tibialibus a scabioso puero dies ali-
quot gestatis, multa adhuc sanie crustis-
que inhærentibus, eaque tribus continuis
gestare nycthemeris. Enata inde cepha-
lalgia, dolores artuum, vehemens febris,
ac tensiones pectoris cum sicca tussi,
prorsus ad modum exanthematicarum fe-
brium. Interea sedulo hauriebat infusum

tenue flor. sambuci, atque aliquot guttas MRæ simplicis assumpsit. Ob simultaneam etiam vomituritionem datus ☐ emeticus e decocto hordei celeriter operatus est. Lapsis 24 horis æstus, cephalalgia, tussis, puncturæ thoracis minuebantur, ac pro ratione incrementis sensim perspirationis etiam rubor erysipelatodes utroque in pede diffusus comparuit, qui postridie se se dividens in rotundas moleculas velut genuinam scabiem contrahabatur. Hac vero increbescente, vixque octiduum durante oculis albedo visusque acies redibat; palpebrarum tumor durities callositas minuebatur, pusque tenuius parcius ac minus acre inde prodibat. Scabiei ergo eruptio promovebatur tepidis balneis, potu infusi ligni Guajaci, et usu ♂is e flor. sulph. cum camphora; oculis vero nil adhibitum præter crebriorem humectationem ope aquæ frigidæ guttis aliquot aceti Saturnini et ♀ Gallici alteratæ. Post 6 hebdomades nil nisi aliquis palpebrarum facile collabentium languor superfuit, et ægra ob perdita pleraque cilia intensiorem lucem diurnam non satis ferebat. Ubi demum scabiei eruptio ulterior substitit, imo in dies minuebatur, ne forte irradicetur, ab usu pulveris et decocti cessatum est, horumque in locum data sæpius cathar-

rica cum ꝑ^{io} dulci, ac partes affectæ juxta focum ∇^a GOULARDI calida lavabantur. Ab his scabies omnis resiccata demum evanuit, palpebris natus tonus rediit, vires increvere, et anno insequente puella aquas foterias bibit.

CAPUT VIII.

O P H T H A L M I C A.

§. 68.

OPHTHALMICA denique *remedia*, quæ oculis forma fatus, litus, collyrii, &c. applicantur, expendenda supersunt. Etenim H. BOERHAAVIUS (o) „ ex-
 „ terne . . . ad locum affectum (ait)
 „ applicanda sunt topica, ut malum ibi
 „ hærens corrigatur. Plurima hic præ-
 „ scribuntur medicamenta; sed paucissi-
 „ ma sunt, quæ spei satisfaciunt, et præ-
 „ terea maxima prudentia in eorum usu
 „ opus est,, Ne autem ex immensa eorum, quæ hic sine discrimine ab empiricis commendata sunt, farragine in delectu peccetur, memoria tenendum est, eadem oculis inflammatis adhibenda esse reme-

(o) l. c. §. 60 p. 52.

dia externa, quæ aliis quibusvis partibus ex inflammatione laborantibus applicari debent: proinde pro variante inflammationis ac symptomatum vigore graduque varia ut ubique alibi, sic oculis quoque adhibenda sunt topica; hac tamen isthic observata cautela, ut cum alibi locorum ob minorem plerumque partium sensibilitatem sæpe acriora paulo ejusmodi topica esse possint, oculis perquam provide similia admoveantur, secus aucto inde facile dolore inflammatio quoque augebitur. „ Reperit enim BOERHAAVI-
„ US (p) omne medicamentum dolorem
„ excitans in oculo inflammato pessimum
„ esse; dolorem enim facientia suppu-
„ rationis causam augent „: quæ eveniens plerumque oculum pessumdat; et
„ ausim dicere, inquit F. HOFFMAN-
„ NUS (q), plures visu privari ex im-
„ peritia applicandi topica, quam ex
„ ipsa morbi vi ac magnitudine „. Cujusmodi exempla passim in hocce libello videre est. Ne itaque id eveniat, ad præsentem inflammationis statum diligen-

(p) Ibidem p. 53.

(q) Diff. de errorib. vulgarib. circa usum scopior. in praxi §. 7. (Opp. T. 6. p. m. 323).

ter est respiciendum, qui rite perspectus, quid et quando admoveere oculis oporteat, liquido præmonstrabit.

§. 69.

Varius igitur ophthalmiæ gradus *vel relaxantia* cum attenuantibus leniterque stimulantibus poscit, *vel reperiuentia* ex roborantibus, adstringentibus, siccantibusque (id quod in cujusque alius partis inflammatione perinde valet). Verum hac ipsa in re omnis curationis periculi cardo vertitur, ne ubi relaxantibus opus est, reperiuentia, ac vicissim, in usum vocentur; id enim ipsum est, quod toties oculos perdidit. Facile autem hos scopulos tiro vitaverit, modo ad sequentia advertat animum. Princeps nempe in ophthalmiæ curatione canon est, ut inflammatio resolvatur; nam cum in aliarum partium inflammationibus sæpenumero vel resolutio vel suppuratio iis sanitatem reddat, hic sola resolutio est salutaris, suppuratio vero plerumque exitiosa: quapropter in ophthalmia medendi methodus unicam resolutionem inflammationis pro scopo habeat, oportet. Cum autem hæc resolutio binis fieri possit modis, nimirum sanguinem serosis arteriis errore loci im-

paſſum vel in ſeroſas venas motu progreſſivo promovendo, vel in arterias rubras (unde advenerat) motu retrogrado repellendo, ut ex his deinceps in venas rubras feratur (tertius enim modus haud ſuppetit): evidens eſt, ſi priore illo modo reſolutio tentanda ſit, neceſſum eſſe, ut et fines arteriarum ſeroſarum, per quos ſanguis in ſeroſas venas iis continuas eſt promovendus, relaxentur, et ſanguinis globuli compoſiti majores in minores diſſiliant; ſin vero poſteriore modo reſolutio ſit facienda, perinde liquet, fines arteriarum ſeroſarum non tam laxandos eſſe, quam potius vaſorum horum contractilitatem ab apicibus verſus baſes augendam eſſe. Queis poſitis jam et illud ſit perſpicuum, ad primam reſolutionis methodum remediis opus eſſe relaxantibus, attenuantibus, leniſſimeque ſtimulantibus, ad alteram vero repercutientibus.

§. 70.

At quando una quando altera reſolutionis methodus locum habet? Recte ſane id impræſentiarum et opportune tironi quærere in mentem veniet; quippe hoc illud eſt, in quo omnis bona et ordinata ophthalmiæ medendi ratio

sita est. Prima itaque resolutionis methodus tunc semper est adhibenda, ubicunque illam ipsa etiam natura molitur, id est in omni graviore ophthalmia, præsertim cum manifesta et vehementi febre conjuncta; hac enim præsentē adest præternaturalis humorum impetus infarctum arteriarum serosarum oculi a tergo urgens, quo ipso conatur natura et fines harum arteriarum dilatare, et globulos rubros iis impactos per illarum fines dilatatos in continuas ipsis venas transprimere: hoc itaque suo in opere est omniratione adjuvanda per applicata remedia fines arteriarum serosarum relaxantia, sanguinem attenuantia, lenemque vasis stimulum, ut impactum sibi sanguinem facilius propellant, addentia. Quæ cum ita sint, quantum quæso mali non accerferetur, si præsentē hoc naturæ molimine altera illa resolutionis methodus naturæ conatibus e diametro opposita adhiberetur! Id ipsum utique est, quo ab empiricis toties oculis inflammatis exitium affertur. Altera vero resolutionis methodus tunc præsertim locum sibi vindicat, quando natura priorem non molitur, id est, dum levis adest inflammatio, seu hæc incipiens sit, seu vehementis prægressæ ophthalmiæ reliquæ, absente notabili dolore, conspicuo tumo-

re , ac manifesta febre inflammatoria. His ita breviter præmissis ad enumeranda in utramque hanc resolutionis methodum idonea remedia transeamus.

§. 71.

Ubi ergo primam resolutionis viam natura ipsa ingressa est, adjuvatur febre primum per vacuationes alvi ac sanguinis institutas, ubi opus est, ad moderamen redacta, ne impetus a tergo in arterias oculi infarctas sit nimius : quo facto applicanda infarctis oculorum vasis remedia tepida aut calida (nunquam frigida) emollientia aquosa, mucilaginosa cum mitissimis salibus incidentibus, solventibusque; lenissima insuper stimulantia, roborantia, et interdum subadstringentia, ita ut, quo inflammatio major est, eo horum posteriorum ad priora proportio sit minor; et prout inflammatio remittit, ita eorundem proportio ad priora prudenter sensim augeatur, imminutis e contrario prioribus, donec inflammatio ad eam fuerit redacta levitatem, ut ei altera resolutionis methodus per repercutientia tuto applicari possit. Initio proinde vehementis ophthalmiæ foci et collyria e remediis ante dictis optime conveniunt. „ Horum selectissima, in-

„quit BOERHAAVIUS (r), recense-
 „bo, experientia multiplici mihi com-
 „probata. Sumpsi nempe

Flor. althææ

—— malvæ

—— cyani

—— sambuci aa p. j.

Fol. althææ

—— malvæ aa M. j.

Capit. pap. alb. sine semin. ℥ij. coqv.
 cum

Aqua in catapl. sub finem adde

Farin. sem. lini q. f.

Aceti rosac. parum (v. g. ℥ij)

Olei rosar. ℥ij

Sacch. Saturni ℥j. M. F. cataplasma

„ omni quadrihorio renovandum, et la-
 „ xe applicandum toti orbitæ, quod
 „ summas inflammationes curavit. Ace-
 „ tum rosaceum (licet contradicat opi-
 „ nioni vulgari) parva copia addimus;
 „ quia in omni inflammatione nihil plus
 „ resolvit, quam acetum parva copia re-
 „ solventibus emollientibus additum,
 „ quod Veterum summum fuit medica-
 „ mentum; . . . sed non nimis magna
 „ dosi addi oportet, alias acrimonia sua
 „ lædit, et vasa rodit. Hoc solum suffi-

(r) l. c. p. 54.

„ cit, ne sequatur suppuratio; et laxi-
 „ tas etiam internis vasis restitui potest
 „ applicatis tantum externis medicamen-
 „ tis: licet enim oculus clausus sit, ta-
 „ men juvant; cum si externe omnia la-
 „ xa sunt, etiam interno malo spatium
 „ procuretur, ut facile fluere queat.
 „ Sequuntur nunc collyria (s) sive medi-
 „ camenta, quæ oculo instillata quatenus
 „ possunt vasa attingere, materiam egre-
 „ gie resolvunt. Sunt autem omnia,
 „ quæ tepida vascula laxantia, impacta
 „ leniter diluentia, vel suavissimo sale
 „ dissolventia applicari possunt. Varia
 „ hujusmodi proponuntur; formula, quæ
 „ sequitur, probatissima est:

R. Sem. cydonior. gr. vj

Opium purissimi gr. jv

Sacch. Saturn. gr. ij vel iij. cum f. q.

∇^æ destill. rosar. in mortario non
 cupreo sed vitreo vel alaba-
 bastrino F. emulsio, cujus
 ℥ ij vel iij adde

TR^æ croci cum √ rectif. factæ ℥ j.

„ Hujus collyrii gtt. j oculo subinde in-
 „ stilletur, et marginibus oculorum in-
 „ ungatur, post instillationem autem
 „ claudatur oculus. Hæc formula opti-

„ ma est, et sufficere potest; sæpe pro-
 „ fuit in statu inflammationis, et exper-
 „ ti laudabitis per eventum. Semen
 „ cydoniorum addimus, quia arcanum
 „ summum est apud multos in collyriis.
 „ Et ob eandem quoque rationem ad-
 „ jicimus opium, quod ob amaritiam
 „ mirifice dissolvit et aperit, . . . et
 „ etiam sopit „. J. L. SCHMUCKE-
 RUS (t) pulchros se effectus observasse
 testatur a cataplasmatibus e Θ^* , a-
 ceti vini acris et aquæ æquis partibus
 cum grossa farina fecales coctis, atque
 tepide inter duo lintea applicatis. His
 vero paradigmatum instar pro tirone præ-
 missis formulis nunc varia emollientia,
 attenuantia, stimulantia, reperiuntur,
 &c. quæ præ ceteris usu se se probave-
 runt, in medium adferam, simplicia pri-
 mum, dein varias ex iis formulas ab œn-
 comiis variorum claras.

§. 72.

I. *Simplicia* itaque commendatissima
 sunt

A. *Emollientia* pro vasis laxandis,
 dolore mitigando, acribus lacrymis ali-
 isque stimulis obtundendis, inviscan-
 dis, &c. præsertim vero

1. *Albumen ovi* oculo affecto calide instillatum. Apud G. H. VELSCHIUM (u) refert H. REUSNERUS matronæ cuiusdam ad ophthalmiam curandam usum frequentissimo probatum fuisse hoc euporiston: „ ovum recens a gallina editum imponatur aceto per triduum, et „ mollescet; tum acu compungatur, et „ effluet aqua, qua utere „. At nihil opus est diutina hac ovi maceratione; siquidem albumen sine hac etiam profit. Apud C. F. PAULLINI (x) „ vir 65 „ annorum diu laborarat oculorum inflammatione, quæ tandem ita crevit, ut „ nec suæ nec conjugis manus ad demulcendam illam sufficerent. Applicuit denique artis pharmaceuticæ studiosus solum ovi albumen oculis calidum abjecto vitello, et mitescere coepit dolor cum pruritu „. Perinde A. E. BÜCHNER (y) meminit infantis quadrimuli, cui proxime ignem stanti scintilla in oculum illapsa ocyus pustulam ibidem cum vehementi dolore et inflammatione creavit; at applicato albu-

(u) Syllog. obs. et cur. medic. obs. 41.

(x) Obs. med. phys. Cent. 4. obs. 11.

(y) Miscellan. phys. med. math. A. 1729
Decemb. cl. 2. art. 3. p. 754.

mine ovi cum lacte materno conquassato malum intra horam conquievit citra ullum deinceps observabile in visu vitium. Neque etiam pœnitendo successu albumen ovi oculis adolescentis apud VEGA (z) est adhibitum.

2. *Lac* tepidum oculis inditum vel fatus instar admotum. „ In ophthalmia „ . . . omnibus . . . collyriis lac mu- „ liebre , inquit V. RIEDLINUS (a) , „ quod nuper in puero quodam, qui et „ varia collyria et scarificationem et ve- „ ficatoria et tonsuram capitis frustra „ in usum duxerat, secunda jam vice „ vidi: huic enim cum mulier quædam „ paupercula vix per 6 vel 7 dies lac „ suum quotidie bis ex mamma oculis „ instillasset, omne malum cessavit, et „ oculi omnino pristino statui restituti „ sunt „. Apud J. C. TILLINGIUM (b) „ adolescens 15 annorum ex chemosi „ habebat maculam albam in cornea „ oculi sinistri transparente, vasaquæ san- „ guine turgentia tria ex eodem in an- „ gulo interno coeuntia. Cum varia

(z) Vide §. 40.

(a) Lin. med. ann. 1. Martii 4. p. 64.

(b) l. c. p. 66. sq.

„ medicamina diu frustra adhibita fuif-
„ ſent, conſilium tandem dedi, ut Caro-
„ linas adhiberet thermas, a quo ad
„ easdem perquam moleſto itinere, ex
„ ſolis ſcilicet ardentiffimo æſtu et ſabu-
„ lo minimo, quod aer movebat, gra-
„ vis oriebatur ophthalmia, qua palpe-
„ bræ in primis tumbant, ſerumque
„ acre et arenulæ adhuc inhærentes illos
„ offendebant. Fomentatio ex lacte ca-
„ lido ſola ſufficiebat, ut brevī hæc in-
„ flammatio ceſſaret „ &c. Perinde
P. FORESTI (c) „ Baccalaureus juris
„ . . . anno ætatis ſuæ 27° . . . cum
„ ex nimia vini potione in oculorum do-
„ lorem levem et rubedinem quamdam
„ cum exigua inflammatione incidiffet,
„ et una catarrhum et dolorem capitis,
„ non tamen gravem incurriſſet, ſequens
„ decoctum eidem præſcripſit:

℞. Cort. rad. cichor.

—— — fœnic. aa ʒſ

Fumariæ M. ij

Betonicæ M. j.

Acetoſæ

Salviæ

Euphragiæ aa M. ſ

Sem. aniſi ʒij

Sem. coriandr. ppt. ʒj

—— filer. mont. ʒʒ

Fol. fennæ ʒʒʒ

Uvar. pass. ab arill. repurg. p. j

Prunor. Damasc. N^o jx. F. decoct.
in ℥iij

▽æ commun. ad consumpt. me-
diet. stent per noctem su-
pra herbas infusa, mane
coletur cum forti expres-
sione, et arom. cum ʒj
cinnam. selecti, et sac-

„ charo dulcoretur. Bis in die ex eo
„ sumebat. Postea has pilulas sumpsit:

℞. Pil. lucis majoris

—— hieræ simpl. GAL. aa ʒʒ cum
Succo fœniculi F. pilulæ vij,

„ quibus circa medium noctis sumptis
„ quinquies alvum deposuit, et dolor ca-
„ pitis magna ex parte evanuit. Ad
„ oculi ruborem hoc collyrio utebatur:

℞. Aquæ fœniculi

—— rosar. aa ʒʒʒ

Lactis mulieris lactantis puellam
„ ʒʒ. M. Victuque attenuante utens
„ statim fuit curatus „

3. *Mucilagines*, ut cydoniorum se-
minum, de qua ante (d), et aliæ collyrii

(d) Vide §. 71.

forma adhibitæ sæpe ad miraculum profunt. „ Huc pertinet quoque formula „ egregia, inquit M. LANGE (e), cuius „ mentionem nuper fecit Cel. TRILLERUS, „ quamque optimi emolumentum „ inveniit Ill. QVARIN, quæ sequens est:

R. Gummi tragacanth. 3j

Mucilag. sem. cydon. 3jss

∇æ rosar. q. s. ut F. collyrium

„ mediocris consistentiæ, quod instilletur „ guttatim oculo, et externe etiam „ linteola eo madefacta applicentur „

Simili pene collyrio R. LENTILIUS (f) gravem facis ophthalmiam celeriter discussit, nempe „ puella 18 annorum „ tempore menstruo in aqua frigida per „ totum diem morata ophthalmiam insignem sibi contraxit. Oculorum bulbi „ tumentes, sanguine suffusi, horridi „ aspectu, de die quidem non dolentes, „ noctu autem acerbe. Ordinavi Væ „ Sem in dextro pede largam, hinc sequentes pilulas una vice deglutiendas;

R. Extr. panchym. CROLL.

M. P. de succin. CRAT. aa. gr. xij
Resin.

(e) Diss. cit. §. 37. p. 69 nota (a).

(f) Miscell. med. pract. Part. I. p. 143.

Resin. scammon.

—— gialapp. aa. gr. vj. F. pil.

„ No 30. Postea collyrium, quocum

„ mane et noctu oculi inungantur:

R. Mucilag. e-sem. psyi. et

———— ——— cydon. aa. cum

▽² fl. cyan. calcatr. et fœnic. extri.

ξjβ

Album. ov. No j. Conquassentur

„ invicem. Unde mox ophthalmia sub-

„ lata „.

4. *Malvæ flores*, quos jam in cata-
plasmate BOERHAAVII (g) vidimus.
Decoctum autem illorum J. JANIN (b)
fortuito quodam casu gravissimis in oph-
thalmiis cum hypopio jam conjunctis tam
efficax reperit, ut non modo ophthalmias
sustulerit, verum ipsum quoque hypo-
pion certius, quam omnia alia hætenus
cognita adversus illud remedia, discusse-
rit, præterquam quod summos leniat do-
lores, pupillæ erechismum emendet, at-
que illapsa in oculum heterogenea edu-
cat. Hunc autem in modum illud parat
Auctor (i):

(g) Vide §. præced.

(b) l. c. p. 356.

(i) Ibidem p. 394. No 14.

℞. Fl. Malvæ quantum 5 digitis capis, coq. in

℥ vitrop per 5 vel 6 minuta. Colaturæ trans linteum factæ adde

℥ camphorati gtt. vj.

Quotiescunque illo utendum est, recens semper paretur. sæpiusque per diem tepide forma balnei fatusque et collyrii ad plenam usque sanationem, sub usu ceterorum quoque remediorum, quæ res poscit, applicetur. E numerosis vero casibus tres tantum luculentiores JANINUS (k) enarrat, in quibus remedii virtus magnopere elucescit. Femina biliosa 27 annorum ophthalmia oculi dextri neglecta post prævium oculi capitisque dolorem punctorium hypopion invexit, oculoque demum visum ademit. Palpebræ præ tumore vix aperiri poterant; adnata turgebat admodum, anteriorque camera tantum puris continebat, ut nec iris nec pupilla cerni possent. Cum vero puris per incisionemeductio non dum tuta, morbumque auctura videretur, præscriptum interea decoctum malvæ pro balneo fatusque oculi ad mitigandos tantummodo dolores. Verum abhinc appa-

(k) Ibidem p. 357. sqq.

ruit, remedio isthoc non dolorem modo desisse, verum et inflammationem et hypopion ita evanescere cœpisse, ut 15^o inde die et iris et pupilla a pure liberæ fuerint, visusque ob id aliquatenus redierit. Ubi itaque ægra ab hoc remedio tantum proficere cœpit, ad accelerandam curationem 4^o quoque die datum catharticum

℞ Scammonei gr. xij

℥ ii dulc. gr. vj

Sacch. gr. xv. M. D. pro dosi.

Intermediis vero diebus quovis mane jejuno stomacho hauriebat feri lactis tenuissimi ℥xvj. Atque sic continuato 36 dies decocti malvæ usu oculus sanatus est, ne vestigio quidem tanti morbi superstite. Porro vir ad 47 annos habens consilium petiit pro oculo sinistro graviter inflammato cum hypopio insuper totam anticam cameram adeo obtinente, ut cornea inde prominentior, quam in altero oculo, crepaturamque minitans, nil nisi massam quamdam purulentam referret. Cum de oculo actum jam esse videretur, pro doloribus tantummodo mitigandis, ulteriorique morbi progressu præcavendo, eadem remedia, quæ feminae, sunt præscripta. At ecce! 12^o post die nullum hypopii vestigium superfuit, Verum iris flammeo rubore infecta in-

signem arguebat adesse inflammationem: pupilla quoque contracta erat et immota, pone quam albida nubecula, sedem in lente habere visa, conspiciebatur; quod quia metum injecit, ne anterior lentis pars cum uvea concretescens visum aboleat, ad præpediendam hanc concretionem, tollendumque iridis infarctum, ac motum ejusdem restituendum, seposito malvæ decocto jussus est æger oculum lacte vacino frequentissime balneare, potuique nil nisi tenuissimum serum lactis concessum. Atque horum remediorum in 65 dies usu æger pristinam oculi sanitatem visumque recuperavit. Denique puella trimestris utriusque oculi ophthalmiam passa est, morbusque nutrice frustra in dies lac ex uberibus in oculos exprimente continenter crevit, ut demum copiosa materiæ viridescentis puriformis, continuo ex interna palpebrarum parte per genas defluentis excretio supervenerit, atque in camerarum anticarum utriusque oculi fundo pus in forma maculæ subflavæ semilunaris apparuerit. Cornea intacta fuit, at adnatâ admodum erat inflammata. Malvæ itaque decoctum pro fotu et collyrio, imperatum intra paucos dies puriformem illam excretionem imminuit, sensimque plane cohibuit, et hypopion una cum ophthalmia felicissimo eventu prorsus evanuit.

5. *Axungiae* quoque ad acrimoniam demulcendam, vasorumque infarctorum fines laxandos, nec non opacitatem ab ophthalmia in cornea superstitem delendam, a multis hic fuere commendatæ, præsertim viperina. „ At vero, inquit „ F. HOFFMANNUS (l), intelligendum „ hoc ipsum est, si ex fuerint recens „ tes; quodcumque enim per vetustatem rancorem contrahunt, acrimonia „ sua . . . præsens damnum inferunt, „ Alioquin vero testimonio Vratislaviensium (m) „ pinguedine viperarum recens „ ti pruriens acrimonia, quæ haud raro „ hunc affectum comitatur, tollitur, „ ut D. GRASSIUS et alii experti persæpe sunt, „ Et apud V. RIEDLINUM (n) „ artifex quidam sancte affirmavit, „ patrem suum jam visu pene orbatum „ solius hujus pinguedinis usu eundem „ et restituisse et conservasse, „ Apud eundem sexagenarius a multis annis calorem deficere admodum sentiens, plurimumque catarrhis, oculorum præsertim, obnoxius, quos cum sæpius vehementer

(l) Diss. de errorib. vulgarib. circa usum topicor. in praxi §. 10. (Opp. T. 6. p. 324).

(m) Lin. med. ann. 3. Septemb. 9. p. 601.

(n) Ibidem 8 & 9. p. 599. 601.

invasissent, ultimum denuo finistrum oculum affligere, eoque non dum restituto dexter inde adeo est inflammatus, ut visum pene amiserit, quippe qui nec imaginem jam ullam redderet, maximumque splendorem vix perciperet. Plurimis frustra adhibitis tandem vesicans, at non præmisso cathartico, est admotum; verum quod eodem ipso die æger calidiori se se aeri ac pulverulento exposuisset, morbus ita increvit, ut medelæ ulterioris incapax esse videretur: donec axungia viperina adhibita egregie profuit. Hinc varii postmodo ophthalmiatri suis illam linimentis admiscuere. Et H. SLOAN (o) axungię porcine viperinam in linimento suo substituens tanto illud inde efficacius observavit evasisse, ut miracula sibi præstitisse visus sit. Viperinæ autem pinguedini M. RULANDUS (p) æquiparat, si non præfert, anserum pinguedinem recentem, duodecies lotam optime, ac tantisper cum aqua rosarum agitatum, quoad subtilissima candidissimaque nivis instar evadat; cujus gtt. j mane, meridie, et vesperi oculis immissa visum intra mensem ad

(o) l. c. p. 292.

(p) Thesaur. medic. tit. *ophthalmia* p. m. 83.

miraculum restituit. PHAEDRO Medicus CAESARIS hoc unico remedio cœcitatem sustulit, suffusiones, dolores, rubores, inflammationes, &c. Imponit autem isthic medicus gtt.j. ij. iij tepide ad oculos affectos mane, meridie, vespere, supino jacente per $\frac{1}{4}$ horæ ægro. Quædam RULANDI ægra „ instar ovi „ gallinacei tumidos habuit oculos cum „ insigni dolore; hac pinguedine adhibi- „ ta cessarunt omnia „.

6. *Gossypium*ne huc etiam referendum? Apud L. RIVERIUM (q) „ in- „ fans recens natus oculorum rubore affi- „ ciebatur cum multis sordibus puris „ instar inde effluentibus. Per 3 men- „ ses affectus continuavit, et multa col- „ lyria admota nihil contulerunt. Tan- „ dem ex præscripto cujusdam medici „ gossypium singulis noctibus admotum „ est utrique oculo, quod prius ad pru- „ nas diligenter exsiccabatur, digitis „ prius discerptum, et bene carmina- „ tum. Postmodum uterque oculus con- „ tegebatur pauca cotonis quantitate in- „ star plumaceoli, fascia superinducta. „ Mane gossypium auferebatur dictis for-

(q) Observ. hinc inde decerpt. 3a (Opp. p. m. 688).

„dibus valde imbutum. Continuando
„remedium per plures noctes infans
„optime curatus est „.

B. *Stimulantia* porro cum lenissima tantum esse oporteat, quæ dolorem nullatenus creando vasis tamen vires addant ad stases sanguinis in venas serosas propellendas, non immerito delectu hic opus est. Hunc ergo in censum præter plurima alia referuntur

I. *Vapores* discutientes lenissimi stimuli, cujusmodi curationem H. F. DELIUS (r) commemorat: „vir 50 annorum, habitus corporis ficcioris, hæmoptysin interdum passus est, sub paulo vehementiori corporis motu recru- descentem. Pathemata hypochondriaca olim sæpius expertus est, ita ut medicus quidam pro motibus hæmorrhoidalibus ea declarans fluxum hæmorrhoidalem provocare nisus fuerit, sed sine omni eventu, nisi quod urinae ardor postea eum vexaverit. Ante annum et quod excurrit arthritide per aliquot menses laboravit. Aliud jam accidit symptoma, nempe oculi sinistri inflammatio gravis et summe molesta, cum visus hebetudine juncta, quæ in

(r) Annenit. medic. Dec. I. Cas. 4.

„ dies augebatur, donec macula quædam
„ livida in tunica oculi cornea conspi-
„ ciebatur. Hoc punctum sensim cresce-
„ bat in majorem molem, ita ut post ali-
„ quot dies iris cum pupilla obnubilare-
„ tur, et visus privatio accederet. Al-
„ ter demum oculus etiam patiebatur in-
„ flammationem satis ardentem, ita ta-
„ men, ut visio remanserit, lumine vero
„ ob pruritum et feri ploratum non ga-
„ visus fuerit. Petitur consilium. In-
„ terna ergo respectu ad statum corpo-
„ ris habito cum externis conjunxi. De-
„ di igitur species pectorales theiformes
„ e rad. pimpin. caryophyllatæ, polypo-
„ dii, cichor. herb. hyssopi, veron. sa-
„ nicul. pyrol. heder. terrestr. sem. carv.
„ scenicul. cort. aurant. Deinde laxans
„ viscerale pro derivando affluxu e gumm.
„ ammoniac. acet. squill. sol. et iterum
„ inspiss. & dulc. et resin. jalapp. 1^o 5^o
„ et 9^o curationis die repetendum præ-
„ scripsi. Externe vero aquam ophthal-
„ micam e vitriol. alb. sacch. Saturn.
„ nitro dep. cum aqua euphras. calcatripp.
„ cyan. rosar. proportionata quantitate
„ mixtam adhibui. Post usum horum
„ medicamentorum symptomata quidem
„ mitiora evaserunt, pterygio vero o-
„ culorum non imminuto. Aquæ itaque
„ ophthalmicæ septica quædam, nempe

„croc. metallor. subtiliss. pulveris. et
„edulcorat. cum aloe hepat. et aqua
„chelidon. addidi. Verum et hæc vo-
„tis non respondebat. Pro ulteriori
„ergo revulsione laxans e diagryd. sul-
„phurato, ꝯ^{io} dulc. conch. ppt. ordi-
„navi, et temperantia nitroso-cinna-
„barina pro affluxu humorum congesto-
„rio temperando subjunxi. Vasa autem
„sanguifera in tunica oculi albuginea
„admodum turgebant et dolebant, ita
„ut in loco obscuro tempus terere co-
„geretur nosser. Interim species præ-
„dictæ continuato usu ad finem perdu-
„ctæ erant cum ægroti euphoria; pe-
„ctus enim leniebant, et mucidas im-
„puritates educebant. Petiit itaque de-
„nuo earundem præscriptionem. Dedi-
„ergo semine carvi et fœniculi paulo
„majore quantitate addito, et monui,
„ut calide ad promovendam transpira-
„tionem iis uteretur. Præcepi etiam,
„ut oculos inflammatos cantharo, ad
„quem species cum aqua calida dede-
„rat, admoveat, et vapores tepidos
„ascendere sinat. Stat promissis, et ne
„dissipentur nimis cito vapores, linteo
„caput tegit supra cantharum expanso.
„Sub primo statim usu grata ipsi super-
„venit sensatio ardore molesto remit-
„tente. Ter itaque vel quater per diem

„ per horæ dimidium vaporem tepidum
„ admittit, semper de melioribus gavi-
„ sus. Magnopere porro dictis specie-
„ bus fidens remittente inflammatione
„ iisdem pterygium sanandum esse cre-
„ dit : pergit itaque, et cum aliquando
„ ipsum oculum vaporibus admoveret, sen-
„ sum percipit, ac si quis digito aliquid
„ ab oculo removeret, autumat etiam
„ ipsum pterygium esse remotum, quia
„ objecta nunc distinguere possit. Ad-
„ vocor ad lætum effectum animadver-
„ tendum : video inflammationem diffi-
„ patam esse, et pterygii vestigium tan-
„ tum exiguum adhuc superesse, et mate-
„ riam quamdam purulentam dictum lo-
„ cum obsidere. Jubeo ejusdem infusi in-
„ ternum et externum usum continuatum;
„ et quia tempus Væ Sis instabat, offe-
„ ro prius adhuc dosin pulveris laxantis
„ supra indicati, et tum Væ Sem sua-
„ deo, qua celebrata in dies melior eva-
„ sit „. Similem quoque curationem
„ apud J. D. GOHLIUM (s) videre est,
„ nempe vir „ 47 annorum . . . gravem
„ utriusque oculi ophthalmiam per 6
„ sustinuit menses, quam excitatam fuisset

(s) l. c. Dec. 1. Vol. 5. Sect. 2. No 8. p.
21. sqq.

„ se perhibet ex paleis in oculos inter
„ cudendum frumenta flagellis actis,
„ quarum infensa actio exacerbata fuit
„ per ventosam et pluviosam aeris inju-
„ riam, quam perferre debuit, ante-
„ quam domum contigerat. Reliquit
„ hinc tandiu durans fluxio in utroque
„ oculo pannum satis densum; in dex-
„ tro paulo rarior erat vigente adhuc
„ aliquali inflammatione, in sinistro au-
„ tem magis unguem referebat pupillam
„ ex toto non obtegentem . . . Quinta,
„ qua malo laboravit, septimana . . .
„ accessit medicastrum, . . . ejusque cu-
„ randi processum ultra mensem patien-
„ ter pertulit. Hic venam ipsi mox se-
„ cuit sub inversa superiore palpebra,
„ . . . et 3^o die post venam secuit in
„ fronte super magis affectum oculum.
„ His artibus cum nihil proficeret, fon-
„ ticulum ipsi in nucha actuali cauterio
„ inurere tentavit, sed ob incitiam non
„ perfecit. Plus profecit præscripta cu-
„ ra in usu aquarum mineralium et bal-
„ nei (Freyenwaldensis). Balneum in-
„ terruptis vicibus humidum ut infessum
„ svasi; elatos vapores ex recenti aqua
„ per ignitos lapillos oculis apertis ex-
„ cipi imperavi, et ut emollitum hac
„ ratione pannum extengeret, lapidem
„ lyncis in alcohol redactum cum saccha-

„ ro finissimo in mortario plumbeo de-
„ trito mixtum in oculos insufflando. Sic
„ discessit patiens cum dissipatione in-
„ flammationis residuæ et ipse attenuandi
„ panni per remediorum commendato-
„ rum continuationem „.

2. „ *Ecbium* minimum . . . contu-
„ sum oculis inflammatis rubentibus in-
„ ter duplicatum linteum applicatum e-
„ gregie confert „ eodem Auctore (t)
teste , qui virtutem ipsius pluribus in
ejusmodi casibus est expertus.

3. *Stercus vaccinum*. M. B. VALEN-
TINUS (u) narrat in ophthalmia qua-
dam æstate epidemica Pastoris cujusdam
conjugem vehementia hujus mali ad
omnia quæque rebellis pene excæcatam
demum ex desperatione applicuisse oculis
cataplasma e stercore vaccino recenti
lintheis duplicatis involuto præsentissimo
cum levamine , cujus ulteriori denique
applicatione prorsus convaluit ; eodem-
que deinceps remedio plurimos in Pala-
tinatu inferiori ab ophthalmia fuisse li-
beratos , quod in honorem inventricis
der Frau Pfarrerinn Pflaster est appella-

(t) Ibidem No 14. p. 33.

(u) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 3. obs. 85.

tum. Pulchre huc facit G. S. SAMMONICI (x) versus:

Nec pudeat tractare fimum, quem bucula fudit.

4. *Camphora* vero omnium hic princeps merito habetur. F. HOFFMANNUS (y) expensis severo examine variis ophthalmicis commendari solitis tandem subdit: „ego potius majorem efficaciam promittere possum talis modi in casibus de iis, quæ sine magna acrimonia et sine ardore discussiva quadam pollent virtute, inter quæ laudem meretur *camphora*, quæ uti omnis inflammationis ita et hujus antidotus certa et præsentissima est. Quod si itaque inflammatio levior et superficialis tantum est, aqua flor. sambuci, in qua croci momentum est solutum, adjectis quibusdam guttulis solutionis *camphoræ* valde saturatæ, tepide applicata non erit sine magno fructu. Si acris lymphæ falsedo conjuncta est, mucilago sem. cydon. vel aqua rosarum cum croco vel *camphora* eximiolem virtutem præstabit. Si autem gravior et profundior neque periculo vacans est

(x) De medicina. Cap. 6. versu 5.

(y) Dissert. cit. §. 8.

„ inflammationis species , oculo plane
„ stupido et ferme sensibilitatis ac visus
„ experte reddito , magnum solatium in-
„ veni in sola applicatione tepida $\sqrt{\text{V}}$
„ camphorati, qui balsami Peruviani ad-
„ junctione conditus est : sic successive
„ et sensus , motus , ac tonus , et color
„ debitus ipsi oculo maxima cum admi-
„ ratione rediit, quale exemplum quon-
„ dam hic locorum habui,, Unde li-
quet, camphoram per se solam nunquam
oculis inflammatis applicari , sed semper
aliis pro re nata indicatis condimenti in-
star addi in fotu, cataplasmate, collyrio,
litu, &c.

5. *Crocus* , *opium* , gummi - resinæ
aliæ haud secius ac ipsa camphora tantil-
la dosi aliis remediis pro stimulo blando
excitando adjiciuntur , ut singula suis
ubique locis (z) visuri sumus.

C. *Attenuantia* vero sanguinem in ar-
teriis serosis errore loci hærentem , ut
in minores globulos dissilire queat, sicque
in minores venas transeat, mitissima pene-
trantissimaque salia esse oportet, qualia
vel neutra sunt vel præ primis acida ve-
getabilia sanguinem phlogisticum poten-
tissime fundentia. Hinc

(z) Vide §. 72 II No 1, 1) et passim sub
No 1.

1. *Acetum*, at parca manu ceteris aquosis additum, ut ex BOERHAAVIO superius (a) vidimus. Verum cum nunquam satis provide acetum administrari oculis externe queat, longe tutius ejus loco usurpatur

2. *Pomi pulpa* acido - dulcis (satis antiquum jam ad ophthalmias remedium, et perquam efficax) qua sola, qua aliis juncta: Quantum enim sola hæc pulpa tepide oculis adhibita solaminis MORGAGNIO (b), et cum pauxillo camphoræ ARNOLDI (c) juveni attulerit, in superioribus relatum est. Cataplasmatibus forma semper adhibetur, cui alii panem similagineum in aqua vel lacte coctum, alii alia emollientia, addito vel croco vel camphora, &c. jungunt. WOOLHOUSII cataplasma commendatissimum erat e pomo tosto, camphora, et croco dimidia quaque hora tepide in molli linteolo ita fronti et oculo admotum, ut nec irritaret oculum, nec perspirationem ejus turbaret. Isthoc paulo magis compositum pro graviore inflammatione commendat A. HAEN (d):

℞. Pul-

(a) Vide §. 71.

(b) Vide §. 59. No 2.

(c) Vide §. 41 No 2.

(d) Rat. med. P. 9. C. 6. §. 3.

℞. Pulpæ pomor. acido - dulc.

Micæ panis albi aa ʒij

Flor. rosar. rubr.

—— sambuci aa pug. j.

Camphoræ

Croci aa gr. vj. M. F. cum aqua vel lacte cataplasma. Quod ipsum etiam plurimi facit Ill. A. STÖRCK (e), et hocce etiam simplicius, nempe e pomo cocto, pane similagineo, croco et lacte paratum sæpenumero proficuum expertus est V. RIEDLINUS (f). Haud secius P. FORESTUS (g) „ puellæ (inquit) „ post universalia remedia, etiam Væ „ Sem, cum portio sanguinis una cum „ bile mixta esset, cum . . . purgata „ esset cum ʒjss syr. ex infus. ros. pallid. „ cum rhab. cum ʒijss aquæ viol. elect. „ de succo ros. ʒjss M. cum hæc oculis „ apposuissem, melius habuit:

℞. Medullæ panis optime tritæ ʒj

—— pomor. dulc. bene tritor. ʒij

Lactis mulieris ʒj

°° ros. (cum palpebra inflata et rubra esset) ʒss. M. em-

(e) Præcept. med. pract. in formulis No 54.

(f) Lin. med. ann. 6 Januar. 7. p. 28.

(g) l. c. obs. 2.

„ plastrum modo oculo affecto apponebatur; et cum dolor vehementior esset, addebam croci, opii aa gr. iij „. Denique P. H. VOGEL apud A. E. BÜCHNERUM (b) mulieris meminit proVectæ ætatis, quæ hyeme tam vehementi ophthalmia dolorifica oculi dextri cum acris feri profluvio et ejusdem lateris hemi-crania correpta est, ut diu noctuque quiete careret; effloruere insuper cum ante tum sub hoc morbo maculæ variæ magnitudinis rubræ et asperæ, lichenem siccum referentes. Dati §^{es} e lap. 69, C. C. philos. ppt. §^{io} diaph. cinnab. nat. cum intercalatis eccoproticis non sine levamine; atque cum collyria et humida et sicca dolores augerent, cataplasma e pulpa pomi Borsdorfiensis affati cum pauxillo pulv. sem. fœnugr. et croci calide applicatum insigne attulit auxilium. Quantum etiam ejusdemmodi cataplasmate pomaceo juvenis DECKERI profecerit, inferius (i) dicetur. Haud multum vero a pulpa pomi abludit

3. *Mulsa* seu hydromel; namque TRALLIANUS (k) „ quemdam densita-

(b) l. c. A. 1730 Januar. cl. 2. art. 8. §. 2. p. 813.

(i) Vide histor. 1.

(k) L. 2. C. 4.

„ te oculi laborantem mulsa curavit, cum
„ nullum ex iis, quæ mitigant, dolo-
„ renque leniunt, sopire cruciatum pos-
„ set, sed etiam majorem, quam antea fue-
„ rit, excitaret,, C. C E L S U S (1) quoque
multo multum tribuit: „ propter magnum
„ (inquiring) oculorum dolorem . . .
„ ovi et album et vitellus in vas desun-
„ dendum est, adjiciendumque eo mulsi
„ paulum, idque digito permiscendum:
„ ubi facta unitas est, demitti debet
„ lana mollis bene carpta, quæ id ex-
„ cipiat, superque oculos imponi. Ea
„ res et levis est, et refrigerando pi-
„ tuitam coercet, et non exarescit, et
„ glutinari oculum non patitur,,

4. *Urina* quoque huc est referenda.
Nam teste J. L A N Z O N O (m) „ bractea-
„ rius quidam annorum ætatis 57, qui
„ nunquam a nativitate ægrotaverat, in
„ ophthalmiam incidit, et respuens alia
„ remedia sola urina propria tepida ocu-
„ los affectos sæpe fovendo sanatus fuit;
„ quod arcanum ipse falsus est, acce-
„ pisse se ab agyrta aliquo Bononienfi „
Qui præter blandum lotii humani calo-
rem contenta quoque consideraverit, ni-
hil a vero alieni hocce in casu reperiet.

(1) l. c. L. 6. C. 6. art. 1. p. m. 282.

(m) Act. nat. cur. Vol. 1. Obi. 65.

5. *Aqua ophthalmica* M. RULANDI (n) perinde ad simplicia est revocanda; quippe quæ nil sit aliud, quam

℞. ∇^æ font. vel rol. alb. vel fœnic. ℥j.

Terræ sanct. 3℞. Bulliant simul per $\frac{1}{4}$ h. ad lentum ignem, et fervetur loco calido. Hujus 3ij si addatur ol. tⁿⁱ rubr. 3℞, tanto efficacius est remedium, quod cum ad plurima corneæ præsertim vitia valeat, in ophthalmia plurimum perinde valet. Adhibetur ter de die, nempe mane, meridie, ac vesperi forma lotionis, fatus, collyrii, ita ut æger immixtis ejus gtt. iij. jv. v. in oculum calide supinus jaceat per $\frac{1}{4}$ h. applicato simul oculis duplicato linteolo aqua hac calida imbuto. In nonnullis præmittitur ejus usui vel V^æ So vel catharsis, si ophthalmia sit paulo gravior. Duodecim ægros hocce remedio ab ophthalmia cum variis aliis oculorum vitiis complicata sanatos narrat Auctor (o).

D. *Repercutientia* denique percussenda veniunt; quorum ope simul vasa oculi adversus ultiores morbi recursus robo-

(n) Thesaur. medic. tit. *ophthalmia* p. m. 82. sqq.

(o) Curat. empyr. Cent. 3. cur. 16. 17. Cent. 4. cur. 48. 50. Cent. 8. cur. 3. 12. 14. 61. 62. 64. 65. 66.

rantur. „Hoc enim constanter expertus
„fui, inquit C. H. ERNDTEL (p),
„ophthalmias diuturniores, licet simpli-
„ces, non nisi sub finem applicatis ad-
„stringentibus curari, quatenus vascula
„nimis per affluxum continuum relaxa-
„ta non iterum ad consuetum suum to-
„num redire facile possunt, nisi debi-
„litati et relaxationi hoc modo subve-
„niamus „. Præcipua eorum sunt

1. *Aqua frigida, nix, glacies.* „Dis-
„cussa inflammatione, inquit J. L.
„SCHMUCKER (q), affluxus lymphæ
„crassioris (ad corneam) cessat, stases-
„que externis discutientibus et adstrin-
„gentibus remediis resolvi, auctaque
„vasorum actione rursus educi possunt.
„Hujusmodi remediorum princeps est
„aqua frigida, si ope spongiæ tenuis
„illa imbutæ oculus diligenter eluatur,
„præ primis ubi multum humorum ac
„pituitæ ille præbet; quæ si continen-
„ter non auferantur, calore loci acrimia
„et rodentia facta morbum auctiorem
„reddent „. Neque minoris est aqua
„frigida utilitatis in leviori ophthalmiarum
„principio; namque SWIETENIUS (r)

(p) l. c. Cap. 6. p. 193.

(q) Chirurg. Wahrnehm. I Th. p. 501.

(r) l. c. No 6.

„ ophthalmias incipientes sola aqua frigida applicata toties curatas vidit „
Id ipsum etiam similibus in casibus expertus est J. L. ODHELIUS (s), viditque ut plurimum intra breve tempus profuisse; sin minus, certo tenendum esse ait, causam ophthalmiæ subesse contumacem. Et V. RIEDLINI (t) senator ophthalmiæ sæpius a pueris obnoxius eam duobus euphoristis fugare solebat, nimirum vel fumo candelæ sebaceæ extinctæ bis terve in oculum admissio, vel si rubor, calorque gravius urgebat, solitus fuit „ medullam panis similaginei in aqua putali frigida macerare, et hanc postmodum expressam oculo dolenti imponere, dimidiaque fere elapsa hora hoc „ cataplasma . . . iterum remove; sic „ vero iterato aliquoties hoc labore se „ semper hætenus insigne persensisse levamen „ testabatur. Porro T. BARTHOLINUS (u) „ oculorum (ait) inflammationem, et exinde exortos dolores nullo alio remediorum genere „ sedare nuper potuit vir . . . quam nix vis globulo, quem in horto obam,

(s) l. c. p. 178.

(r) Curar. medic. millenar. No 560.

(u) De nivis usu medico Cap. 25.

„ bulans applicui „. Similem quoque
 casum narrat F. JUSTINUS (v): „ juve-
 „ nis 25 annum agens, temperamentum ca-
 „ lidi et humidi, hyeme transacta oph-
 „ thalmia dextri oculi adeo graviter la-
 „ borans, ut de visu periclitaretur, sæ-
 „ visque etiam ita afficiebatur doloribus,
 „ ut diu noctuque dormire non posset.
 „ Unde . . . exquisita instituta victus
 „ ratione venam statim in cubito dextro
 „ incidere, sequenti autem die aquas
 „ ophthalmicas applicare jussi; sed magis
 „ inde dolores augebantur, et sic im-
 „ patiens desperatusque ob suam salutem
 „ æger quotidie nova a me petebat re-
 „ media: unde . . . aliquantulum nivis
 „ oculo applicare jussi . . . statim do-
 „ lores conquieverunt, ophthalmia eva-
 „ nuit, sanusque æger noster evasit „.
 Quantum denique scopo prophylactico
 aquæ frigidæ tribuendum sit, ipse in se
 J. B. MORGAGNIUS (x) est expertus;
 nam ab ophthalmia sua contumaci li-
 beratus (y) „ ut intelligas (ait), post
 „ quantum morbum quanta mihi oculo-
 „ rum sanitas DEI præpotentis benefi-

(v) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 10. obs. 96.

(x) l. c. Epist. 13. No 24.

(y) Vide §. 59. No 2.

„ centia concessa sit, ut annos jam natus
„ circiter duodeoctoginta sine conspi-
„ cillis æque propemodum videam, ac
„ videbam ante illam inflammationem.
„ Quam si forte quæris qua ratione diu-
„ tissime arcuerim in tanta et tam assi-
„ dua oculorum interdiu et noctu con-
„ tentione, non alia dicam, quam faci-
„ ei et palpebrarum lotione matutina ab
„ eo tempore sic instituta, ut non teme-
„ re quavis aqua uterer, sed ea dumta-
„ xat, quæ modo e puteo hausta esset;
„ hæc enim hætenus frigida est, ut sine
„ his periculis, quæ a frigidissima timet
„ HILDANUS (z), fibrarum vim, quam
„ prægressa ophthalmia infirmaverat, et
„ restituere et servare potuerit. Cujus-
„ modi aquam an velit Cl. DETHARDIN-
„ GIUS in eo opusculo, quod *de spe-*
„ *cifico prophylactico oculorum* inscriptum
„ edidit Hafniæ A. 1745, pro certo sci-
„ re non possum; quamquam eruditissi-
„ mus HALLERUS (a), ex quo uno
„ ejus opusculi notitiam habeo, id spe-
„ cificum esse ait lotionem, quæ aqua
„ frigida sit. Sed hoc certe scio, cum
„ forte ejus, quam dixi, aquæ tandem

(z) Vide §. 33.

(a) Ad BOERH. meth. stud. med. P. 14.

„ omissem usum, inflammationem, quæ
„ annos plus 40 abfuerat, cito rediisse
„ primum quidem levem et palpebras
„ tantum afficientem, sed diuturnam;
„ deinde vero cum hic plerosque æsta-
„ te arriperet, in membranam ipsam
„ adnatam graviter adeo incumbentem,
„ ut in chemosin degenerare jam in-
„ ciperet. Quæ tamen (b) sine Væ Se
„ . . . pervicta est. Itaque annos inde
„ jam 9 oculis ferme uti olim valeo,
„ nec ullo adhuc egeo conspiciilli ad-
„ jumento „. Tanto vero aqua simplici
efficaciores sint, oportet,

2. *Aquæ medicatæ*, ut quæ non solo frigore, verum contentis etiam vel attenuantibus vel adstringentibus (ut est alumen, vitriolum, mars, &c. de quibus paulo post) in partem affectam agant. Hinc tot vetustæ ophthalmiæ ad fontes foterios leguntur percuratæ. c. V. K I R C H M E Y E R (c) meminit hominis a quadrimestri ferme oculorum rubore cum gravibus doloribus, iis aliquoties frigida fontis Kukuffensis aqua elutis, liberati.

(b) Pediluvio adhibito, ut §. 59 No 2 supra dictum.

(c) l. c. p. 87.

C. J. POELLER (d) narrat infantem trimulum ab ophthalmia humida dolorifica 8 dierum bis elutis aqua frigida Rintelienſi oculis, depulſo intra noctem eorum rubore, convaluiſſe. Porro (e) mulier 40 annis major e puerperio a multis annis ophthalmia humida cum intenſiſſimo ſæpe oculorum capitisque dolore laborans poſt plurima necquidquam tentata demum oculis ſola hac eadem aqua frigida ſemel ſæpiusve quotidie elutis ita intra 6 hebdomadas emendata eſt, ut inde proxime perfectam ſperaret ſanitatē. Sub uſu hujus aquæ cœpit (quod nunquam ante accidit) multum humoris e naribus profluere.

3. *Spiritus vini* etiam præclare ſe ſe hic gerere ſolet qua in ſotu qua collyrio, et quidem

a) *Simplex*. In conſtitutione epidemica Auguſtana A. 1697 teſte L. SCHROECKIO (f) „ ophthalmiæ ar- „ dorem nihil felicius, quam vini ſpiri- „ tus linteolo exceptus et impoſitus „ compeſcebat „ Pro collyrio tamen, ſi rectificatus eſt, diluendus erit 4 partibus aquæ frigidæ; unde A. HAEN (g)

(d) Unterricht von dem Riendl-Waſſer p. 61.

(e) Ibidem p. 86. ſqq.

(f) Miſc. nat. cur. dec. 3. ann. 5. app. p. 155.

(g) l. c.

„ neque hic (ait) laude sua caret aqua
 „ purissima, cujus unciae \mathfrak{V} rectificatis-
 „ simi gtt. 15 vel 20 additæ fuerint „.
 s. YVES (b) autem ∇^x partes 10, cum
 una \mathfrak{V} parte miscebat.

b) *Galbanatus*, de quo KAEMPFF
 (i) „ Cl. D. BERNHARD in experimen-
 „ tis suis chymicis (inquit) plures alle-
 „ gat casus, ubi essentia Galbani ex sic-
 „ co friabili grumoso cum semine legu-
 „ minibusque remixto (tenax enim pu-
 „ rumque non æque profuit), affusioque
 „ \mathfrak{V} rectificatissimo parata in ophthal-
 „ miis . . . valens fistebat medicamen-
 „ tum. Ipse quoque expertus sum eam
 „ puero, cui oculus ab injecto calcis
 „ frusto inflammatus admodum tumefa-
 „ ctus, imo ex parte suppuratus erat,
 „ visum reddidisse „.

c) *Camphoratus* vero omnium effi-
 cacissimus censendus est, cui HOFFMAN-
 NUS (k) quoque plurimum tribuit, et
 JANIN (l) etiam pluribus suis formulis
 adjicit. Sane G. E. STAHLIUS (m)
 parcus et scrupulosus remediorum lauda-

(b) l. c. Cap. 6. art. 3. p. m. 195.

(i) Act. phil. med. Hassiac. art. 23. p. 154. sq.

(k) Vide præced. B. No 4.

(l) Vide præced. A. No 4.

(m) l. c. p. 418. sq.

tor, huic nihilo minus remedio multum laudis impertitur, et vix non superstiosum ejus delectum exigit, rectificatissimumque Ψ tandummodo deposcit; cumque Ψ camphoratum purum per se adhibeat, palpebras illo solum tangendas præcipit, externe (inquiens) ejus, modi ophthalmicis affectionibus camphora vel etiam Ψ camphorato meri possumus, idque mox initio, quamdiu rubor calorque non dum cum manifesta inflammatione juncti sunt, aut hacce etiam jam præsentē; modo id cautum sit, ne quid in oculum influat, ardorem enim velut a prunis causat: eapropter crassiore penicillo in Ψ camphoratum intincto, rursusque excusso, ne quid amplius stillet, sed humidus tantum vel madidus maneat, palpebræ solæ circum circa perfrictæ humectandæ sunt: unde in sensibilibus palpebris oboritur quidem vehemens ardor, sed quem vel manu tantum vel mucinio ventilatus aer fuget, dum exhalante spiritu camphoræ sola remanet. Hicce Ψ camphoratus in stasibus et inflammationibus capitis et oculorum usque adeo est efficax, ut eas sæpe intra unam alteramve horam imminuat,,.

4. *Alumen*, cujus stiptica vis nemini ignota est, eodem ut priora scopo in ophthalmiis usurpatur aut leviter incipientibus aut in taraxin pertinacem desinentibus; quippe „in admodum rebellibus casibus pauxillum aluminis usti „cum dupla sacchari albi copia in pol- „linem redacti, atque ita in oculum „inflati plerisque sibi cognitis remediis „præfert „J. SIMS (n). Plerumque tamen cum albumine ovi subactum adhiberi solet. „Ophthalmia . . . quam „levem diximus, inquit F. HOFFMANNUS (o), optime fert frigida et repellentia, ac solum albumen ovi cum „aqua rosarum et pauxillo aluminis con- „quassatum sufficit, omnibusque aliis „palmam præripit „. Optimam inde ∇^{am} ophthalmicam paratam expertus est C. BISSET (p) sequentem:

R. $\nabla^{\text{æ}}$ fontan. ξ viij

Album. ovi Noj

\bigcirc rupei ξ j M. m. et v. instilletur oculo, et linteolum hac ∇^{a} humectatum applicetur. Et J. PRINGLE (q) in de-

(n) Bemerkung. über epidem. Krankh. 5. Cap. p. 147.

(o) Med. rat. syst. T. 4. P. 1. S. 2. C. 11. cautelar. §. 1.

(p) l. c. p. 111.

(q) l. c. p. m. 159.

terioribus quoque casibus, ubi inflammatio evacuationibus aliquatenus cessit, aluminosum coagulum lintei carpti ope ante somnum appositum ut efficacissimum remedium externum est expertus. Perinde „ multis frustra tentatis remediis in „ Patre meo, ait P. BORELLUS (r), „ ophthalmia detento sequenti applicatione curatus fuit: acc. albumen ovi, „ et cum aluminis frustulo tamdiu agitur, donec pultis consistentiam acquirat, postea linteo subtili involvatur, „ et oculo clauso palpebræ imponatur, „ sæpe renovando „ Siquando igitur, quod contra hujus remedii usum objicit M. LANGE (s), palpebras inde conglutinari accidat, poterit ab oculis ad tempora, ut non nulli faciunt, transferri; imo et ad nucham applicatum oculis inflammatis profuit narrante T. BARTHO-LINO (t), cui J. JANUS Regius archiater „ de oculi rubore et inflammatione . . . fidem fecit, non semel albumen ovi cum alumine mistum impositumque nuchæ ruborem oculorum feliciter exterfisse et delevisse „

(r) l. c. Cent. I. Obs. 31.

(s) Diss. cit. §. 29. p. 60. nota (b).

(t) Histor. anatom. rar. Cent. 4. hist. 39. p. 318.

5. *Vitriola*, album, viride, cœruleum ejusdem pene sunt energiae, et quantum ad levius malum abolendum possint, vel moribunda RIEDLINI (u) vidua est experta; in graviori autem casu pueri, cujus historiam e Commercio literar. Norico superius (x) dedimus, non sperandum inde auxilium est obtentum. Usitatissima tamen hic vitriola sunt

a) *Ceruleum*, de quo ita F. HOFFMANNUS (y): „notum . . . est, vitriolum, praesertim quod veneris particeps est, inter ophthalmica a practi-
cis ceu summum arcanum praedicari. At vero cum ferme promiscue inter
omnium collyriorum formulas assumatur, maxima saepius exinde resultat
noxa. Abstinentum autem ab eo est in omni inflammatione, in falsis quo-
que praecalidis acribus fluxionibus cum rubore cum pruritu junctis; quoniam
sua acrimonia haec incommoda omnia auget. Datur tamen ipsi locus aptissimus,
quando aut humores sunt crassiores, et in lemas abeunt, aut quando-
cunque in tunica albuginea membra-

(u) Vide §. 14. d).

(x) Vide § 34. No 1. b).

(y) Dissert. cit. §. 9.

„ nulas formare incipiunt, quod post
 „ morbillorum vel variolarum morbos,
 „ qui nimiam lymphæ introducunt lente-
 „ scentiam, non rarius contingit. Tali
 „ itaque in casu mirabilis effectus reme-
 „ dium est Vitrioli Cyprii gr. j in ℥j
 „ ∇æ chelidonii solutum, quo liquore
 „ subtili pluma crebrius de die affecta
 „ pars tangenda est. Ubi autem mani-
 „ festa corrodens et urens materia per-
 „ cipitur, temperantia demulcentia mu-
 „ cilaginosa, inter quæ mucilago sem-
 „ psyll. et Sieff alb. sine opio splendet,
 „ et ♂ sarcocollæ, operam non satis col-
 „ laudandam conferunt „. Quantum
 „ enim noxæ parere præpostere adhibitum
 „ valeat, sensit inter alios mulier BÆUM-
 „ LEINII (z).

b) *Album* vero ceteris præferri
 solet, idque vel aqua solutum vel butyro
 remixtum. De posteriori F. HOFFMAN-
 NUS (a) „ neque . . . in chronica oph-
 „ thalmia (ait), ubi continuum lymphæ
 „ salæ acris est stillicidium, inglorium
 „ est HOECHSTETTERI medicamen-
 „ tum ophthalmicum ex butyri recentis
 „ infusi ℥ij et vitrioli albi ℥j, de quo
 „ granum

(z) Vide §. 34 No 1. a)

(a) Med. rat. system. l. c. §. 6.

„ granum pisi majoris inagnitudine in
 „ oculi canthum subinde indendum „.
 Et J. N. BINNINGER (b) „ ophthalmicos
 „ plurimos cum tumore , dolore lanci-
 „ nante et intolerabili , ne quidem præ-
 „ missis ullis remediis aliis , ita felicissi-
 „ me sanavit :

℞. Butyr. rec. ▽^a ros. vel plantag.
 q. s. loti 3 ij

Vitriol. alb. pulv. 3j plus minus-
 „ ve. M. F. unguentum. Hujus magni-
 „ tudo pisi minoris in oculi clausi angu-
 „ lum majorem intrudatur , et eodem
 „ palpebra illinatur. Dolor inde oritur
 „ mordicans brevis , dein aqua plurima
 „ expurgatus oculus tutissime et intra
 „ paucas horas omnino revalescit ; nec
 „ fefellit remedium unquam „. Neque
 „ aquosa solutio minus est efficax : „ est ...
 „ matrona , inquit M. GERBEZIUS (c) ,
 „ ad quam homines vulgares ut ad Hy-
 „ gieam ipsam pro aqua fontana solo vi-
 „ triolo albo ad oculorum tolerantiam
 „ saturara tanquam pro remedio in ocu-
 „ lorum indispositionibus probatissimo in
 „ copia confluunt ; et ea re vera facit
 „ effectus optatissimos „. Quos si ne-

(b) Obs. et cur. medic. Cent. 5. Obs. 100.

(c) Chronol. med. pract. ann. I. §. 59. p. 46.

quaquam faceret , non erat PRING-
LE (*d*) suis illam ægris adhibiturus.
Et J. MUYS (*e*) „ puer 12 annorum
„ (refert), corpore sanus, inter luden-
„ dum fumum ex . . . crepitu lupi . . .
„ ab alio puero emissum oculis suis ex-
„ cepit : unde spatio 2 horarum vix ela-
„ pso palpebræ adeo intumescebant, ut
„ oculos aperire nequirent ; oculi toti
„ rubebant non aliter , ac si panno rubi-
„ cundo fuissent cooperti, et talis quo-
„ que apparebat interior palpebrarum
„ superficies ; ac dolor intensus aderat.
„ Patiens per biduum remedia neglexit,
„ ac interea prædicta symptomata in-
„ crescebant, et præterea continuus erat
„ lacrymarum acrium effluxus. . . . Ego
„ igitur 3^o læsionis die ad puerum voca-
„ tus instillavi calide in oculos guttas
„ aliquot alicujus collyrii, quod ex vi-
„ triolo albo aliisque cum aquis conve-
„ nientibus mixtis componitur ; et super
„ oculum applicui emplastrum ex gummi
„ ammoniaco, galbano, sagapeno, lithar-
„ gyrio, &c. conflatum, et super lin-
„ teum extensum : hæc ego quotidie bis
„ iteravi ; et puerum in loco tenebroso

(*d*) l. c.

(*e*) l. c. Dec. I. Obs. I.

„ retineri iussi; atque ita æger intra 2
„ septimanas pristinam sanitatem in totum
„ recuperavit,,. Porro FISCHERI (f)
in matrona, „ ophthalmia . . . observaba-
„ tur . . . ita vehemens, ut non tantum
„ id, quod per sanitatem album in oculo
„ esse debet, sed et oculorum vicinæ
„ partes ob maximam inflammationem ru-
„ berent ac tumerent. Atque hæc in-
„ flammatio oculorum dolore, ardore,
„ pulsationeque arteriarum circum sita-
„ rum, interdum etiam tanta cum pun-
„ ctione, ut oculi tanquam ab infixa
„ acu aut spina stimulari viderentur,
„ ita urgebat, ut et caput in consensum
„ traheretur et doleret . . . Et hoc ma-
„ gis incommodum patienti erat, quod
„ lacryma ferventi oculi semper perfun-
„ debantur, ac sordibus præsertim ma-
„ ne conspurcabantur . . . Pilulas poly-
„ chrestas BECHER. primo exhibui, tan-
„ dem collyria ex aqv. ros. alb. cheli-
„ don. euphras. plantag. addito vitriolo
„ albo et sacch. Sat. oculis externe appli-
„ cari, iisque sæpius de eodem collyrio
„ per 2 guttas instillari curavi. Et sic. . .
„ ab atroci hoc malo liberabatur,,.

(f) Annal. Vratisl. Tent. 13. A. 1720 Aug.
cl. 2. art. 3. §. 4. p. 175. sq.

6. *Tutia* perinde vel aqua vel pingui-
 bus excepta ophthalmiæ utiliter applica-
 tur. Apud AMATUM (g) doctus qui-
 dam vir „ destillationem ad oculum fini-
 „ strum patiebatur ; contra quam hoc
 „ usus est remedio , et brevi sanus eva-
 „ sit: tutiam præparatam linteo raro ex-
 „ cipe et filo liga , et in vino Cretensi
 „ austero immerge , et ea sic panno
 „ excepta oculum lava ; brevi enim vel
 „ intra triduum sanus evasit. Bis autem
 „ vel ter in die curari debet „ . Ita
 etiam P. FORESTI (h) „ vir . . . cum
 „ pilulas sequentes devorasset

℞. Pilul. sine quibus

—— lucis

Rhab. pulv. aa ʒj

Diagr. gr. ij. cum

Aqua fœnic. F. pilulæ v. D. post
 „ mediam noctem ; ceterum iis optime e-
 „ gessit ; sed non quod hac de causa dolor
 „ aut rubedo discederent : sequenti ve-
 „ ro die scapulis cucurbitulæ cum scarifi-
 „ catione cutis sunt applicatæ. Tandem
 „ 5^o die (uti etiam apud AMATUM (i)
 „ JOSEPHUS quidam cum oculum aqua

(g) l. c. Cent. 5. curat. 96.

(h) l. c. Obs. 5.

(i) Falsa citatio est Cent. 4. cur. 45.

„ ros. tutia ppt. excepta et per manicam
 „ trajecta lavaret) brevi sanitatem obti-
 „ nuit,,. Et GOERITZII (*k*) ancilla
 20 annorum ophthalmiam oculi dextri
 cum dolore pungente capitis naſta, dem-
 ptis ob plethoram sanguinis e mediana
 dextra 3vj, datisque pulveribus cepha-
 licis nitrosis, et usu collyrii ex aqv. ro-
 sar. pap. rh. euphras. tut. alex. die 6° a
 dolore ruboreque prorsus est liberata.
 Siccis præsertim in ophthalmiis c. s. YVE-
 SIO (*l*) familiaris erat sequens aqua
 ophthalmica;

R. Aquæ plantag.

—— rosar. aa 3ij

Tutiae ppt. gr. xij.

℥ cochl. j. M. D. pro ablue-
 dis ter quotidie oculis. Perinde quoque
 tutia cum aqua rosarum in pulvem redacta
 brevi ophthalmiam depulit RIEDLINI (*m*)
 hypochondriacus. Aliis unguentum in-
 de magis arridet, ut inferius de unguen-
 to nihili albi (*n*) dicitur, laudatque ejus
 usum PRINGLE (*o*) pro marginibus pal-

(*k*) Annal. Vratisl. Tent. 33. A. 1725 Aug.
 Cl. 2. art. 3. §. 3. p. 159.

(*l*) l. c. Cap. 6. art. I. p. m. 190.

(*m*) Vide §. 37 No 3. a).

(*n*) Vide infra II. No 2. a).

(*o*) l. c. p. m. 159.

pebrarum, in primis si excoriati doleant, sub noctem illud illinendo; postmodo tamen ei prætulit linimentum e lapide calaminari optime lævigato et dupla axungiae viperinæ copia remixto paratum (p). Interea „tutia prout vulgo paratur, in „quint Vratislavienſes (q), jam olim „ſuſpecta fuit MONTANO (r); et ſane „omnis dies docet, quod niſi in tenuiſſimum pulverem convertantur tutia, „ceruſſa, æs uſtum, in oculorum affectionibus vehementer noceant „.

7. *Zinci flores*, de quibus A. HAEN (s) „inter ea (inquit) auxilia, quæ variis „oculorum affectionibus opitulari experimur et miramur, una cum Væ Se et „iteratis purgantibus, laudare oportet „flores Zinci, quorum drachma unciis „quinque aquæ roſarum vel euphragiæ „admiſta incipienti ac repetenti tunc „cæ conjunctivæ inflammationi efficax „auxilium præſtat „. GYRSTING (t) hoc remedio feminam quandam ab inſigni ophthalmia liberavit, recordatus ſtudioſi

(p) Ibidem p. m. 160 nota (c).

(q) Hiſtor. morbor. Vratisl. p. m. 63.

(r) Conſultat. 142.

(s) l. c.

(t) TODE med. chir. Biblioth. 3 Band 4 Abſchn. p. 181. ſq.

cujusdam, qui dum institutæ a GAUBIO florum Zinci sublimationi interesset, subito inde a rubore oculorum levatus est. Perinde testatur MÜLLER (u) in ophthalmiis flores hos cum aqua vel simplici vel stillatitia idonea in collyrium aptatos omnibus pene aliis efficaciores fuisse repertos. Sane (x) mulieri plethoricæ et in scorbutum pronæ cum albuginea ruberrima tumore cultri dorsum æquante ultra corneam in pupilla emereret, flores Zinci cum aqua fontis per infusionem semin. plantag. mucilaginosâ reddita oculo instillata, noctuque palpebræ ope splenioli imposita, sumptis item aliquot magnesiæ albæ dosibus, ruborem brevi dissipavit.

8. *Saturnina* jam restant dicenda. Antiquus eorum in ophthalmiis est usus, et ne ad prisca tempora excurrere necessum sit, abunde nostra ætas utilitatem illorum commonstrat; HELWICHIVS apud Vratislavienses (y) non facile ad remedium aliud confugit, siquidem „ly-
„ thargyrium cum aceto destillato solu-

(u) Annal. Vratisl. Tent. 25. A. 1723 Jul.
Cl. 2. art. 3. §. I. p. 34. (').

(x) Ibidem p. 33. sq.

(y) Histor. morbor. Vratisl. A. 1699. p. m. 14.

„ tum ac aquis debita proportionē mix-
 „ tum spem ejus non est frustratum „.

Et G. E. STAHLIUS (z) in remittente jam oculorum inflammatione pro leni adstrictione ac repercussione obtinenda saccharo Saturni in aqua rosarum soluto nihil æquiparari posse asserit, nempe

℞. Sacch. bⁿⁱ puri ʒss vel j

∇^x rosar. ʒss. M. et vitro in aquam calidam indito, concutiendoque miscelam digere. Pro usu vetat miscelam agitari, ne sedimentum crassiorum partium aquæ denuo remixtum oculum, dum ei tepide immittitur, irriter. Vel

℞. ∇^x rosar ʒss, instilla

Aceti lithargyr. q. s. ad saporem usque subdulcem (v. g. gtt. 20. 30. 50. &c. pro ratione nempe aceti plus minus concentrati), hujusque miscelæ gtt. 2. 3. tepide oculo instillantur, linteolumque camphoratum (a) desuper palpebris imponitur, egregio cum successu. M. GERBEZ (b) narrat chemico sub aquæ fortis præparatione vitro rupto guttulam ejus oculo illapsam subito dolorem in illo causasse intolerabilem, inflammationemque cum tumore et periculo cœcitatatis; ap-

(z) l. c. p. 420.

(a) Vide præced No 3. c).

(b) Misc. nat. cur. dec. 3. ann. I. obs. 133.

plicato autem linteolorum ope saccharo
 b m in aqua soluto intra paucos dies pri-
 stinam recuperavit cum illæso visu sanita-
 tem. Ante videnos demum annos ampli-
 simum saturninorum ac præsertim extracti
 b ni et ∇^x vegeto-mineralis dictæ usum
 externum invexit GOULARD, complu-
 ribusque adductis observationibus effica-
 ciam eorum in ophthalmiis ostendit, nem-
 pe (c) GAUTIER chirurgus vidit oph-
 thalmiam vehementissimam cum phlyctē-
 nis et inflammatione vicinarum partium
 diu ad omnia rebellem demum aqua ve-
 geto-minerali intra breve tempus per-
 curatam. CONSTRITI chirurgi (d) fi-
 lia ab utriusque oculi inflammatione cum
 feri acris vicina inflammantis profluvio
 et palpebris clausis ope ejusdem aquæ
 cito convaluit. BOUNHIOL (e) quoque
 monachum ab ophthalmia innumeris re-
 mediis resistente eodem remedio vindi-
 cavit. DELAN (f) perinde militi tri-
 mestrem utriusque oculi inflammationem
 cum lucis impatientia perpeſſo omnibus

(c) Traité sur les Effets des preparat. de Plomb,
 et principalm. de l' Extr. de Saturne T. 1.
 Ch. 1. obs. 19. p. 52.

(d) Ibidem obs. 21. p. 53.

(e) Ibidem obs. 22. p. 54.

(f) Ibidem obs. 23. p. 54. sq.

frustra adhibitis præfidiis (nempe Væ Se brachii pedisque iterata, crebris balneis domesticis, variisque collyriis, &c), eodem tandem topico pristinam reddidit sanitatem. Porro (g) infans ab 8 mensibus ophthalmia cum levi corneæ pterygio visum impediēte laborans post plurima necquidquam adhibita demum continua aquæ ejusdem applicatione intra octiduum sanus evasit; eodemque topico negotiatoris filia vetustam ophthalmiam cum lucis impatientia passa convaluit (h), quod etiam chirurgiæ studiosum (i) ab utriusque oculi ophthalmia in dies ingravescēte, omniaque eludente remedia in sanitatem asseruit. Ostendæ quoque et Brabantiaë chirurgi (k) ophthalmias quasque, etiam inveteratas, huic remedio cessisse testati sunt. Ita etiam caufidici cujusdam (l) filia a gravissima ophthalmia cœcitatem minante brevi tempore hoc ipso remedio est confanata. Narrat et DEIDIER (m) feminam ophthalmia totius bulbi vehe-

(g) Ibidem obs. 24. p. 55.

(h) Ibidem obs. 25. p. 56.

(i) Ibidem obs. 26. p. 56.

(k) Ibidem obs. 27 et 28. p. 57.

(l) Ibidem obs. 29. p. 57.

(m) Ibidem obs. 30. p. 58.

menti cum palpebrarum vicinarumque partium inflammatione correptam nullis remediis, diu licet usurpatis, ab ea liberari potuisse; applicata vero aqua vegeto-minerali intra 7 dies morbum fuisse profligatum. Alias (n) quoque hæc aqua ophthalmiam in viro $2\frac{1}{2}$ annorum, et in famulo quodam (o) cum utriusque oculi periculo visus amittendi conjunctam sustulit. Haud secius COULAS Medicus (p) ophthalmia pessima correptus est cum vehementissimis inflammationis symptomatibus, ut atrocem dolorem nulla anodyna mitigare valerent: mucilago semin. psyllii ∇^a rofar. extracta, pulpa pomi acido-dulcis in lacte cocta, albumen ovi cum alumine conquassatum, crocus orientalis, frustra adhibebantur; nec abhinc plus profuere adstringentia cum solventibus. At vero aqua vegeto-mineralis vix in usum vocata continuo profuit mitigato dolore, imminutoque rubore et vasorum corneæ infarctu. Visurus autem æger, quid intermissa eadem futurum esset, vix sepositam pristina inflammationis symptomatum vehementia reversa coe-

(n) Ibidem obs. 32. p. 59.

(o) Ibidem obs. 33.

(p) Ibidem obs. 34. p. 59. sq. et p. 265. sqq.

git resumere, postquam tentata ante remedia priora ne hilum iterum profuissent. Quod experimentum cum sæpius eodem semper eventu pertentasset, continuato tandem aquæ saturninæ usû cum aliis generalibus remediis conjuncto sanitatem est adeptus. Inde cum alius quoque medicus (q) morbo eodem ita fuisset correptus, ut unus oculus præ altero gravius laboraret, COULAS priori ∇ am saturninam, alteri aquam rosarum et plantaginis applicuit, dispari eventu; nam die 30^o finiente oculus gravius affectus ab aqua Saturnina prorsus erat curatus, altero nihil dum emendato, quoad et huic aqua Saturnina fuisset applicata. DELPUECH (r) Monspeliensis medicus refert feminam a bimestri utriusque oculi inflammatione cum palpebris inversis, cum Væ So, catharsis, potusque refrigerantes nil profuissent, aqua Saturnina adhibita intra 10 dies fuisse liberatam, inflammatione primis mox 24 horis remittente. Denique (s) chirurgiæ studiosus insignem nactus est ophthalmiam cum caruncularum lacrymalium infarctu, re-

(q) Ibidem Obs. 35. p. 61. sq.

(r) Ibidem Obs. 43. p. 68.

(s) Ibidem Obs. 45. p. 69.

laxatione levatorum palpebræ, et involuntario lacrymarum profluvio tam acri, ut circum oculum tumorem erysipelatosum causerit. Cum V^x So, et albumen ovi aqua rosar. et plantag. exceptum nil juvarent, ab aqua Saturnina morbus intra quatrimum plane decessit. Duos etiam id genus casus profert GUERIN (t), nempe puella ophthalmiæ insultus aliquot perpessa cum eos initio negligeret, illi tandem ita invaluerunt, ut malum pro habituali haberetur. Frustra variis per bimestre usurpatis demum aqua vegeto-minerali convaluit. Juveni quoque cuidam tam vehemens accidit ophthalmia, ut inflammatio in vicinas etiam oculo partes diffunderetur; morbusque jam seu ob neglectam seu frustraneam medelam satis diu duravit: donec eum aqua dicta intra breve tempus profligavit. TOUTANT (u) quoque insignem hanc in rem suppeditat observationem: juvenis 24 annos natus 15^a Novembr. leve genarum ac palpebrarum erysipelas cum pulsu pleno rigidoque cum nactus esset, facta larga brachii V^x Se, imperataque severa diæta,

(t) l. c. p. 16. sq.

(u) ROUX Journal de Medecine T. 38 Septemb. 1772 p. 280. sqq.

jussus est crebro uti fotu ex leni infuso florum sambuci; ac vespere injectum enema cum oleo lini. Biduo lapsa levius habuit, erysipelate evanescente, pulsuque molli facto; at ob linguam perquam sordidam postridie datum catharticum e manna, rheo, et sale Epsomenfi. Die 28^a auriculæ admodum tumuere cum dolore; sed postero die emergente materia quadam puriformi sat copiosa præsertim ex lobulo auriculæ sinistræ levamen sensit. Abhinc omnia bene cum procederent, die 5^a Decembris æger a longa scriptione, et quod plures horas libero se se aeri ad fenestram exposuerit, tanta ocyus ophthalmia ingruit, ut die 7^o æger nil prorsus videret, ac præter palpebras quoque tensas et inflammatas dolor in oculis punctorius sentiebatur, et materia prius ex auribus procedens substitit. Idcirco applicitum nuchæ vesicans, ac exiguo fructu, vesperi enim ad horam 10 terribiles supervenere convulsiones cum sensuum abolitione: quæ tamen a MR^a antispasmodica pacante hora 1½ noctis cessarunt, æger sui compos factus noctis reliquum sic satis tranquille et cum aliquo etiam somno transegit. Die 8^a Decembris, morbi 14^a, perquam bene se habuit, procedente rursus aurium materia copiosa præsertim lævo ex latere;

punctorius tamen dolor ac cœcitas oculos non dum reliquit. Proinde 3^a quaque hora adhibebatur cataplasma e mica panis ac vitello ovi cum aqua vegeto-minerali paratum, sub cuius renovatione interea semper fatus ex aqua vegeto-minerali oculis tepide impositus. Die 9^a melius inde habuit, ac 10^a videre cœpit, sicque in dies in melius proficiens 15^a Decembris prorsus convaluit, pristino quoque recuperato visu. Huicce casui præmisit jam unum primum (x), deinceps vero duos alios addidit P O U P A R T (y), nempe mulier ab accensa copiosissima aqua vitæ passim in corpore, maxime vero circa oculos, ambusta fuit, cum insigni palpebrarum inversione; vasa albuginæ summe erant infarcta, et in interno oculi dextri cancho ulcus visebatur, puris pauxillum præbens; corneaque hujus oculi nimisquam corrugata lucis radios arcebat. Omnibus pene confanatis locis ambustis oculorum malum ingravescebat potius, quorum insignis dolor pluribus jam noctibus insomnia causavit. Eapropter severa injuncta diæta leviores aliquot ambustæ plagæ in suppuratione diutius tenebantur, ut humores ab

(x) Ibidem T. 36 Decemb. 1771 p. 555 sqq.

(y) Ibidem T. 39 Mai 1773 p. 438. sq.

oculis eo averterentur, et compluribus linteis oculum dextrum cooperientibus, inflammationemque augentibus detractis lotiones aqua Saturnina sunt imperatæ eo cum successu, ut dolore subito conquiescente somnus redierit, et oculi intra 10 vel 12 dies prorsus fuerint confanati. Alteri feminæ egenæ ophthalmiam sat vetustam et ad remedia quæque rebellem passæ præter externum aquæ vegeto-mineralis usum alia quoque morbi causæ opposita remedia svadebantur; illa vero cum isthæc negligeret, ab sola ∇ Saturnina nihil profecit in melius, donec illis quoque usurpatis, et ad aquam vegeto-mineralem guttis aliquot ∇ camphorati adjectis, intra breve demum tempus convaleuit. Cum igitur tanta sit ∇ vegeto-mineralis GOULARDO dictæ hic efficacia, scire quoque interest, quis ejus conficiendæ sit modus, nempe (z):

R. Lithargyr. auri (v. g.) ℥j

Aceti vini pint. j Gallicam. Coque ut minimum per horam sub continua agitatione ope ligneæ spatulæ: tum reponere loco quieto, ut crassiora subsidant; quo

quo facto liquor supernatans inclinatio-
ne vasis decantatus *extractum Saturni* di-
citur. *Aqua vegeto-mineralis* ita inde
conflatur :

℞. ∇^x communis circ. ℥ j.

∇^x vitæ cochl. Caffæac. ij.

Extracti ℥ⁿⁱ cochl. Caffæac j. M.

∇^x vitæ et extracti copia augeri minui-
ve potest, pro ratione morbi vel oculi
sensibilioris patientiorisve, ita ut Auctor
morbi principio ad vitrum ∇^x communis
non nisi gtt. x. xij. extracti ℥ⁿⁱ instillet,
ejusque deinceps pro re nata plus adjici-
at. Ubi deinceps in Germania et aliis
orbis plagis tentamina hanc in rem insti-
tuta fuissent, eadem ubique se se uti-
litate hoc remedium probaverat. u. c.
SALCHOW (a) lithargyrii in locum suf-
ficit minium, utpote purius, indeque
obtentum extractum ℥ⁿⁱ vocat TRam-
minii, nimirum

℞. ♂ minii subtiliss. et puriss. ℥ j affunde

Aceti vini destill. et concentra-
tiss. ℥ ij. jv.

Coque in vase vitreo repando, continuo
lignea spatula miscelam agitando, jss vel
ij horis (si acetum nimis evaporaret co-
ctionis tempore, massaque nimis spisses-

(a) l. c. p. 12. 13. 17. 18.

ceret, affunde adhuc ꝥj aceti dicti, coctionemque continua): quo facto miscellam ab igne remotam reponere loco frigidulo per 6 horas, ut refrigeretur, et crassiora subsident. Tum liquor supernus flavus ac limpidus decantetur, et per bibulam chartam filtretur; denuoque evaporetur ad dimidium. Hocce residuum *TR^a minii* audit, quod s. q. cum aqua pluvia destillata vel fontana purissima, adjecto Spir. Vini Gallico, mixtum constituit ante dictam aquam vegeto-mineralem. Duarum hoc remedio curatarum ophthalmiarum idem hic Auctor exempla adfert, videlicet (*b*) virgo 20 annorum a teneris fere continenter multas perpeſſa ophthalmias autumnis rursus cum eodem malo confictari cœpit, aderat intensus dolor, oculorum tumor, et lucis impatientia. Datæ itaque lenes pilulæ, et pro oculis sequens:

℞. ∇^a pluviae destill. ʒ iij

TR^a minii

Spir. Vin. camphor. aa gtt. xij. M.

D. agitatum prius pro collyrio ac foru. Unde intra triduum plane convaluit. Porro (*c*) mulier 22 annorum ante tres heb-

(*b*) Ibidem 21 Beobachtung p. 114.

(*c*) Ibidem 24 Beobachtung p. 117.

domades tertium puerpera a perfrigeratione (et forte nocturna etiam oculorum ad lumen diutina contentione, lochiisque parcioribus) in vehementem incidit ophthalmiam perquam dolorificam: cui, præter lenes pilulas balsamicas, datum

℞. ∇^æ pluviae destill. ℥iij

TR^æ minii gtt. xij

Spir. Vin. Gallici rectificatiss. 36.

M. D. usui ut in casu præcedenti. Unde postridie mox insigne levamen ac plena sanitas est consecuta. Finito autem puerperio templum petens a nova perfrigeratione recidivam morbi pristina cum vehementia perpeffa est, in qua cum aliis opem exposcens varia cum interna tum externa nequidquam usurpasset, ab ingravescente in dies malo visum amisit nunquam forte recuperandum. Verum omnibus fere hætenus in medium allatis casibus luculentior est, quem SIBBERN apud C. TÖDE (d) literis prodidit: puer 13 annos natus tam diu ophthalmiæ fuit obnoxius, ut ea jam habitualis ferme evaserit. In progressu adeo invaluit, ut à minima luce dolor intolerabilis oreretur, palpebræ tumerent admodum rube-

(d) Medic. chir. Biblioth. I Band 3 St. 3 Abschn. p. 180. 19.

rentque, albuginea sanguinem æmularetur, ferumque acre genas excoilians proflueret. Hocce in statu Auctor ægro, post omnia quæque ante in cæsum tentata remedia, ∇^{am} vegeto-mineralem sub exhibitis sæpius catharticis adhibere cœpit, puerque intra 8 hebdomades ab ophthalmia ex toto liber evasit. Retinuit nihilo minus in brachio fonticulum, multos jam ante menses gestatum. Aliquanto inde post morbillis correptus ex oculis non plus solito laboravit (ut nempe in morbillis usuvenit), qui finito morbo perinde sanitatem adepti sunt. Imo ne fonticulo quidem posthac cōstanato ophthalmia revertit. Judicat itaque Auctor morbi diuturnitatem insolitæ irritabilitati partium affectarum fuisse tribuendam, quam remedium Saturninum sustulit. Hæc Dani. Sed nec Germanis virtutes hujus remedii sunt ignotæ; namque A. G. RICHTERUS (e) ad prævertendam post exemptionem cataractæ inflammationem „ statim post operationem oculum „ obtegit spleniolo ∇^{v} et ∇^{x} fontanæ „ æquali portione madido, quod frigidiuscule et ter omni die imponit; 4^o „ post operationem die spleniolum, quo

(e) Observ. chirurg. fascie. I. cap. II. p. III.

„ oculus tegitur, humectat liquore ve-
 „ geto-minerali GOULARDI, egregio
 „ in omni oculorum inflammatione re-
 „ medio „. Perinde J. L. SCHMUCKE-
 „ RUS (f) de reliquiis ophthalmiæ discuti-
 „ endis agens „ aqua vegeto-mineralis
 „ GOULARDI (ait) etiam est proficua;
 „ at spleniola illa humectata ne nimis
 „ arcte oculo, sed laxè tantummodo
 „ absque fasciis, applicata sunt. Præ-
 „ fero tamen aquæ dictæ miscelam ex

∇æ rosarum ℥x et

Aceti lithargyrii ℥iij;

„ quandoquidem aceto huic plus quam
 „ extracto GOULARDIANO inest acidi,
 „ atque sic magis roborans ac resolvens
 „ est. Neque minoris energiæ est se-
 „ quens aqua ophthalmica;

R. ∇æ rosarum ℥viij

Aluminis crudi ℥ij

Sacch. Saturni ʒj. M.,. Et vero
 „ etiam J. PRINGLE (g) „ in superiore
 „ mea praxi (ait) bono cum successu
 „ etiam adhibui collyrium ex aquæ ℥viij,
 „ aceti lithargyritis ʒj, aquæ vitæ Gal-

(f) l. c. p. 502.

(g) l. c. p. m. 160 nota (c).

„ licæ Zij paratum „. Neque J. JANINO (b) etiam extracti ℥ ni GOULARDIANI, indeque aquæ vegeto-mineralis parandæ ratio satis se se probavit, cujus in locum ille aliam extracti ℥ ni parandi methodum commendat, nempe

℞. Lithargyrii argent. ℥ij

Aceti vini albi opt. pint. ij.

Ollæ terreæ vitratæ indita coquantur super prunis, agitata continenter spatula lignea, donec omni aceto evaporato pasta solummodo superfuerit. Cui sensim affundantur aquæ fontanæ bullientis ℥ijv. denuoque spatula agitentur per $\frac{1}{4}$ horæ; tum stent per 24 horas, ac demum liquor clarus decantetur sub nomine extracti ℥ ni asservandus. Extractum isthoc GOULARDIANO multo est melius; nam cum posterius non satis aquæ sit miscibile ob glebular, quæ fundum petere observantur, illud hocce vitio caret: ac proinde citius etiam securiusque vim suam exserit. Præterea hacce methodo plus obtinetur extracti, nempe pintæ sexdecim, dum pinta tantum GOULARDI methodo acquiritur. Aquam parro Saturninam JANINUS ita conficit:

(b) l. c. p. 385 No 3.

℞. Aquæ fontis ℥j

Extr. sui ℥ ni gtt. jv

℥ camphor. gtt. iij. M. et dum
uti voles, miscelam concute.

E. *Mercurialia* denique supersunt memoranda. „ In diuturnioribus ophthalmiis, inquit H. BOERHAAVIUS (i), „ mercurius præcipitatus ruber mira sæpe præstat sequentem in modum adhibitus :

℞. Butyri non saliti ℥ij

Ceræ albæ ℥j

℥ = rubri ℥ss

Opii gr. ij vel iij. M. super le-
„ ni igne in mortario vitreo vel alaba-
„ strino. Includatur linteo raro, confer-
„ vetur in aqua rosarum in loco calido.
„ Quater vel 5^{es} de die premitur super
„ oculum, ut ejus particula oculum in-
„ grediatur : quod certe remedium in-
„ veteratas sæpe ophthalmias curavit „.
Sed cur, cui debeatur, dissimulat? Pri-
mus sane, quantum novi, remedii hujus
famam vulgavit J. DOLAEUS (k): „ em-
„ pyricus quidam (narrat ille) omnes
„ ophthalmias aliosque oculorum affectus

(i) l. c. v. 61. p. 55. 67.

(k) Append. ad Encyclop. med. obs. 71. p. m.

„ promiscue curavit feliciter illinitione
 „ unguenti sequentis ad tempora, super-
 „ cilia, imo et verticem applicati; un-
 „ guentum sequens nobis pro arcano
 „ communicatum est:

R. Butyri recentis ʒʒ

Præcipitati rubri ʒij

Album. ov. lativ. q. s. „.

Interea tamen chronicæ id genus et ad omnia alia remedia pertinaces ophthalmiæ videntur a latente miasmate venereo foveri, cui domando ac pessumdando solus ʒus par est. Confirmor mea hac in suspitione, quod videam hujusmodi ophthalmias quocunque alio ʒli remedio extus illito sanari (1), idque etiam ex litu partium ab oculis remotarum.

F. HOFFMANNUS (m) „ novit . . .

„ visum fere deperditum ex ophthalmi-

„ co morbo linimento ʒli genibus et

„ poplitibus illito, interpositisque bal-

„ neis aquæ dulcis, redditum fuisse „.

Neque dubium est recens nati infantis ophthalmiam ab THEDENIO (n) percuratam hujus fuisse furfuris. Si vero ulpianam ophthalmicis ʒlibus opus est, in

(1) Vide §. 49 No 3.

(m) l. c. §. 7.

(n) Vide infra in II No 2. e).

ophthalmia sane illa , quam præpostera virulentæ gonorrhœæ suppressio causat (o), maxime omnium indicantur. In hocce enim ophthalmiæ genere „ curatio exi-
„ git, inquit J. J. P L E N C K (p), ut mox
„ incipiente oculi inflammatione 1^o vena
„ secetur, ac purgans antiphlogisticum de-
„ tur : 2^o §^{us} gummosus interne quotidie
„ ad gr. 30 detur : 3^o oculus inflammatus
„ lacte mercuriali vel solutione dilutissi-
„ ma sublimati corrosivi mediante parva
„ pelvi ophthalmica vel alio vasculo
„ omni hora balneetur. Hac sola metho-
„ do ego multos feliciter curavi , et
„ cœcitatem præverti. Curatio huc us-
„ que consveta , nempe Væ Ses , hirudi-
„ nes ad oculorum canthos , vesicatoria ,
„ fonticuli , purgantia per octiduum da-
„ ta , cataplasmata discutientia ad ocu-
„ lum et emollientia balnea ad penem ,
„ ut gonorrhœa revocetur , ophthalmio-
„ xylis et conjunctivæ excisio nihil juve-
„ runt : ego multos cum hac methodo ex-
„ cœcatos vidi „. Conficitur autem lac
§ le hunc in modum (q) : „

(o) Vide §. 22 No 7.

(p) Doctr. de morbis venereis p. 82.

(q) Ibidem p. 175.

℞. ꝯ ii vivi depuratissimi ʒj

Gumm. arab. pulv. ʒss

Syrupi diacod. q. f. M. conteran-
 „ tur in mortario marmoreo sensim ad-
 „ dendo syrupum, donec omnia abeant
 „ in muçum, cui sensim adde lactis ebul-
 „ lientis vaccini ʒ viij. M. D. U. „. So-
 „ lutio vero dilutissima ꝯ = corrosivi fit (r)
 sequenti ratione:

℞. ꝯ ii sublim. corros. gr. jss

Gumm. Arab. ʒj

∇æ fontanæ ℥j. Solvantur con-
 „ terendo exacte in mortario vitreo vel
 „ marmoreo. . . . In ipsa ophthalmia
 „ gonorrhoeica hac solutione oculos elui
 „ curabam „. Nec non „ decoctum mal-
 „ væ, in cuius ℥j granum j ꝯ ii subli-
 „ mati solutum erat, quandoque cito pro-
 „ fuit „ in ophthalmia a lue universa-
 „ li (s). „ Chemosin veneream ex sup-
 „ pressa gonorrhœa natam post varia fru-
 „ stra tentata remedia bis curavit ꝯ io
 „ gummoso in lacte cocto, quo oculos
 „ mediante parvo vasculo vitreo balnea-
 „ bat, juncto simul interno ꝯ ii usu, et
 „ puellæ 4 annorum eodem balneo ab
 „ hypopio venereo penitus jam cœcæ

(r) Ibidem p. 173.

(s) Ibidem p. 84.

„ visum restituit „ PLENCK teste M. LANGE (t). Curatæ hujusmodi chemoseos casum ipse Cl. Vir (u) ita refert: chirurgus 30 annorum gonorrhœam jam inde a 10 diebus ubertim, at parvo cum dolore, fluentem quatruidi usu balsami sulph. terebinthinati in totum stitit. Paucis post diebus oculus dexter lacrymari, rubere, multumque prurire cœpit: hinc æger sumpto cathartico, tula vena, et vesicante nuchæ admoto oculum in dies magis inflammatum aqua GOULARDI lavabat. Re autem in pejus ruente 10^a a suppressa gonorrhœa die Auctorem consuluit. Palpebræ ambæ inflammatæ tumebant; adnata profunde rubebat crudæ carnis instar, magnopere dolens et elevata; cornea opacata velut in fovea tumoris adnatæ hærebat; visus fere omnis abiit; et materia puriformis gonorrhœica, qualis ex urethra fluere solet, copiosa continenter tum e bulbo tum glandulis MEIBOM. tarforum scaturiebat. Secta igitur denuo pedis vena, 6 hirudines temporibus juxta canthum externum ad-

(1) Dissert. ci. §. 40. p. 74. nota (a).

(u) Neue u. leichte Art den mit der Lustseuche angesteckten Kranken das Quecksilber zu geben (4te Auflage Vienn 1778) 24 Beobacht. p. 93. sqq.

motæ, datumque catharticum hydragogum, et postridie exhibitæ pilulæ e $\frac{x}{2}$ io gummoso nec non lac amygdalinum cum nitro et syrupo diacodii: ac omnia sine levamine; quin potius crassum leucoma obortum, dimidiam corneam opacans, ejus etiam suppurationem causavit. Hoc in statu cum æger scarificationem adnatæ respueret, atque collyrium ex aqua rosarum cum vitriolo, et alumen cum ovi albo conquassatum nihil opis tulissent, nec plus profuisset 10 dierum internus Mercurii gummosi usus, venit in mentem sequens $\frac{x}{2}$ le balneum oculo adhibere:

℞. $\frac{x}{2}$ ii vivi purissimi 3j

Gummi Arab. 3℥

Syr. diac. q. s. trita in mucum coq. in

Lactis 3 viij parumper lacque

hoc ope vitri ophthalmici quotidie quater sexiesve oculo applicetur. Unde post 24 horas tumor palpebrarum et adnatæ aliquatenus subsedit, plus etiam post 48 horas; sicque usus hujus remedii recenter semper parati in dies 10 continuatus oculum in pristinum statum reduxit, superstita tantum ampla crassaque macula flava, $\frac{1}{2}$ corneam obsidente; sed quam etiam adhibitum 4 hebdomadis unguentum ophthalmicum s. YVESII ex toto sustulit.

F. *Electricitas* ne etiam huc referenda? Ophthalmiæ casum ita percuratæ a M. PARTINGTONO sibi communicatum suppeditat T. CAVALLO (x), nimirum viro 36 annorum robusto nigra primum idola variæ figuræ ac magnitudinis ob oculos obvolitabant; secuta dein est amborum oculorum inflammatio tam celeri incremento, ut intra 7 dies visum aboleverit. Tentatis frustra in bimestre quibusvis consuetis præsiidiis æger tandem ad PARTINGTONI machinam electricam est missus. Palpebræ non nisi digitis aperiri poterant, ac tum oculi tunicæ ruberrimæ viscebantur. Dextri oculi gravius affecti visus tam erat debilis, ut eo in fenestram converso viductis palpebris æger nil nisi rubrum jubar globo igneo simile conspiceretur, reliquo conclavi adeo obscuro apparente nullum ut in illo objectum discerneret; oculo sinistro colorem figuramque vicinissimorum corporum dignoverat, sed in eorum magnitudine hallucinabatur plerumque. Atroces aderant dolores ac vagi, tempora tamen præ primis affligentes, unde interdum vehementes punctu-

(x) Vers. über die Theor. und Anwend. der medicinisch. Electricität 3. Th. p. 50, sqq.

ræ vel in occiput vel oculorum in centra excurrerant. Electricitas igitur opè instrumenti FERGUSONIANI a PARTINGTONO emendati oculis, ne scintillæ in illos eliderentur, quotidie administrabatur. Post triduum ophthalmia manifeste decrescebat, et intra 14 dies planè evanuit, pupilla tamen usque adeo contracta superstitè, ut vix tantillum illius viseretur. Protracta verò in 5 hebdomades quotidie electricitate pupilla magis magisque relaxabatur, donec æger objecta in platea discerneret. Dolores prorsus conquièverè; atque tum ab electricitate etià celsatùm est. Abhinc vèrò homo nil àmplius molestiæ sensit.

II. *Composita* quoque simplicibus haud sunt pauciora, quæ adversus ophthalmias a variis fuerunt commendata; nec facile videas pharmacuticum dispensatorium, in quo non occurreret aut aqua ophthalmica aut unguentum ejusdem nominis. Constantur hæc ophthalmica e simplicibus jam ante ut plurimum recensitis, ut ita uno remèdio applicato pluribus simul indicationibus fiat satis. Verum si ulp am, in his cèrte prùdenti opus est delectu pro vario ophthalmiæ statu; de quo cautelæ e simplicibus jam recensitis eruendæ erunt. Ex omni autem ophthalmicorum sarragine, quæ solà justum efficeret

libellum illa tantum hic sum in medium allaturus, quæ insignis aliqua probaverat experientia, reliquis suo relictis loco una cum iis, quæ CÆLSUS (y) aliique Veterum haud exiguo numero memoriæ prodidere. Non sum nescius, præstabilius esse, ut si composito id genus ophthalmico uspiam sit opus, illud pro dato ophthalmiæ casu quisque sibi conficiat potius, quam aliunde promat; sed cum horum notitia ad absolutam ophthalmiæ historiam permultum faciat, et cum luculentis haud raro ejus casibus connexa sit, his quoque hic locum dare oportuit. Horum autem ophthalmicorum alia aquosa sunt, unctiosa alia.

I. *Aquæ ophthalmicæ* sunt

a) A M A T I (z. ., Vigente (inquit ille) divite autumno satis tempe-
rato 1560 magna pars populi ophthalmiæ . . . oppressa fuit, pro qua curanda raro medici accersebantur, etiamsi difficilis esset; ita enim hominibus communis jam et familiaris morbus evaserat (et revera morbus hic paucis curatur abigiturve): perduravit autem lues hæc unum vel alterum mensem

(y) l. c. art. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

(z) l. c. Cent. 7. curat. 80.

„ . . . Ceterum siqui remediis subjicie-
„ bantur, habitis forte primo vacuatio-
„ nibus universalibus, iis topicis uteban-
„ tur: ovi aquato rosarum stillatitia mix-
„ to et sæpe linteo applicato, vel tem-
„ poris successu decocto fœnugræci tan-
„ toperè a GALENO laudato, vel hoc
„ alio potentiori:

R. Sacchari candi part. iij

Sarcocollæ part. ij

Viridis æris partem sextam. O-
„ mnia in tenuissimum pollinem redigan-
„ tur, et ovi aquato excipiantur, et ro-
„ facea paretur collyrium, et utatur,,.

b) FORESTI (a) in epidemica il-
la ophthalmia contagiosa superius (b) me-
morata „ quibus inflammatio aderat, iis
„ missio sanguinis admodum profuit; qui-
„ bus vero acriores fluxiones, purgatio
„ magis utilis fuit ex sennæ et rhab. in-
„ fuso aut pilulis lucis devoratis, tum
„ aliis ad hanc causam magis appropria-
„ tis. Ceterum inflammationibus magis
„ acrioribus hoc collyrium sequens præ
„ aliis omnibus valde commodum fuit:

R. Cerussæ

(a) i. e. observ. 4.

(b) Vide §. 24.

R. Cerussæ lotæ ʒj
 Amyli ʒvj
 Gummi tragac.
 Sarcocollæ
 Tutia ppt. aa ʒss
 Camphoræ
 Opii thebaïc. aa ʒj

▽^a rosar. q. s. F. massa usui reservanda. „ Atque hujus portio exigua „ dissolvebatur cum aqua rosarum, ubi „ usus postulabat, et collyrii instar plu- „ ma in oculum affectum stillabatur, „ præcedentibus tamen purgationibus. „ Infiniti hoc solo remedio convaluere: „ et propterea in officina paratum reser- „ vabatur. Attamen iis, qui simul ca- „ tarrho obnoxii erant, minus convenie- „ bat ob opium; alios autem, quibus „ acres fluxiones erant et oculi rubicun- „ di cum pruritu palpebrarum, egregie „ juvabat „

c) GERBEZII (c), quæ in le-
 vioribus ophthalmiis sæpe profuit:

R. Aqu. plantag.
 — — euphras.
 — — fœnic. aa ʒss
 Sief alb. s. opio ʒss

Tutiæ ppt.

Sacch. ℥ ni aa gr. v.

Vitriol. alb. gr. ij

Camphoræ gr. iij. M. F. Collyrium.

d) F. GHERLII (d):

R. ∇^x rosar. alb.

— plantag. aa ʒij

Tutiæ ppt. ʒj

Viridis æris

Salis ℥ ni aa ʒ℥

Θ* ʒj. M. F. collyrium;

quo non modo se ipsum a semestri pene ophthalmia contumaci sed plurimos quoque alios utriusque sexus ægros a trimestribus longioribusque gravissimis et ad omnia alia rebellibus ophthalmiis Auctor liberavit.

e) GRÜLINGII (e), qua virgo 20 annorum a 14 dierum ophthalmia humida acri intra biduum ad miraculum convaluit, ter eam in dies oculis ex spongiola instillando:

R. ∇^x rosarum ʒij℥

Tutiæ ppt. ʒ℥

Lapid. calaminar.

Sacch. ℥ ni aa ʒj. M.

(d) Rare Osservaz. di Medicina e Chirurgia Cent. I. Osserv. 13. 14. Cent. 2. Osserv. 10.

(e) Obs. et cur. medic. Cent. I. Obs. 51.

De hujus collyrii energia P. R. VICAT ^(f)
sequenti casu edoctus est : ophthalmia
(inquit) humida pertinaci oculi dex-
tri „ jam dudum . . . laborabat
„ . . . virgo 28 annos circiter nata, ha-
„ bitus bilioso - sanguinei ; et jam eidem
„ malo ante biennium obnoxia ab eo li-
„ berata fuerat excitato in tibia fontic-
„ culo, qui sibi postea permissus siccaba-
„ tur. Verum cum aliquot post menses
„ ex acuta febre convalesceret, rediit
„ ophthalmia ut prius, sed ita pertinax,
„ ut omnibus remediis tam internis quam
„ externis . . . tentatis resisteret, effi-
„ fonticuli fluxus de industria restitutus
„ fuisset ; qui quidem malum tolerabilius
„ reddiderat, adeo ut postea solitis ne-
„ gotiis operam dare non impediretur.
„ . . . Sic se habebat 21^a Julii ; sed
„ cum tunc per totam diem occupata
„ fuisset in lavandis ad lacum linteis,
„ ophthalmia inde adeo exasperabatur,
„ ut prorsus intolerabilis fieret, acce-
„ dente dolore acuto et tensivo temporis
„ dextri . . . Lacrymarum copia et
„ acrimonia tanta erat, ut continuo
„ pustulas in genis acriter dolentes et

(f) Delect. observ. pract. e diar. clin. append.
obs. 21. p. 256.

„ calentes excitarent. Sed . . . oportet monere , fonticulum nuper rursus
„ ficcatum fuisse. Præmitto 22^a Julii
„ validam purgationem ope pilularum
„ & lium laxantium pharm. Edinb. Præ-
„ terea . . . assiduo lavatur oculus lo-
„ tione tepida ex aqua et lacte cum pau-
„ xillo croci parata, quæ multum minuit
„ dolorem et calorem. Cicatrici a fon-
„ ticulo relictæ imponi sive emplâ-
„ strum oxycroceum ad modum pisi ef-
„ formatum. Inde jam vespere levatam
„ se sensit ægra; crus antea tumefactum
„ detumet fluente aliquo per cicatricem
„ humore, magis autem postridie, cum
„ ipse sanguis flueret. Eadem die, 23^a
„ nempe decoctum avenaceum LOWERT
„ propiis, et impero usum pediluvio-
„ rum quavis vespere præcipue repeten-
„ dum. Sequenti die 24^a . . . admo-
„ ventur 4 hirudines ad canthum exte-
„ riorem oculi. Sic multum minuuntur
„ dolor, rubor, et lacrymatio. Super-
„ venit 25^a cephalalgia, quæ maxima
„ pro parte dissipatur inspirato odore
„ salis volatilis urinosi. Tempestas ad-
„ modum pluviosa, quæ per hos dies lo-
„ cum habebat, videbatur curationis pro-
„ gressum non parum retardare, ita ut
„ 26^a dolor etiam alterum oculum occu-
„ paret, mitior quidem in utroque; sed

„ majori calore stipatus. Quare ut sanatio-
 „ nem efficacius promoverem, periculum
 „ facere volui collyrii . . . P. GRÜLIN-
 „ GII . . . Et revera ejus instillatio bis tan-
 „ tum de die repetita mire statim oculum
 „ juvit. Huic tamen auxilio non satis
 „ fidens ante cubitum curavi applicari ad
 „ nucham emplastrum vesicatorium. Po-
 „ stridie (27^a) pustulæ genæ disparue-
 „ rant remanente tantum pruritu. Nec
 „ æquivoca mihi visa est collyrii effica-
 „ cia ; nam quævis ejus instillatio post
 „ excitatum quidem primo momento a-
 „ cutum dolorem oculum omnino nota-
 „ biliter levabat, et ita emendabat, ut
 „ 29^a mane jam abessent sordes et gra-
 „ miæ, quæ hucusque palpebras noctu
 „ agglutinaverant. Sic pergendo sanatio
 „ ad ultimum gradum perfectionis 5^a
 „ Augusti perducta est.”

f) HEISTERI (g) familiares a-
 quæ ophthalmicæ sunt sequentes :

R. Aquæ flor. cyan. ʒ℥

—— plantag. ʒj

℥ camphorat. ʒj

Lap. calam. pp. ʒj

Vitriol. alb. gr. ij. M. Applice

tur tepide ope splenioli 3^a quaque hora. Hac aqua puellum trimum a vehementi palpebrarum præsertim circa majorem canthum inflammatione lacrymalem fere fistulam minitante liberavit, propinato simul cathartico e syr. rosar. sol. ℥j, ♂ jalapp. gr. xii, et aqv. euphras. ℥j pro biduo binis dosibus sumendo. Alteri vero Senatori (b) vehementem ac dolorificam ophthalmiam sequentibus profligavit: Væ Se larga in pede præmissa, subjunctoque cathartico, præbuit ♂es resolventes antiphlogisticos cum infuso perinde resolvente leniterque diaphoretico; externe vero adhibuit aquam ophthalmicam

℞. Aquæ euphras.

—— plantag. aa ℥jss

—— rosar. ℥ss

℥ vulgaris ℥ij

Lap. calam. ppt. ℥ss

Opii puriss. gr. iij

Essent. croci gtt. x. M. pro

eluendis crebro tepideque oculis. Denique omni bihorio e ℥ camphorati ℥jss aliquid illinendum erat circum oculos, temporibusque infricandum. Atque sic æger convaluit, ubi 8 dies. his remediis fuisset ulus. Meminit porro (i) et ado-

(b) Ibidem No 580.

(i) Ibidem No 492.

lescentis 14 annorum, cui mica lapidis illapſa in oculum corneæ vulnuſculo inſiſto adnatæ cauſavit inflammationem cum uberi continuoque lacrymarum profluſio. Huic præter doſin cathartici e ḡ jalapp. ḡj cum Ḥri vitriolati gr. v. ſequens etiam collyrium præſcripſit:

℞. Aquæ fœniculi

—— plantag.

—— roſar. aa ḡj

Album, ovi Noj. M. conquaſſando adde

Lap. calaminar. ḡḡ

Vitriol. albi gr. iij

Opii gr. ij. M. D. pro oculo ſæpius colliniendo, et linteo puro octuplicato deſuper alligando. Convaluit illæſo proriſ viſu,

ff) HOFFMANNI (k), qui „efſicax et ſecurum (ait) hoc collyrium:

℞. ∇^x fl. ſamb. ſclopetar. aa ḡj

Camphoræ gr. iij.

Sacch. hni gr. x. M. quod cum „linteo triplicato crebrius tepide oculis „applicandum. Quando autem nimis „mordax adeſt acrimonia, mucilaginem „corticis medii ſlorum tiliæ, item ſem. „cydoniorum cum aqua roſarum, addi-

(k) l. c. curat. §. 2.

„ to pauxillo croci sine vel cum opio
 „ admoveere expedit „.

g) JANINI (l) ∇^a *ophthalmica*
resolvens:

R. Vini generosi albi ℥j

Aloes succotr.

Tutiae ppt.

Croc. metall. aa ʒj. Indita lagenæ probe obturatæ agitentur per $\frac{1}{4}$ horæ, tum bimestre in sole digerantur identidem agitata. Efficax est remedium in ophthalmia, palpebrarum obstructione, ulceribus maculisque corneæ, visumque roborat, si mane, meridie, et vesperi gtt. iij. ij capite reclinato in majorem canthum immittantur, palpebræque dein alternis vicibus aperiantur et claudantur, ut sic liquor, tota bulbi superficie diffluat. Aliam quoque magis compositam (m) aquam describit, in cujus confectiōem omnia pene ab omni ævo usurpari solita adversus ophthalmiam remedia simplicia cum multis aliis adjectis congestit. Sed ne quid nimis!

h) C. LAHME (n) „ degit hic
 „ (refert) Hafniæ vir septuagenarius, qui

(l) l. c. p. 388 No 7.

(m) Ibidem p. 389 No 8.

(n) Misc. nat. cur. dec. 3. ann. 7. Obs. 135.

„ ferme quotannis ophthalmia laborat,
 „ quam Væ Se, purgantibus, vesicato-
 „ riis, sudoriferis, et instillatione V
 „ camphorati feliciter hætenus curatam
 „ notavi. Enim vero frustraneo cum
 „ successu citata remedia omnia et sin-
 „ gula nuperrime in usum vocata adeo,
 „ ut peior magis quam melior contuma-
 „ cissimæ ophthalmiæ status esset, alter-
 „ utro præ primis oculo pessime se haben-
 „ te, ut omnimoda facultatis videndi
 „ privatio quoad hunc oculum metuenda
 „ foret. Ast ecce . . . quidam . . .
 „ consultus sequens remedium suggerit;

R. Aquæ fœniculi ʒ ij

—— chelidon. maj.

—— fragorum

—— rosar. alb. aa ʒ j

qus valerian.

—— sal. ammon. aa ʒ ʒ M . . .

„ Hanc MRam non oculis instillare instar
 „ aliorum collyriorum, sed saltim pal-
 „ pebris . . . illinere, easque quasi la-
 „ vare eadem jubet; nimirum Ophthal-
 „ micus clausis oculis serâ nocte valvu-
 „ las (palpebras) collyrio dicto probe
 „ lavare solet. Die subsequente mo-
 „ lestissimis symptomatibus ophthalmicis
 „ pene sublatis ex voto luminibus ocu-
 „ lorum utitur clarissimis denuo et pel-
 „ lucidis „

i) RIDLEY aqua ophthalmica in superioribus (o) jam descripta est.

k) s. YVESII (p) collyrium
pro ophthalmia cum ficcis marginibus:

R. Aquæ rosar.

plantag. aa ʒjv

Salis ammoniaci

— b ni aa gr. vij. M. D. pro
elucendis quotidie bis terve oculis. Com-
mendat illud etiam ROSENSTEIN (q);
sed salia ad gr. jv tantum addit.

1) SYDENHAMI *laudanum liquidum*. Opii externum in ophthalmia usum jam passim in formulis variis videre fuit. Verum solo puroque laudano liquido seu TRA thebaica dispensatorii Londinensis collyrii instar primus J. WARE (7) coepit uti, quam admodum efficacem est expertus. „ Bis terve per diem (inquit „ ille) gtt. ij. iij illius pro varia symptomatum vehementia oculo instillo, „ a queis primum insignis oboritur dolor cum illacrymatione uberi; sed „ queis post pauca minuta sensim evani-

(o) Vide §. 41. No 1.

(p) l. c. Cap. 6. art. 4. p. m. 196.

(g) Reise u. Hausapoth. No 19. p. m. 75.

(r) Auserl. Samml. zum Gebrauch pract.
Aerzte 6 Bände 2 Stück p. 366. fqq. .

„ dis dolores insigniter remittunt. Sub-
„ inde primæ mox guttulæ inflammatio-
„ nem magnopere minuunt, et usu hujus
„ remedii numerosæ ophthalmiæ pessimæ
„ ad omnia alia remedia multis hebdomadis
„ imo mensibus usurpata rebelles ante
„ 14 diem sanatæ sunt. Hic tamen suc-
„ cessus non ubique sperandus est; quip-
„ pe qui alias serius eveniat; imo obti-
„ gere mihi casus, in quibus laudanum
„ per principia sine ullo levamine adhi-
„ bitum fuerat: verum ophthalmiæ hæ
„ ut plurimum erant recentes, splen-
„ dentibus adhuc oculis et multum ab
„ admittæ luce dolentibus; ut ut vel in
„ his etiam quandoque fructuose fuerit
„ adhibitum. Unde non nisi periculo fa-
„ cto de successu certiores reddimur, a
„ quo præter brevem dolorem nihil por-
„ ro molestiæ propullulat. Quod si igi-
„ tur TR^a thebaica nil opituletur, dif-
„ ferre ejus usum oportebit, quoad va-
„ cuationes aliaque idonea præsidia mor-
„ bosam irritationem infregere. Quam-
„ vis autem opium TR^a hujus res sit
„ primaria; utilitas tamen ejusdem in
„ ophthalmia soli illi tribui nequit: si-
„ quidem sæpius saturatam ejus solutio-
„ nem aquosam frustra tentavi, quæ do-
„ lores licet aliquo pro tempore lenive-
„ rit, inflammationis tamen vehemen-

„ tiam non minuit. Fetus calidus e de-
„ coctis capitibus papaveris aliquatenus
„ profuit, imo leviozem morbum ali-
„ quando plane sustulit; at gravioribus
„ in casibus iteratus etiam illius usus
„ frustra fuit, donec TR^a thebaica ei
„ jungeretur. Ut itaque liqueret, cui-
„ nam potissimum TR^a parti successus
„ curationis tribuendus sit, una etiam
„ alterave vice idem cum vino Hispani-
„ co in oculum instillato periculum feci;
„ at vehementior inde quam a TR^a diu-
„ turniorque dolor sequebatur sine ullo
„ levamine. Cum igitur nec opio nec
„ vino seorsim, sed simul tantum junctis
„ curatio peragatur, ab longo jam tem-
„ pore solam TR^{am} thebaicam in usum
„ duxi, eamque cum ante dictis adhibi-
„ tam cautelis velut remedium in quali-
„ bet ophthalmia omnique ejus gradu
„ (ut ex dandis deinceps historiis ube-
„ rius patebit) perquam efficax com-
„ mendare ausim. Quod modum, quo
„ TR^a thebaica externe ad ophthalmiam
„ usurpata utilem se præbet, attinet,
„ excitat illa, ut omnis alius stimulus,
„ oculo immissa ardorem ac dolorem.
„ Oculo tunc inspecto numerus ac ma-
„ gnitudo vasorum inflammatorum insi-
„ gne augmentum cepisse conspiciuntur,
„ simulque lacrymatio oboritur vehe-

„ mens, ac forte etiam humorum e vasis
„ in omnem bulbi superficiem exhalan-
„ tibus secretio; quæ omnia procul du-
„ bio vino aromatibusque TR^æ thebaicæ
„ debentur, et quorum ope (ut reor)
„ motus humorum augetur, ac forsitan
„ parvæ quædam obstructions referan-
„ tur. Unde lacrymatio a TR^æ stimulo
„ effecta cœu immediata ex affecta parte
„ vacuatio eam aliquatenus deplens et
„ onere molesto liberans considerari po-
„ test. At vehemens illa irritatio ne-
„ quaquam est diuturna, qua cessante
„ oculus continuo quieti redditur, tunc-
„ que videre est, vasa rubra et exiliora
„ evasisse, et numero multo, quam ante
„ remedii applicationem fuerint, pau-
„ ciora. Doloris hæc mitigatio et con-
„ quiescentia qua vacuationi ab opio
„ causatæ qua specificæ ejus vi anodynæ
„ et irritabilitatem destruenti est tri-
„ buenda „. Demum hæc ipsa Auctor
„ compluribus in medium allatis observa-
„ tionibus confirmat, quarum in prima (s)
„ mulier 26 annorum post abortum incidit
„ mense Novembri 1778 a perfrigeratione
„ in vehementem catarrhum cum magna
„ oculi sinistri inflammatione. Post varia

(s) Ibidem p. 375.

collyria in cassum adhibita hirudines ter intra paucos dies ad tempus lævum admotæ inflammationem minuerunt, quam tamen nova perfrigeratio ita revocavit, ut brevi pristinam ad vehementiam venerit. Post 6 hebdomades TR^a rhebaica primum adhiberi cœpta, quo tempore tanta jam adfuit inflammatio, ut minima lux dolores causaret acerrimos, corneam simul dextro e latere insigni obsidente jam macula, pupillæque partem tegente. Dolor inde gravis abortus pauca post minuta desit, insigni post se relicto morbi levamine. Die pōstero ægra melius habuit, inflammatioque imminuta videbatur: idcirco TR^a iterum eo cum successu adhibita, ut abhinc nullo alio fuerit opus remedio. Post triduum ægra oculum denuo potuit aperire; inflammatio intra 14 dies ex toto evanuit, cornea ita inclarescente, ut mulier tantum denuo videret, quantum ad consveta negotia satis erat. Porro (t) puellæ decenni Augusto mense vehementi oculi dextri ophthalmia citra manifestam causam correptæ facta V^x S^o, multaque interne remedia data, et oculo aqua vegeto-mineralis applicata; sed omnia frustra.

(t) Ibidem p. 377.

Post aliquot hebdomades accitus WARE palpebras reperit adeo tumentes, ut status oculi nullatenus posset explorari. Ocyus ergo TR^a thebaica modo ante dicto in oculum instillata cum solito dolore confecuto; at non dum lapsa hora dolores multo evasere leviores, quam inde ab initio jam fuerint. Porro eadem adhuc vespera hirudines etiam tempori applicatæ, locoque dein vesicans admotum, Postridie TR^a thebaica denuo instillata latum iterum præbuit effectum. Die 3^o puella ægrum oculum jam eatenus aperire poterat, ut objecta videre valeret; sed lux tantos adhuc movebat dolores, ut oculos citissime iterum ægrota clauderet. Oculo velum semper prætensum, puellæque dies aliquot obscuro in loco morandum fuit. Totis 3 hebdomadis TR^a semel quotidie usurpata insigni semper levamen attulit, emendationemque constantem, ut ut lentam, efficiebat. Abhinc in 4 hebdomades TR^a alternis tantum diebus adhibebatur, queis elapsis puella tam bene videbat, ut ne velo quidem amplius opus foret. Deinceps vero oculus mane ac vespèri eluebatur dilutissima $\frac{1}{2}$ solutione, maculæque corneam obsidenti vitrum pulveratum inspergebatur. His cunctis remediis puella ultra annum eo cum fructu utebatur,

ut et macula inde minor sit facta, et visus multo quam ante evaserit acutior. Tertius (u) ægrorum auriga fuit, qui Aprili 1778 in itinere vehementi e febre lectum petere coactus, eam diaphoreticis biduo post insigniter quidem minuit, sed magnus repente dolor dextrum oculum invasit, per encephalon ad occiput usque excurrens, cui inflammatio valde levis se junxit. Væ So facta, datum catharticum, ac pone aures vesicantia applicata, identidemque temporibus 5 hirudines admotæ, et oculus decocto capitum papav. fatus; at omnia exiguo cum levamine. Post bimestre ita exactum dolor sensim sponte remittebat, verum visus oculi hujus in totum periit. Finiente ergo Junio ad labores suos rediit æger, ad finem usque Augusti uno tantum oculo usus. Tum vero noctu repente dolor pristinus ægrum ante oculum invasit cum summa inflammatione et pupillæ dilatatione et marginis ejus imi inæqualitate. Væ So facta, capitique unguentum anodynum illitum, at citra levamen. Auctor itaque consultus illico laudanum instillavit, vesperique 3 hirudines tempori dextro admotæ, ac deinde vesicans

(u) Ibidem p. 378.

vesicans ibidem applicatum. Postero mane datum eccoproticum, et meridie jam pene omnis abfuit dolor. Posthac ergo quotidie mane ac vesp̄ri eluebatur oculus dilutissima solutione $\text{℥} \frac{1}{2}$, et per 14 dies semel quotidie laudanum instillatum, post quos dolor omnis, inflammatio vero maximam partem, ita disparuere, ut homo post 3 hebdomades ad suos redierit labores. Juvenis item femina (x) jam inde a variolis circiter ante 6 annos toleratis continuum fere ac terebrantem lævo in oculo dolorem patiebatur cum exigua vel nulla inflammatione sensibili. Oculus hic jam ante variolas identidem inflammatione tentabatur; sub variolis autem pustula in cornea pupillæ adversa enata est, profundam in abitu post se relinquens cicatricem, propter quam ægrotæ objecta velut trans nebulosum vitrum conspiciabatur. Post varia potissimum interna remedia necquidquam usurpata, Januario 1779 dolore solito acrius vexante TRæ thebaicæ aliquid oculo est immissum: dolor inde auctus brevi desit, ea simul post se relicta quiete, quali ægra jam dudum ante non fruebatur:

(x) Ibidem p. 380.

idcirco per 14 dies usus TRæ quotidie factus ita profuit, ut abhinc recidiva haud amplius acciderit. Perinde (y) matrôna ad 53 annos nata ante 15 circiter annos ex gravi capitis dolore cum variarum corporis partium efflorescentia obfuscauit, simulque vehemens oculum lævum ophthalmia corripuit, amplam post se relinquens corneæ maculam, quæ etsi oculi hujus visum non ex toto sustulit, inutilem tamen oculum effecit. Octobri 1778 ophthalmia rursus gravis eundem invasit oculum magno cum dolore, plenaque ejus cum cœcitate: quæ ubi jam aliquot hebdomades durarunt, accitus WARE utroque in oculo reperit maculas, queis læva pupilla tota tegebatur. Instillato in dextrum oculum laudano tantum paucis post minutis levamen adfuit, ut et in alterum oculum instillationem ægra exposceret. Postero die ambobus in oculis ophthalmoxysis ope spicarum hordei instituta cum dolorifica fuit admodum, tum omnino etiam inutilis. Abhinc ergo laudanum quotidie tota hebdomade usurpatum sub ejus finem symptomata magnopere minuit; verum ob non levem adhuc inflammationem super-

(y) Ibidem p. 380. sqq.

stitem cuilibet tempori 3 hirudines ad-
motæ, ac ibidem postea vesicantia appli-
cata, et 3^o quovis die catharticum da-
tum: ceteroquin in quotidiano TRæ
theb. usu tres septimanas pergebatur;
queis elapsis ægra eatenus jam recupera-
vit visum, ut sine duce per haud exi-
guum spatium ire posset. Propter præ-
sentaneum semper ab usu TRæ levamen
ægra post discussam jam ophthalmiam ni-
hilo minus ejus instillationem in bimestre
adhuc continuavit: unde, ubi ab ulteri-
ori illius usu destitit, macula corneæ si-
nistre manifeste minor tenuiorque facta
observabatur, ita ut ægra objecta, si e
latere intuebatur, oculo illo dignoverit;
dextri autem oculi visus erat integerri-
mus. WATHEN quoque tres hanc in
rem casus Auctori suppeditavit, nem-
pe (z) infans quidam mox a morbillis
1752 toleratis corneæ leucoma cum oph-
thalmia contraxit. Ista jam levior erat,
jam gravior; illud vero ita sensim crevit,
ut evoluta anno visui multum obstaret.
Cum ante jam et vena rufa fuerit, et
vesicans admotum, et multa cathartica
sanguinemque depurantia usurpata, WA-
THEN solum laudanum liquidum adhi-

(z) Ibidem 3 Stück p. 388. sq.

buit; quod etsi multum doloris excitaret, ut ille metuërit, ne præmaturus ejus usus esset, postridie tamen infans oculum aperuit, lucemque tulit, quod jam a longo tempore nequiverat; unde per 14 dies instillato quovis mane laudano omnis inflammatio discussa est, leucomaque imminutum. Posthac vero varia collyria cum admisto semper laudano adhibita, et quoties vel dolere oculus vel inflammari levissime etiam occiperet, solum de novo laudanum instillatum. Sicque lapsis aliquot mensibus leucoma ex toto decessit, oculusque Novembri 1754 cum altero sanitate certavit. Porro (a) feminae 12 annos utriusque oculi ophthalmiæ a frigido balneo contractæ obnoxia frustra in binis Angliæ nosocomiis ultra triennium ope quæsita demum etiam WATHEN post innumera alia in cassum tentata laudanum instillare cœpit cum tam præsentaneo levamine, ut ægra intra breve tempus et lucem tulerit, et homines dignoverit. Cumque ante laudani usum cornea valde fuisset incrassata, ab illo extenuabatur etiam; et semel quotidie eodem per aliquot menses ita adhibito femina usque adeo profecit in

(a) Ibidem p. 339. sq.

melius , ut minimæ acui filum indere posset. Abhinc quidem interdum levior adhuc ophthalmia recurrebat ; sed laudani semper instillatio graviolem ejus gradum præpediebat. Quantopere autem cavenda sit laudani in oculum in vigore morbi recentis, non dum satis vacuato corpore, instillatio, WATHEN sequenti casu (b) est edoctus : homo 35 annorum Febr. 1779 valida ac perquam dolorifica ophthalmia correptus eam sedula negotiorum procuratione effecit graviolem ; cujus 3^o die instillatum oculo laudanum summum unius fere horæ dolorem causavit sine ullo subsecuto levamine. Eodem ergo vespere tempore dextro primum hirudines dein vesicans admotum non sine fructu ; siquidem lateris hujus dolores per aliquot abhinc menses ambo tempora vexantes, multum inde sunt imminuti. Die 4^o iterata laudani instillatio pristinos creavit dolores ; quod ipsum etiam a tertia instillatione accidit sine levamine. Sinistro ergo tempore etiam et hirudines et vesicans applicarum dolores sustulit , persistente nihilo minus eodem inflammationis

(b) Ibidem p. 387.

vigore. Hinc saturata opii solutio aquosa ad gtt. iij oculo immissa etsi dolorem fugasse videbatur, veheméntia tamen inflammationis ab ejusdem usu tota licet hebdomade continuato nihilo evasit minor. Quocirca tertium dextro tempori hirudines et vesicans appositum, hocque facto quartum tentata laudani immissio jam haud majorem, quam in aliis ægris, dolorem causavit, quem paucis post minutis solenne levamen secutum est; ac per 10 inde dies continuatus ejusdem mane et vesperi usus discussa omni inflammatione ægrum pristinae restituit sanitati. Idem hic Cl. Vir testatur (c) TRam thebaicam perquam esse efficacem etiam in inflammatione discutienda, quæ operationes oculares (d), ac præsertim extractionem cataractæ, nec non corneæ in hypopii curatione incisionem, consequi solet. Plures etiam de laudani adversus ophthalmiam efficacia casus WARE in psorophthalmia (e) narrat; sed quos brevitatis causa hic silentio præterire oportet.

(c) Ibidem p. 391.

(d) Vide §. 79.

(e) l. c. p. 407. sqq.

m) A. THONERI (f) in observationibus complures MRæ utiles reperiuntur. Sic mulier „ per aliquot septi-
 „ manas ophthalmia gravissima laborans,
 „ aliis in cassum admotis, cum rubore
 „ et palpebrarum agglutinatione: R. M.
 „ P. sine quib. ʒß aur. coch. aa ʒj.
 „ cum ▽^a bet. F. pil. xxvij. Proposui ve-
 „ ficatorium; reculavit obsequium.

R. Tutia ppt.

Sarcoc. aa ʒj

Vitriol. Rom.

Sumach aa ʒß. lig. in nodul. inf. in

Aqv. rosar.

—— plant.

—— fœnic. aa ʒj. calef. et expr.
 adde

Lap. calam. ppt. ʒj. F. collyr.
 „ cum penna instill. Cum subitaneo ad-
 „ jumento, ut nullis aliis (fuerit) opus
 „ præfidiis. Femina plebeja dextri oculi
 „ rubedine longe lateque serpente cum
 „ insigni calore et ardore detenta, alio-
 „ rum consiliis vanis,

R. Aquæ rosarum

—— plantag. aa ʒij

—— solani ʒj

(f) Obs. med. Lib. 2. Cap. de affectib. ocul.
 Obs. 1. sqq. p. 116.

Vitriol. albi ℥j. Dis. et col. adde
 Tutie ppt. ℥j. M. cum linteolo
 „ imbuto et expresso appl. Intra pau-
 „ cos dies cum admiratione, qui malum
 „ illud prius conspexerunt, libera eva-
 „ sit. Quidam juvenis plebeius lippitu-
 „ dine oculorum cum insigni tumore,
 „ ut eos aperire non posset, ultra se-
 „ mestre molestatus, multorum præfidiis
 „ frustra adhibitis,

℞. Aquæ plantag.

—— rosar.

—— fragor. aa ℥j

—— solani ℥ss

Vitriol. albi ℥ss

Camphoræ gr. ij. Dis. et col. adde

Tutie ppt. ℥jss. M. pro collyrio.

„ Brevi restitutus est. Juvenis 24 anno-
 „ rum . . . naturæ melancholicæ, oph-
 „ thalmia sat gravi infestatus ex deflu-
 „ xione serosorum humorum ℞. M. P.
 „ aur. coch. sine quib. aa ℥j cum ∇.
 „ beton. F. P. xxvij. Post usus ♂^e ster-
 „ nut. per nares attracto: ℞. ♂ sternut.
 „ ℥ij, spec. diamb. ℥j, major. ℥ss. F.
 „ ♂. Tandem ordinata ∇^a ros. cum
 „ Vitriol. alb. et tutia ppt. exterius ap-
 „ plic. cum optato successu „

n) *Viennense dispensatorium* (g) duplicem aquam ophthalmicam descriptam habet, sapphiream aliam, aliam cum sapone. Sapphireæ formula est:

R. ∇^x Ψ vivæ mediocris cum

∇^a chelidoniæ

— euphrasiæ

— cyani

— rosarum aa q. s. factæ ℥. vj.

⊙* electi 3 vj. Stent per noctem in vase cupreo; mane filtretur, et sapphiri in formam colorata servetur usui. Alterius vero confectio hunc in modum fit:

R. Vitrioli albi 3℥

Saponis Veneti 3iij

∇^x font. ℥ij. Coq. in olla ad remanentiam ℥j℥, refrigerescat, filtretur, et servetur usui.

2. *Unguenta ophthalmica* porro celebratiora sunt

a) *Nihili albi*, quod secundum dispensatorium Viennense (b) ita conficitur:

R. Nihili albi

Tutiæ ppt. aa 3j

Corall. r. ppt.

(g) Classe 2. p. 20.

(b) Classe 17. p. 232.

Matr. perl. ppt. aa ʒss

Camphoræ ʒj

Axung. porc. mundatæ ℥j. M. in
Ungv. De quo M. GERBEZ (i) „oph-
„thalmiis (ait) levius laborantibus sæ-
„pe solum unguentum nihili ad oculos
„satisfecit, ante somnum palpebrarum
„commissuris inunctum „. Et V. RIED-
LINUS (k) „a certa (inquit) tutiæ
„specie, quæ in officinis nihili albi no-
„men sortita est, unguentum, cujus in-
„grediens cum tutia primum est, de-
„nominatur, unguentum sane, quod
„(quidquid etiam nonnulli recentiorum,
„quibus omnia Veterum inventa imme-
„rito sordent, contra hoc et alia oggan-
„niant) in hunc usque diem ut com-
„mendetur, meretur, dum quæ ei vires
„ophthalmicæ adscribuntur, egregie ex-
„ferit, et in oculorum ardore et deflu-
„xionibus quin et incipiente inflamma-
„tione haud frustra adhibetur. Sic cum
„ego nuper cum dictis malis aliquam-
„diu confictatus fuisset, et nec absti-
„nencia a vino, nec aqua rosarum, nec
„cataplasma ex mica panis, lacte, cro-
„co, et pomo cocto confectum, nec

(i) l. c.

(k) Lin. med. ann. I. Decembr. 26 p. 455 sq.

„ decocta laudatissima herbæ theæ et
 „ coffee (alia enim interne, in primis
 „ purgans, adhibere negotia non per-
 „ mittebant) quicquam conferrent, di-
 „ ctum unguentum in usum ducere cœ-
 „ pi, et quidem cum tam laudando ef-
 „ fectu, ut prima statim nocte non ut
 „ alias conglutinati quasi oculi fuerint,
 „ sed eosdem sine dolore et molestia ape-
 „ rire potuerim, et postea etiam . . .
 „ continuata hujus unguenti applicatione
 „ per pauculos dies omne malum ces-
 „ sauerit,,.

b) P. FRAUENDORFFERI (1):
 „ puella elegans 5 annorum pustulis
 „ compluribus ac rubore oculorum non
 „ sine cœcitatis periculo vexata mihi
 „ (ait Auctor) curanda oblata est. Huic
 „ præter medicamenta purgantia, vesi-
 „ cantia, hirudines, cucuphas exsiccan-
 „ tes, &c. etiam multa alia topica oculis
 „ applicanda præscripsi, sed sine fru-
 „ ctu: tandem unguentum sequens, quod

℞. Butyr. rec. sine sale in

Aquaeuphrag. aliquoties loti ʒjss

Tutiæ ppt. ʒjss

Camphoræ ʒj. M.

„ ordinavi, et palpebris non tantum illi-
 „ niri, sed etiam cum petiolis applicari

(1) Misc. nat. cur. dec. 3. ann. 5. obs. 19.

„ præcepi. Et ecce! intra paucos dies et
 „ rubor et pustulæ cum omnium admiratio-
 „ ne disparuerunt, et ægra plus quam per
 „ $\frac{1}{2}$ annum optima sanitate est usa. Post-
 „ ea tamen propter errores, ut opinor,
 „ in diætâ commissos idem morbus denuo
 „ rediit, pustulis non tantum album sed
 „ et nigrum oculorum copiose obsiden-
 „ tibus, ac toto fere albo intenso ru-
 „ bore obducto cum venulis turgidis et
 „ non sine dolore. Ego vocatus præ-
 „ misso per 4 continuos dies laxativo ja-
 „ lappato idem unguentum repetii, et
 „ rursus quidem cum fructu ut supra,
 „ et ægra bene habuit quasi per 9 men-
 „ ses: tandem una iterum pustula in al-
 „ bo oculi est suborta cum aliquali ru-
 „ bore; sed mox iterum methodo mo-
 „ do laudata sublata. Et jam fere ab in-
 „ tegro anno ægra nihil mali est passa „

c) J. JANINI (m):

R. Axung. porc. mund. ʒss

Tutiæ ppt.

Boli Armen. aa ʒij

ʒ ii præcip. alb. ʒj.

Axungię ter prius aqua rosarum lotæ re-
 liqua in $\frac{1}{2}$ em tenuissimum redacta admi-
 ſcentur in mortario vitreo. Hujus mi-

scelæ molecula pisum minus æquans mane ac vespere in oculum indenda est quotidie usque ad finem morbi; cujus virtute varices quoque oculi, maculæque corneæ abolentur, ulcera ejusdem ac tarsorum sanantur, palpebrarumque tumor abigitur.

d) PENOTI apud R. LENTILIUM (n):

℞. Butyri rec. cum ∇ ros. ʒij bul-
lit. ʒij

Tutiæ ppt. ʒijss

Camphoræ ʒij

Æruginis gr. xij.

Camphora subtilissime prius cum tutia trita miscetur dein butyro, additur postmodo ærugo trita, et omnia probe aliquamdiu agitata colantur transprimunturque per sericum. Unguentum hoc arcanum PENOTO fuit, et Pastor quidam magnum sibi ope ejusdem nomen insignis ophthalmiatri comparavit. Illinitur illo mane ac noctu palpebra frigide, et lentis magnitudine in canthum majorem oculi inditur.

e) SAINT-YVESII apud J. C. A. THEDEN (o), qui „ in ophthalmia

(n) Misc. med. pract. P. 3. p. 108.

(o) Neue Bemerk. u. Erfahrung. zur Bereicherung der Wundarzn. u. Arzneygel. I Th. 26 Abschn. p. 192.

„ (inquit) cum purulentia balsamus oph-
 „ thalmicus ruber s. YVESIO arcanus
 „ habitus in mille casibus a me præcipuæ
 „ efficacix est observatus, cujus confi-
 „ ciendi modum hic vulgo :

℞. Butyr. rec. insulsi ℥ iij

Ceræ albæ ℥℥

℥ ii præcip. rubr. ℥ iij℥

Tutix ppt. ℥ j

Camphoræ gr. XLV

Ol. ovor. ℥℥. M.

„ Butyrum primum liquatur, ut omne
 „ caseosum sub refrigeratione separetur,
 „ tum ejus ℥ iij cum cera liquantur igne
 „ leni, queis coeuntibus miscetur præ-
 „ cipitatus in pollinem redactus ac tutia,
 „ ultimumque camphora ovorum oleo
 „ soluta adjicitur, intimeque omnia mi-
 „ scentur. Hujus balsami quod spinthe-
 „ ris caput æquat, quotidie m. et v.
 „ oculo infricatur ad perfectam usque
 „ convalescentiam. Inpterygiis maculis-
 „ que corneæ prorsus eximia utilitate
 „ eum adhibui, quod cum numerosa ex-
 „ empla evincere possent, unicum hic
 „ suffecturum arbitror. Infans mox, ubi
 „ in lucem est editus, in utriusque o-
 „ culi incidit ophthalmiam, quam pro-
 „ cul dubio obstetrix digitorum pressione
 „ sub partu causaverit. In 7am usque
 „ hebdomadem cataplasinata frustra fuere

„ adhibita ; cornea utriusque oculi vi-
 „ lebatur alba scleroticæque similis, nisi
 „ quod in meditullio una parumper ad-
 „ huc cœrulescens esset. Interrogatus,
 „ quid opinionis de ægro haberem ? eam
 „ ob adjuncta quædam diserte edicere
 „ prohibebar ; negavi hypopion esse, at
 „ staphyloma posse inde enasci asserui : ali-
 „ is hypopion videbatur. Curæ meæ cre-
 „ ditum infantem intra 18 hebdomades ope
 „ hujus balsami pristinæ restitui sanitati.
 „ Abhinc ambo oculi, quantum ad corneam
 „ transparentem, optimo in statu sunt ; at
 „ in uno oculo punctum album meditul-
 „ lio nervi optici insidens superstes man-
 „ sit, nullo remedio delendum,,. Huic
 „ balsamo non multum ab simile est unguen-
 „ tum, quod Ill. A. STÖRCK (p) multum
 „ eo in casu, ubi dolore et inflammatione im-
 „ minutis oculi tamen rubri adhuc, turbi-
 „ di et opaci manent,, prodesse ait :

℞. Butyr. recent. ℥j

‡ Tutia ppt. 3j

— vitriol. cyprii gr. vj

℥ ii præcip. rubr. gr. xxv. M.

exactissime, ut fiat unguentum.

(p) Præcept. med. pract. T. I. p. 83. 84. &
 formula 50.

f) HANS SLOANI (q) linimentum ophthalmicum :

℞. Tutix ppt. ʒj

Lap. hæmatit. ppt. ʒij

Aloes opt. ppt. gr. xij

Margaritar. ppt. gr. jv. optime
singulis in mortario
marmoreo lævigatis
et mixtis adde

Axung. viperar. q. f. pro linimento, quotidie m. & v. ope penicilli ex pilis fibrinis compacti palpebris parumper hiantibus applicando. De cujus efficacia Auctor „ postea . . . quam . . . „ hoc remedio experimenta fecissem (inquit), diffiteri non poteram, quod „ ejus me compositio in sui admiratio- „ nem converterit; quoniam ejus effe- „ ctus tam erat certus et indubius, ut „ si vel 100 hominibus applicatum esset, „ ne in uno quidem ejus falleret effica- „ cia, excepto illo casu, ubi oculis la- „ boratur malo venereo læsis, utpote „ quibus in cassum semper applicari so- „ lēt . . . Hoc linimentum multum opis „ tulit illis, quorum oculi membrana „ quadam opaca tecti erant, quam post „ se

(q) Act. nat. cur. Vol. 10. append. No 7.
p. 287. sqq.

„ se relinquunt cicatrices ulcusculorum in
„ tunica transparente . . . Ist hoc malo
„ affecti adeo privabantur visu, ut du-
„ ce usi ad me accesserint; sed post ali-
„ quod temporis intervallum visus illis
„ tam feliciter restitutus est, ut sine
„ duce viam ad ædes meas ducentem in-
„ venire potuerint. Linimentum istud
„ non tantum egregie conducit in enar-
„ ratis casibus, sed etiam in doloribus
„ oculorum nimis, quibus cephalalgia
„ excitari solet. Ita bene memini cu-
„ jusdam matronæ, quæ cum eam pri-
„ mum inviserem, effrænatis ejusmodi
„ oculorum et capitis correpta erat do-
„ loribus, ut tanti mali impatientissima
„ intra unum nycthemeron laudani li-
„ quidi (si recte memini) gtt. 50 ternis
„ vicibus sumeret; per meum vero lini-
„ mentum tam illa quam alii multi ab
„ hoc malo liberati sunt sine adhibito
„ opio „ &c.

g) J. V. WILLII (r). „ Vitri-
„ cus meus . . . (narrat ipse) cum Ba-
„ fileæ studiis litaret, tanta corripieba-
„ tur ophthalmia atque epiphora, ut lu-
„ minis impatiens horrendos inter dolo-
„ res in calamitosa obscuritate non pau-

„ cos menses transigere fuerit coactus.
 „ Nihil inexpertum a medicis relinque-
 „ batur, intactum nihil; sed tanta erat
 „ vis morbi, ut nulli auxilio cedere
 „ voluerit. Tandem cum lumina tantum
 „ non occæcata methodice curari re-
 „ spiciissent, ad empirica transitum est.
 „ Commendatum inter alia hoc etiam
 „ unguentum, quod

R. Ungv. nihili et

— de tutia aa ʒij

Margaritar.

Corall. rubr.

Oculor. 69

Tutiae, omnium ppt. aa ʒj

Camphoræ gr. vj

Fol. O et D aa No jv. M.F. Un-

„ gventum hora decubitus lentis magni-
 „ tudine cantho oculi majori indendum,
 „ et infra palpebras allinendum. Dici
 „ non potest, quam cito unguenti hujus
 „ usu violentia morbi laxabatur, adeo
 „ ut manu fere abstergi malum videre-
 „ tur, gaudeatque hodiedum vir laborio-
 „ sissimus satis acie oculorum acuta; quæ
 „ tamen manifeste obtunditur, quoties
 „ per biduum aut triduum abstinet illi-
 „ nitione hujus charismatis, e vestigio
 „ redux, ubi repetitur. . . Feci ex-
 „ perimentum ita: addidi sacchari ʒi
 „ ʒj, et camphoræ pondus duplicavi,

„ sensque manifeste effectus promptio-
„ rem felicitatem. Quin præmissis uni-
„ versalibus prædictum unguentum in
„ ophthalmia cognatisque affectibus tem-
„ pestive adhibitum usque adeo raro fe-
„ fellit spem, ut Colmariae, Ratisbonæ,
„ Viennæ, &c. quam plurimis in pre-
„ tio habeatur, felicissime illo et fre-
„ quentissime tum ad præservandum tum
„ curandum uti soliti,,. Periculum quo-
„ que huius remedii fecit in ophthalmia
R. LENTILIUS (s): „ hanc in puero 8
„ annorum (ait ipse) cum intenso rubo-
„ re et inflammatione coniunctam, et
„ per aliquot jam septimanas durantem;
„ vesicatoriis, cucurbitulis scarificatis,
„ aliisque multis irritis prorsus conatu ap-
„ plicatis, unguento solo ophthalmico
„ WILLII brevi tempore sanavi; quod
„ frequenter etiam in similibus casibus
„ nunquam non sine multo levamine ad-
„ hibere consuevi: atque adeo non pos-
„ sum non commendare . . . Ubi solum
„ id noto, quod . . . folia . . . ☉ et
„ ☿ aliquando omittere soleam,,. Atque
hæc iam remediis ophthalmicis cum sir-
plicibus tum compositis finem imperant.
Multa quidem circa legitimum eorum

(s) l. c. P. I. p. 206.

usum superius in medium allata sunt; nihilo tamen minus aliquæ hanc in rem adhuc

§. 73.

Cautelæ supersunt adjiciendæ, nimirum

1. *Tempus* iis utendi non nulli religiose observandum esse voluere; quandoquidem id a Veteribus accepissent, qui fronti tantum vicinisque locis aliis topica primo die adhibentes oculum ipsum tangi, præsertim vero bulbum, vetuere. Sic CELSUS (1) „ protinus autem (inquit) primo die croci p. j et farinæ „ candidæ quam tenuissimæ p. ij excipere „ oportet ovi albo, donec mellis crassitudinem habeat, idque in linteolum „ illinere et fronti agglutinare, ut compressis venis pituitæ impetum cohibeat . . . In ipsum vero oculum primo die, nisi immodica inflammatio est, „ nihil recte conjicitur; sæpe enim potius concitatur eo pituita, quam minuitur. At 2° die gravi quoque lippitudini per indita medicamenta recte succurritur, ubi vel jam sanguis missus „ vel alvus ducta est, aut neutrum ne-

(1) l. c. art. 1. p. m. 281. sq.

„ cessarium esse manifestum est,,. Unde etiam F. HOFFMANNUS (u) „ ego (ait) „ potius auctor sum, ut seponantur topica omnia ante 3^{um} diem, et antequam convenientia interna jam usurpata, exceptis solis sacculis ex pargoricis et demulcentibus compositis; „ postea vero omnium optima, quæ supra commendata,,. Et profecto haud vana est cautela hæc, ut ophthalmicorum usui vacationes necessariae aliaque interna idonea semper præmittantur; quandoquidem his pro eo ac par est anteprestitis vel ipsa etiam repercutientia minori cum periculo per errorem adhibentur; iisdem vero neglectis ne illa quidem, quæ morbi ratio postulare videtur, momentum sunt factura, imo et interdum obfutura etiam.

2. *Modus applicandi* perinde circumspectionem sæpe haud exiguam deposcit, præsertim dum ipsam remedii indolem vel intendere vel alienam efficere valet. Sunt autem in applicatione ophthalmicorum sequentia vel maxime animadvertenda:

a) *Calidene an frigide applicanda?* „ Ut quæ auribus injiciuntur, in-

(u) l. c. cautelar. §. 6.

„ quit AMATUS (x) calida esse oportet,
„ ita oculis applicata frigida ut sint, ne-
„ cesse est,, : idque a multis postea te-
nebatur. Contra autem Vratislavienses (y)
calida semper esse ophthalmica voluerunt,
poscente id experientia, et F. HOFFMAN-
NUS (z) „ vulgatissimus . . . error est
„ (ait.), oculis frigida esse amica, cali-
„ da autem inimica. Valet hoc ipsum
„ et verissimum est, si oculi sani sunt,
„ ubi eos aqua frigida lavare consultius
„ est, quam calida; quoniam hæc fibras
„ relaxando oculos ad fluxiones dispo-
„ nit, frigida autem poros tunicarum et
„ parietes vasorum roborando nimium
„ sanguinis et humorum fluxum abarceat,
„ et ita oculos serenos, vividos et sanos
„ servat. At vero hæc regula haud pro-
„ cedit in oculorum constitutione, quæ
„ est præter naturam, minime omnium
„ autem in eorum inflammatione, quæ
„ nomine venit ophthalmiæ, ubi frigi-
„ dorum usus perniciosissimus est . . .
„ Vidimus hac ratione non semel sed
„ creberrimis vicibus ab instillatione col-
„ lyriorum frigidorum in oculos æstu

(x) l. c. Cent. 5. curat. 59.

(y) Histor. morbor. Vratisl. p. m. 14.

(z) Diff. cit. §. 7.

„ inflammatorio dolentes turbidos factos
„ fuisse oculos, et inflammationem in-
„ tensius auctam, adeo ut intra paucos
„ dies penitus visus fuerit obscuratus,
„ imo plane in defectu expertæ medi-
„ cinae abolitus (a). Nam quemadmodum
„ in omni inflammatione non sine fun-
„ damento exterius applicata frigida et
„ constringentia, incrassantia cordatiores
„ medici acriter rejiciunt: ita cur talia
„ admittere velimus in oculi inflamma-
„ tione, cui vasa longe magis tenera
„ capillaria insunt, quam in aliis par-
„ tibus, equidem non pervideo; causa
„ enim et ortus omnis inflammationis est
„ infarctus sanguinis vel humorum in
„ vasis propter obstructionem in vicinis
„ vasculis; jam autem obstructionem ni-
„ hil magis firmat, quam actu frigidum,
„ dum fluiditatem liquidis succis demit,
„ eosque ipissos et crassos reddit „.
Hæc ille: et ne exemplo desit, (b) „ vir
„ quadragenarius (inquit), sanguineo-
„ cholericus, subito affectus est dolore
„ oculi ac rubore, quem sibi accidisse
„ putavit a festuca minima ferri sub ictu
„ clavi cum malleo in oculum saliente;

(a) Vide §. 17. et histor. II.

(b) Med. rat. syst. l. c. obs. 3.

„ licet nihil omnino de ea in oculo
„ compareret. Ipse igitur ad tollendam
„ passionem oculo subinde instillavit col-
„ lyrium frigidum ex aquis ophthalmi-
„ cis: quo quidem calor et ardor de-
„ linitus, sed bulbus turbidus et obscu-
„ rus comparuit, ac omnis visus periit.
„ Me hinc vocavit in auxilium, qui ne
„ cœcitas ingrueret perfecta, obviam
„ ivi hisce: sal volatile ammoniacum sic-
„ cum oleo majoranæ imbutum crebrius
„ naribus admove, fronti et tempori-
„ bus emplastrum ex gummi elemi, a-
„ nimæ, mastiches, olei nucistæ aa ʒij,
„ camphoræ et bals. Peruv. aa drachma,
„ applicare, et frequentius ac copiose
„ bibere jussi infusum seminis fœniculi
„ cum aqua. Quibus intra aliquot heb-
„ domades oculus recepit splendorem et
„ visus aciem,,. Verum si quæ supe-
rius (c) de duplici inflammationis resol-
vendæ modo dicta sunt, memoria tenea-
mus, facile apparebit, ophthalmica jam
calida (si nempe laxanda sunt vasa) jam
frigida (si reperiendum) esse oportere;
neque hodie aquæ frigidæ in cu-
randis inflammationibus usus amplius
ignoratur.

(c) Vide §. 69. sq.

b) *Terrea* vero, siqua ophthalmicis admiscuntur, ita in pollinem prius redacta ac lævigata esse oportet, ut nihil irritationis mechanicæ in oculis producere queant. Quod quia ars efficere potest, non est, cur eos audias, qui similia ab oculis ob mechanicam irritationem quam longissime remota esse volunt; secus ob eandem rationem et aqua vegeto-mineralis rejicienda esset, in qua Saturninorum perfecta solutio sine ullo terreo sedimento obtineri neutiquam potest.

c) *Adhæsiō arcta* ophthalmicorum ad oculum canē pejus et angve est devitanda, omnisque ab illis pressio oculi cavenda; ne acrium lacrymarum fluxu cohibito tarfi et cornea exulcerentur, &c. Hinc vel sine fasciis topica oculis imponenda, vel si abesse nequeant, quam laxissime sunt applicandæ.

d) *Supino capite* sub eorum applicatione sæpe opus est, ut humor medicatus e cataplasmate vel fotu vel collyrio ipsa sua gravitate oculum subeat, ibique diutius immoretur; secus cito inde elapsus non multum virium suarum oculo impertietur. „ Ceterum cum sit „ satis clarum, medicamenta, quæ oculis „ imponuntur, non tam diu inhære „ re, donec vires suas exferant, optant „ dum omnino, ut tandem

e) „*Vascula* illa vitrea instar cucurbitularum oculi orbitæ respondentia ab H. F. A B A Q V A P E N D E N T E (d) excogitata in usum trahantur; nam liquore repleta oculo commode admodum veri poterunt: iis etiam cum fructu SILVATICUM, CAPIVACCIIUM, aliosque (e) esse usos novimus, inquit Vratislavienses (f).

3. *Delectus* denique remediorum duopræ primis respicit, videlicet ut hujusmodi sint, queis

a) *Pelluciditas oculi* non pessumdetur. „In curatione, inquit H. BOERHAAVE (g), in primis attendendum est, ut canales vel vasa maneant pellucida, quod in aliis inflammationibus fuscumque deque habetur. Verum hic maximopere attendendum est, an medicamenta applicanda vasa opaca reddant? Requiritur ergo, ut canales in ea consistentia, ut antea, et liquida simul pellucida maneant. Hoc obtinetur cavendo a nimio calore nimiaque siccitate; calor enim nimius coagulat partes

(d) De chirurg. operat. Cap. de suffusione p. m. 22.

(e) Conf. J. SCULTET, animam. tab. 8. fig. 10.

(f) Hist. n. orb. Vratisl. p. m. 63.

(g) l. c. §. 64. p. m. 57.

„ tenuiores dissipando, vasaque contra-
„ hit et exsiccat, ut nihil nunc affluere
„ possit. Hinc attendendum est, num
„ oculus forte nimis caleat; et si hoc fit,
„ refrigerari debet: quod fit, oculum
„ tepidis fovendo, ne exsicceetur, et
„ continuo aqueis calidis humectando.
„ Interne quoque assumat continuo po-
„ tum diluentem aquosum. Quando ea
„ a primo morbi initio observantur, va-
„ sa sæpe pellucida manent, „ Porro
ophthalmica pro varia inflammationis im-
minutione ita perinde varianda sunt, ne

b) *Dispositio ad recidivas* oculo
iis inducatur. Accidit id tum vel ma-
xime, dum remittente vehementia inflam-
mationis nihilo minus emollientium usui
justo diutius insistitur; sic enim ophthal-
mia evadit diuturna, et si in suppuratio-
nem non abit, relinquit certe post se
oculum ad recidivas perquam habilem,
cui dispositioni præpediendæ, imo et in-
terdum abolendæ, optime adstringentia
ac roborantia mature opponuntur. Sane
omnia ophthalmica composita ante enu-
merata vel maxime in diuturnis jam oph-
thalmiis profuisse, ob adstringentia, quæ
habent, referuntur.

CAPUT IX.

STIMULI EXTERNI ABLATIO.

§. 74.

Inter procatarcticas ophthalmiæ causas ostensum est, quam variæ et illæ sint, quæ extus oculo applicatæ eum inflammatione lædere soleant (*b*); quæ nisi mature inde rursus auferantur, frustra sunt omnia alia cum interna tum externa hactenus memorata remedia; persistente enim causa effectus quoque perennet, est necesse. Unde recte A. G. RICHTERUS (*i*) „quoties (inquit) sponte ophthalmia ob-
„oritur, sollicite semper inquirendum
„foret, num externum id genus corpus
„occasionem ei præbuerit? Complures
„novi casus ophthalmiarum contuma-
„cium, diuturnarumque, et pro imme-
„dicabilibus jam habitarum, ablato de-
„mum hujusmodi corpore hactenus in-
„observato intra paucos dies persanata-
„rum „. Luculentum hujus rei exem-
plum præbet J. B. MORGAGNIUS (*k*) in

(*b*) Vide §. 16.

(*i*) Chirurg. Biblioth. 3 Band. 1 Stück No 4.
P. 89.

(*k*) l. c. No 23.

hæc verba: „multo levior causa diuturnior
„rem et periculosiorem ophthalmiam attulit
„affini meo . . . Nemo enim fuit medicorum
„aut chirurgorum, quibus oculum inspectandum homo sane
„remedium non ita amans tandem ostendere coactus
„est, quin procul dubio censeret, inflammationis vi
„obortum jam ulcus in cornea tunica, ejusque curandi
„causa alius aliis cum internis tum externis
„auxiliis metu obtemperantem jam ægrum diu, sed in cassum
„fatigaret. Denique casu factum est, ut chirurgus
„animadverteret, incipere ex ulcusculi fundo
„nescio quid non nihil exstare squamulæ instar;
„quod cum tentantis specillo facile obsequeretur,
„integrum exemit. Exemptum dum curiosius
„contemplatur, alam esse agnoscit minoris muscæ,
„et sane esse, omnes qui tunc et postea viderunt,
„sine ulla dubitatione, ut in re evidentissima,
„confirmarunt. Tum enim vero in memoriam rediit . . .
„sibi inflammationem haud ante incepisse, quam
„musca in oculum forte involasset, quam ibi inter
„palpebras celerius, ut fit, injecta manu occidisset,
„atque abjecisset; totam vero non abjecerat: ala
„enim restitans sic ad corneam se applicuerat,
„ut illinc sine chirurgi ope

„ prorsus dimoveri et reglutinari non
 „ potuerit. Sua igitur adhæsione irritan-
 „ do eiusmodi moverat inflammationem;
 „ ut circum turgentibus fibrillis, et mi-
 „ nimis vasculis hæc ulceris labella, ala
 „ autem illa crassiusculo humore obsita,
 „ per ipsumque transpecta sordidum ul-
 „ ceris fundum mentiretur. Certe ipsa
 „ detracta continuo omnibus in melius
 „ versis cito ac facile, nulla relicta ci-
 „ catrice, convaleuit oculus „. Triplex
 autem stimulus talis externus esse potest,
 videlicet aut peregrinum quoddam cor-
 pus oculo illapsum (ut pulvis, insectum,
 micæ lapidum aut metallorum, &c.),
 aut excreſcentiæ in interna palpebrarum
 facie enatæ contactu suo bulbum oculi
 perpetuo irritantes, aut denique cilia in
 bulbum conversa: Pro multiplici itaque
 horum varietate varia etiam opus est me-
 thodo ad eorum stimulum auferendum.

§. 75.

I. TUMORES *exstirpandi*, si fieri po-
 test; methodo maxime idonea. Pulchrum
 hujus rei exemplum ad posteros dedit
 F. H. L. MUZELL (1): viro 30 annis

(1) Medic. und chir. Wahrnehm. 2 Samml.
 Cas. 7. p. 29. sqq.

majori diuturna ophthalmia sanguinea et ad plurima quæque remedia contumaci laboranti, bono cetera habitu, nullaque peculiaris acrimoniæ indicia præbente, prædito, cum rursus cathartica cum aliis internis remediis porrecta, acris applicata vesicantia, iteratæque Væ Ses, et aquæ ophthalmicæ adstringentes inflammationem nullatenus mutassent; continuo insolitæ causæ suspicio est oborta, et inspectis curatissime oculis cum magnus adnatæ rubor observaretur, multo is etiam major inferioris erat palpebræ, quæ fere holoserici instar tumebat: quod quia mirabile insolensque erat, filo tenuissimo interna inferioris palpebræ inversæ superficies explorabatur, repertaque est tota hæc membrana (quæ est adnatæ continuatio) degenerasse in minutissimos rubros boletos lato capitello, at pedunculo tanto brevioris, qui tenuitate cum filo sericeo tenerrimo, qualium plurima collecta vulgare filum constituunt, certabat. Quo viso continuo unus horum pedunculorum filo tenuissimo constringebatur: unde cum cito decidisset sine ullo dolore aliove symptomate consequente, ceteri alius ex alio prehenso tenaculo capitellis exscindebantur sensim forcice; ablatisque sic universis adhibebatur collyrium adstringens, cujus ab usu æger

intra breve tempus pristinam recuperavit sanitatem.

§. 76.

II. *ILLAPSA excimenda.* Peregrinorum quidem in oculos illapforum expulsionem ipsa molitur natura, idque binis vel maxime modis, nempe aut concitato lacrymarum profluvio, quo sæpe inde eluuntur, aut levi circum circa suppuratione inducta, quæ pure obvolutum ejusmodi corpus foras urget, aut ita saltem a loco, cui ante æquabiliter adhæsit sine ulla uspiam eminentia, attollit, ut prehendi jam avellique facile possit (*m*). J. WARE (*n*) vidit aliquoties ferri scorias in oculum fortuito illapasas aliquot ibi dies hæsisse; donec facta circum circa illas suppuratio loco illas movit, ut sponte deinde exciderint. Verum cum prior horum naturæ conatuum sæpe sit ad id efficiendum insufficiens, posterior autem non semper absque majore oculi periculo expectari possit, anteverteendus arte erit, quæ varia hanc in rem

(*m*) AETIUS Tetrab. 2. Serm. 3. Cap. 19.

(*n*) l. c. p. 358.

rem auxilia, ut apud AETIUM (o) ac FORESTUM (p) videre est, suppeditat, ut sunt

a) *Collyria* eluentia; inviscantia; lacrymas provocantia. Sic P. FORESTUS (q) „ cui pulvis in oculum (ait) „ cadebat; fluxionem quamdam et rubedinen. in conjunctiva tunica postea incurrebat. Jussi; ut oculum aqua dulci aspergeret frequenter; ac in oculum sæpius projiceret lac muliebri ab ubere statim mulctum: iisque præsidiiis adhibitis mox pulvis exhibat, et a fluxione ac rubedine æger liberatus est. Perinde (r) „ cum divideretur lignum, „ pars ligni impacta est in oculum filiæ cuiusdam mulieris. Ipsa autem statim cepit rubrum ovi; cerussam, et oleum rosatum; ac in circuitu totius oculi posuit hanc mixtionem loco defensivi; er intra oculum aquam albuminis ovi. Alii vero commodè imponunt aquam albuminis ovi una cum lacte muliebri et aqua rosarum. Sed hæc priori medicamento sanitati restituta fuit; ac

(o) l. c. C. 16.

(p) l. c. Lib. II. Obs. 16. cum scholiō.

(q) Ibidem in Obs.

(r) Ibidem in schol.

„ pars ligni hoc modo exfiliit. Lapidis
 „ sculptori frustum lapilli in oculum il-
 „ lapsum est. Factæ sunt fomentationes
 „ ex mollitivis, ut malva, anetho, scæ-
 „ nigr. meliloto per biduum; postea fuit
 „ tütia cum saccharo candi imposita: et
 „ ab hoc tædio evadens sanus factus est „
 At „ si calx viva in oculum inciderit,
 „ inquit AETIUS (s), aqua quidem et
 „ lac infusa attrahunt et exurunt; verum
 „ albumen ovi infusum vim ustoriam
 „ calcis obtundit, et eo adhuc magis
 „ oleum rosaceum „ Interdum diligens
 constansque oculi humectatio plus quam
 omnia alia adminicula efficit, ut in casu
 G. F. HILDANI (t) accidit: „ fabro cui-
 „ dam ferrario . . . in officina sua oc-
 „ cupato frustulum scorix cum impetu
 „ ad oculum profiliens ipsi infixum fuit
 „ profundius. Ego post dies aliquot ac-
 „ cersitus ex inferiori parte pupillæ,
 „ ubi iris apparet, scoriam reperi; ma-
 „ cula enim nigra minima et literam
 „ hanc o vix excedens belle ibi conspici
 „ potuit. Dolor aderat maximus et fere
 „ continuus præcipue clauso oculo; tunc
 „ enim inferior palpebra ad scoriam fer-

(s) l. c. Cap. 17.

(t) l. c. Cent. 4. Obs. 17.

ri, quæ aspera erat, confricabatur:
,, quapropter noctu in primis ipsum ex-
,,ercebant dolores. Ceterum quamvis
,, omnem diligentiam omnemque indu-
,,striam adhiberem, nec tantum semel,
,, imo ter quaterve rem aggrederer, ex-
,,tractionemque tentarem, oleum tamen
,, et operam perdidi; tam exigua enim
,, erat scoria, tamque profunde infixa,
,, ut neque vossellis neque quovis alio
,, modo extrahi posset: cum autem acuto
,, aliquo instrumento illam propter con-
,,tinuum motum oculi effodere ausus
,, non essem; et dolor simul et inflam-
,,matio de die in diem augeretur, ne-
,,gotium naturæ et medicamentis com-
,,mittere statui. Quapropter semel at-
,,que iterum expurgato corpore pilu-
,,lis capitalibus collyrium anodynum et
,, non nihil repellens applicui, venam in
,, brachio secui, et cucurbitulas scapulis
,, et nuchæ admovi; sed parum cum fru-
,,ctu; dolor enim et macula illa nigra
,, aut potius infixa scoria in eodem re-
,,manserunt statu. Tandem sequenti
,, applicato sacculo macula intra paucos
,, dies ablata et dolor sedatus fuit, pe-
,,nitiusque corvaluit vir iste. Sacculi
,, autem descriptio hæc est:

℞. Rad. alth. minutiss. incis. et contus. ʒj

Flor. et fol. betonicae

———— ——— euphras.

———— ——— chamom.

———— ——— meliloti aa M. ʒ

———— rosar. odoriferar. M. j.

Sem. fœnugræci contusi ʒʒ.

„ Incidantur minutim, misceanturque o-
 „ mnia, et fiant sacculi intersuti. . . .
 „ Horum sacculorum singulis diebus unum
 „ lacte vaccino recenter mulcto coque-
 „ bam, et calide applicabam ter quater-
 „ que in die „. Magis etiam insignis est
 casus E. GOCKELII (u): „ auriga Die-
 „ tenheimensis 45 annum agens cum cla-
 „ vum rotarium . . . malleo rostrato al-
 „ tius infingeret, micā quædam disrupta
 „ ferrea lentis magnitudine in oculum
 „ sinistrum infra iridem profiliit, ac se
 „ inter tunicam conjunctivam et cor-
 „ neam insinuavit, iisdemque tenacissi-
 „ me adhæsit, quam nec ipse patiens nec
 „ loci balneator eximere potuit. Reli-
 „ cta igitur hac ferrea in oculo portiu-
 „ cula, postpositis exinde conceptis do-
 „ loribus, merces et materias vestibiles
 „ variis cœli et aeris injuriis expositus

(u) Gallieinii mœd. pract. Cent. 2. Obs. 80.

„ per 16 integras septimanas (quod sum-
 „ me mirandum) non sine singulari et
 „ continuo oculi incommodo ex uno lo-
 „ co ad alterum vexit, donec præter-
 „ lapso hoc tempore patientem ingens
 „ et ferme intolerabilis capitis et oculi
 „ dolor cum totius corporis horrore fe-
 „ brili, membrorum lassitudine, siti, et
 „ animi deliquiis invasit, ac in lectum
 „ conjecit. . . . statim indicavi, quod
 „ nisi ferrea hæc oculo inhærens por-
 „ tiuncula extrahatur, nulla patientis
 „ restitutio speranda sit: quapropter hu-
 „ juscemodi heterogenei extractionem
 „ sine omni mora per expertum chirur-
 „ gum tentandam esse. Ne autem hic
 „ patiens interim remediis destitueretur,
 „ aquam ipsi cephalicam ex ∇^a cerafor.
 „ nigr. 4 cordialib. et confortante offici-
 „ nali perlata, admixtis obus C.C. ppt.
 „ corall. r. ppt. matr. perl. ppt. syr. ru-
 „ bi idæi et julapio rosar. paratam, nec
 „ non syrupos refrigerantes pro julapio,
 „ ac sequens collyrium præscripsi:

R. Tutiz ppt. 3j

Sief alb. sine opio 3j

Camphoræ gr. iij

Sacch. candi alb. 3j

Aquæ euphras.

— — fœnic.

— — rosar. aa 3j. F. MR^a oculo

K k 3

„ tepide instillanda , ac intinctis linteo-
„ lis externe etiam oculo applicanda.
„ Cum itaque patiens dicta remedia ac-
„ cepisset , balneatorem incolam , ut ea
„ sibi legitime applicaret , accersivit :
„ qui ægrotum supinum super scamno
„ collocavit , et ante adhibita remedia
„ subtilissima spatula squamulam hanc
„ ferream iterato eximere tentavit, eam-
„ que aliquantisper ad latus movit ; sed
„ ex formidine , ne altius oculo infige-
„ ret, illam reliquit, et aquam ophthal-
„ micam oculo guttatim instillavit , ac
„ ut conjux idem post suum abitum repe-
„ titis vicibus faceret , adhortatus est :
„ cui admonitioni hæc patientis uxor mo-
„ rem gessit , aquam diductis palpebris
„ infudit , ac intincto in ea linteolo ocu-
„ lum exterfit , et sic forte fortuna fer-
„ ream hanc per 4 menses cruciantem
„ scoriam minutissimam , molestissimum-
„ que aculeum ex oculo inscia deturba-
„ vit : quo facto patiens confestim me-
„ lius habuit , et se ab hoc diro hospite
„ liberatum esse autumavit. Ne autem
„ in opinione sua falleretur , altero sta-
„ tim die . . . me cum chirurgo exer-
„ citatissimo G. RIEDLINO . . . ad se
„ . . . transportari curavit, ubi inspecto
„ oculo nil nisi relictum vulnusculum
„prehendimus ; quapropter dictam a-

„ quam ophthalmicam oculo identidem
 „ instillavimus , externe linimentum sim-
 „ plex SCULTETI linteamento indu-
 „ ctum imposuimus , et huic stuppam
 „ cannabinam ovi albumine cum alumine
 „ crudo conquassato imbutam applicavi-
 „ mus. Quibus adhibitis . . . omnia
 „ symptomata remiserunt , dictusque pa-
 „ tiens cum gaudio proprio et domesti-
 „ corum convaluit „. Alter illapsa exi-
 gendi modus est

b) *Globulosæ moleculae* solidæ ocu-
 lo palpebram inter ac bulbum immissæ,
 quarum ibi volutatione illapsum aliud
 corpus ab adnata avellitur, forasque eli-
 ditur. Unde lapilli cancerorum vel hor-
 mini semen, et id genus alia huc faciunt.
 G. F. HILDANUS (v) „ sine periculo
 „ . . . et parvo negotio (ait) arenam et
 „ pulverem ex oculis (uti ego non raro
 „ expertus sum) expurgant oculi can-
 „ crorum fluviatilium, sive lapilli, qui
 „ in capitibus cancerorum inveniuntur.
 „ Sinistra itaque manu elevanda est pal-
 „ pebra, dextra vero circumspēcte et
 „ blande unus ex lapillis imponendus est,
 „ mox oculus claudendus, et quocunque
 „ modo fieri poterit, excitandus est

(v) 1. c. Cent. 2. Obs. 13.

„ somnus. Si vero æger in peregrina-
„ tione fuerit, oculum strophio obve-
„ lando colliget; sic enim lapillus non
„ excidet oculo, nisi prius ipso expur-
„ gato. Idque absque dolore et incom-
„ modo fieri affirmare ausus sum . . .
„ Alii gr. j seminis ormini sativi oculis
„ non sine fructu imponunt; quando-
„ quidem semen hoc oculis et vilui ma-
„ xime prodesse, oculosque a segmentis
„ et pulvere expurgare experientia com-
„ probatum est „.

c) *Magnes* artificialis etiam per-
magnæ hic utilitatis est, dum nimirum
ferri scoria tam exilis oculo illisa est, ut
in albugineam velut immerisa nec instru-
mentis apprehendi nec ulla alia methodo
loco moveri possit. Admoto tunc ma-
gnete attracta, eique adhærens feliciter
saepe educitur. Prima id tentavit G. F.
HILDANI (x) conjux: „ rusticus qui-
„ dam (narrat ille) . . . cum chalybem
„ apud mercatorem emeret, optimumque
„ eligere vellet, et proinde (ut fieri so-
„ let) frustum contra frustum allideret,
„ scintilla ipsi in illam corneæ partem,
„ ubi iris conspicitur, profiliit, ibidem-
„ que membranæ firmiter inhæsit, id-

(x) Ibidem Cent. 5. Obs. 21.

„ que non sine dolore maximo. Adstan-
„ tes cum per plures dies frustra omnem
„ adhibuissent diligentiam, dolores quin
„ etiam atque inflammationes mirum in
„ modum adauctæ fuissent, venit ad me.
„ . . . Tunc prius instituta optima vi-
„ ctus ratione, et evacuato corpore tam
„ per pharmacum quam Væ Sem (est
„ enim plethoricus), primo instrumen-
„ tis et quidem diversis vicibus et per
„ dies aliquot tentavi, an scoriam ex-
„ trahere possem; sed adeo erat exigua,
„ ut instrumentis illam extrahere non li-
„ cuerit. Quapropter aliam viam inire,
„ et beneficio sacculi (y) . . . illam ex-
„ trahere constitui; sed iterum oleum
„ et operam perdidi. En uxor mea re-
„ medium longe aptissimum excogitat;
„ interim enim dum ego ambabus mani-
„ bus palpebras aperio, illa magnetem
„ oculo, quam proxime æger id sufferre
„ potuit, admovet. Id cum aliquoties
„ et quidem repetitis vicibus fecissemus
„ (non diu enim lucem, qua tamen hac
„ in re summopere opus fuit, sufferre po-
„ tuit), tandem scoria ex oculo nobis
„ omnibus videntibus ad lapidem profi-
„ liit. Postea applicato collyrio anody-

(y) Vide præced. a).

„no brevi convaluit „. Cum autem subdat HILDANUS polum magnetis attrahentem prius esse detegendum, cavendumque, ne repellens polus oculo obvertatur, qui ferri scoriam tanto plus oculo impelleret; MORGAGNIUS (z) cautela hac minime opus esse, nisi forte scobs ferri magnetis vi fuisset prius imbuta, recte commonuit. Neque aliis postea idem experimentum secius cecidit; sic enim et hominis cujusdam BÜCHHOZ (a) meminit, cui in officina fabri ferrarii versanti mica ferri in oculum infiliit. Post frustra adhibita varia ad eandem educendam, demum nescio quis naturæ scrutator consilium dedit, ut magnetis periculum faceret; qui prope admotus moleculam ferri ad se allicuit, oculumque ita liberavit. „Illud autem hortor, inquit „J. B. MORGAGNIUS (b), ut modicum carum virium magnetem, eumque „caute ac sensim magis, ut licere intelligas, magisque admoveas; ne forte ferrum arctius hærens nec dum „tempestiva tractione ejus, cui infixum

(z) De sedibus et causis morbor. Epist. 13.
No 22.

(a) Neueste Heilkunde 19 Haubst. No 1.
p. 257. sq.

(b) l. c.

„ est , partis dolores augeat ,. Cui cautela sequens ejusdem observatio (c) occasionem dedit: „ molitore . . . ad me „ adducto , ut quid vitii in cornea ex „ gravi ophthalmia oriri inciperet , edocerem. In illius medio exiguam maculam animadverti circuli forma , albidam in ambitu , in centro subnigram. Cum sciscitarer , quid causæ dedisset inflammationi , ipse autem inchoatam diceret , ex quo sibi molam malleo exasperanti quædam in oculum refiliverant , quæ tamen continuo eluisset; suspicatus , quod erat , infixam aliquam lapidis vel potius ferri particulam in cornea , ubi erat macula , restitisse , indeque ortam , quæ male haberet , inflammationem , magnetem modicarum virium semel atque iterum propius admovi , et subnigrum illud , de quo antea dictum est , e macula jam non nihil exstare continuo intellexi , propterea quod in claudendo oculo superior palpebra asperi aliquid eo in loco percipere incipiebat. Sed sive illa ferreæ scorix figura esset , ut profundiore partem haberet paulo latiore , sive potius imbutæ humori.

(c) Ibidem No 21.

„ bus turgentesque corneæ fibræ, quam
„ inter initia remissuræ fuissent; postea
„ arctius complexæ infixam particulam
„ retinerent; non licuit eo quidem die
„ extrahere, imo cessandum potius cen-
„ sui, ex quo homo ait, quoties magnes
„ admoveretur, toties oculum quasi rapi
„ magnetem versus non sine doloris in-
„ cremento sentire. Igitur imperatis,
„ quæ hæcenus omissæ fuerant, alvi sub-
„ ductione et sanguinis detractione, tum
„ quæ dolorem mulcendo fibras leniter
„ laxarent, oculo adhibitis non ita mul-
„ to post simul cum lacrymis excidit sco-
„ ria: qua elapsa facillime omnia eva-
„ nuere. Nisi autem per se excidisset,
„ magnetem rursus experiri in animo
„ erat, firmato per aptum aliquod in-
„ strumentum oculo, ne moleste adeo si-
„ mul cum scoria attraheretur „.

d) *Anthelmintica* vermiculos ex oculis evocantia. J. N. PECHLINUS (d)
„ de oculis . . . nec dum scio (ait),
„ an observatum sit, inflammationem eo-
„ rum minutulis deberi insensilibusque
„ vermiculis. Committebatur curæ meæ
„ puella 8 annorum, quæ a 5 inde annis

(d) Observ. phys. med. Lib. 2. Obs. 35.
p. 300.

„ morbo laboraverat oculorum; cilia
„ semper rubebant, et prurigine mole-
„ stissima manuum quærebat temperamen-
„ tum; sed neque tutum ab illis auxi-
„ lium, quando magis magisque effer-
„ vescere serum, inque oculos descen-
„ dere ad manus frictionem gestiebat.
„ Quare omni ope allaboratum, ut pru-
„ rigo hæc tolleretur prohibito humoris
„ ferosi influxu; sed in cassum, quando
„ nec a calidis nec frigidis levare se sen-
„ tiebat. Neque enim vel vitrioli deli-
„ quatus ovi albo liquor, aut saturni sal,
„ neque etiam quæ alias vermiculos qui-
„ busvis e partibus evocant, sacchari
„ candi pollen aut mella, quorum unum
„ illud fucorum ad miraculum usque ab
„ aniculis celebratur, quidquam pro-
„ fuere. Mater autem pertæsa eorum,
„ quæ hæctenus a medicis exhibita erant,
„ vetulæ cujusdam consilium sequi sta-
„ tuit. Svadet ergo, ovum ut coquant
„ ad duritiem, inde albumen ejus findant
„ medium, et exempto vitello cavum
„ albuminis, ut adhuc calet, oculi ap-
„ plicent convexo. Nec mora quin sta-
„ tim prurigo deficeret, nidoreque ovi
„ et fumo evocata animalcula minutarum
„ lendum instar albumen ovi occupa-
„ rent. At cum tenella essent ista cor-
„ puscula, nudisque oculis vix distin-

„ guenda, ad nitidiorem lucem umbræ
„ eorum, ad microscopium vero figuræ
„ ipsæ et lineamenta, quamvis confusus,
„ apparuere. Sanè cum flammanti can-
„ delæ admoventur, crepitum edi-
„ dere „.

e) *Instrumenta* denique, si alia quavis ratione illapsa exterminari nequeunt, sunt admovenda, qualia HILDANUS (e), WARE (f), aliique describunt, et quorum selectus pro magnitudine, situque ac numero illapsorum est faciendus. GUERIN (g) bis occasionem nactus est illapsa hujusmodi eximendi; semel corpus trans corneam usque in cameram anteriorem penetravit; alterum in adnata hæsit; ophthalmia utroque in casu erat insignis: prius acu ad cataractam extractum est, oculo ante ope speculi ophthalmici firmato; alterum vero anatomico tenaculo est educatum. Similes quoque bini casus obvenere c. BISSETO (h). Aqua etiam tepida ex syringa violente peregrino corpori illisa tutum certumque est remedium,

(e) l. c. Cent. 2. Obs. 13.

(f) l. c. p. 357. sq.

(g) l. c. p. 38. sq.

(h) l. c. p. 111.

quod ipsum nunquam fefellit, præsertim si illapsa sint numerosiora, nullisque instrumentis apprehendenda; sic enim torrente fluidi averruntur, eluunturque. Flexa item corpora vinculo e seta porcina injecto educi posse animadvertit. Quam varii autem se se hic offerre casus possint, uno alterove exemplo illustrare id non inutile fuerit. „Famulæ meæ, „inquit P. FORESTUS (i), cum culex oculum intrasset, . . . leviter palpebra sursum tracta cum linteo molliori eximebam, . . . Gravioris paulo commatis est casus a G. F. HILDANO (k) observatus: „puer . . . cum . . . in culina plumbum liquefactum imprudenter et nimis velociter in aquam frigidam projiceret, eo impetu in altum resiliit, ut non solum pileo verum etiam oculo sinistro infingeretur. Pater, qui in proximo conclavi erat, intelligens strepitum (puer enim ex ictu in terram recidit) accurrit, puerumque solum sed semianimem reperit, protinusque ipsum ad me adduxit. Oculum cum inspexissem, gr. j plumbi ad lentis fere magnitudinem palpebræ

(i) l. c. Obs. 16.

(k) l. c. Cent. 4. Obs. 17.

„ superiori, ubi crines erumpunt, alte-
„ rum adnatæ infixum reperi, et quidem
„ adeo profunde, ut vix vossellis extra-
„ here possem. Extracto tandem plumbo
„ oculo collyrium anodynum et repel-
„ lens instillavi et applicui, oculumque
„ diligenter fascia clausi, frontem oleo
„ rosaceo inunxi, deinde defensivum ap-
„ plicui; altera die corpus syrupo rosato
„ solutivo, parumque pulveris sennæ;
„ in decocto agrimonix, betonicæ, eu-
„ phrasix dissoluti expurgavi, et quoti-
„ die bis oculo collyrium applicui. Sic
„ intra paucos dies plenissime convaluit,
„ nullo superveniente symptomate,,. Isto
vero difficilior etiam est casus ab HEN-
ZE apud C. TODE (1) notatus: ancilla
a 7 annis ophthalmiæ crebriori oculi si-
nistri obnoxia cum postremum rursus
eandem a 3 jam hebdomadis nacta esset,
accitus Auctor invenit corneam opaca-
tam, totumque bulbum cum albugineâ
admodum inflammatum cum acri dolore
uberique lacrymarum profluvio, at citrà
febrim. Cephalalgia quoque identidem
non levis intercurrerat. Cum ægra ve-
ficans renueret, hirudinesque non tanti
esse

(1) 1. c. 7 Band. 1 Stück 2 Abschn. p. 189.
sqq.

esse viderentur. Facta Væ Se et cathar-
sibus aquæ ophthalmicæ adhibebantur,
primum aqua alba dispensatorii Danici,
dein decoctum radicis althææ, demum
solutio sacch. hⁿⁱ; at omnia in cassum.
Increfcente deinceps dolore oculi puncto-
rio oculus inspiciebatur, detectumque in
iride punctulum, velut ulcusculum esset,
at ubi tangebatur, prodidit præsentiam
duri corporis angulosi; tum vero ægrotæ
post sciscitationes factas venit in men-
tem, micam illud esse debere lithanthra-
cis sub sectione ante 7 annos in oculum
infilientis, ex quo tempore ophthalmia
recurfabat. Idcirco mox incisione ope
lanceolæ inter prominentiam illam et
albugineam facta mica tenaculo exili
exempta est, paucis tantum guttulis cruo-
ris elapsis, humore autem aqueo nulla-
tenus consecuto, manifesto indicio mi-
cam illam ita inter corneæ lamellas deli-
tuisset, ut intimam illarum nequaquam
penetrarit. Mica educta quadrangularis
fuit, 4 lineas longa lataque, dimidiam
vero lineam crassa, uno sui angulo ut-
cunque scindente. Oculo spleniolum im-
positum, quod aqua saturnina identidem
humectabatur, deligatioque non ante sub-
lata, quam incisio cicatricem duxisset,
quod intra 8 dies evenit. Cicatrix pu-
pillæ partem obtegebat; sed cornea jam

multo ante suam amisit pelluciditatem. Ancilla nihilo minus hodieum aliis famulatur.

§. 77.

III. PHALANGOSIS *evellenda*. Inter externos stimulos cilia quoque sunt referenda, quæ vitiosa sua directione introrsum flexa bulbum oculi continenter irritando insignem sæpe illius producunt inflammationem haud prius desinentem, quam evulsa fuerint. Cum autem affectio hæc sui sit generis morbus, doctrinæ paulo prolixioris, ac proinde aliorum referendus, aliis *trichiasis* aut *dystichiasis* dictus, unicum isthic ejus exemplum, quatenus ad præsentem rem facit, adduxisse sufficiet. Convenerat M. F. ALIXIUM (*m*) adolescens 13 annorum consilium rogaturus pro oculi dextri ophthalmia jam inde ab 11^o ætatis anno affligente atque ad omnia remedia contumaci. Oculo inspecto causa mali continuo patebat; cilia namque ambarum ejus palpebrarum bulbo obversa illum perpetuo irritabant. His itaque ordine evul-

(*m*) Observ. chirurg. fascic. 2. obs. 10.
p. 49. sq.

sis hirudines 4 palpebræ admotæ ; quæ ubi insigni copia sanguinem elicuissent, aqua vegeto-mineralis oculo splendorum ope est applicata. Hisque æger intra 10 dies prorsus convaluit. Incidunt vero casus, ubi evulsio ciliorum nihil opis ophthalmiæ affert, dum nempe eorum in bulbum conversio non tam a proprio vitio, quam potius muscutorum palpebræ aut convulsione aut paralyfi ita proficiscitur, ut nova cilia post priorum evulsionem succrescentia perinde in bulbum tendant, ob marginem videlicet palpebræ alterutrius aut utriusque actione musculari bulbo oculi vitioso obversum. Duo ejusmodi exempla suppeditat J. WARE (n), nimirum feminae 50 annorum convulsionibus totius corporis multos annos obnoxia unus illarum paroxysmus ante 2 prope jam annos palpebræ inferioris lævo in oculo trichiasin, ob marginem ejus bulbo oculi solito magis obversum, post se reliquit: unde ophthalmia nullis fuganda remediis ortum duxit. Opem Majo 1779 petenti WARE palpebram ope tenacis emplastri ei appositi ita detractam tenebat, ut cutis ejus plicam in mala faceret: unde palpebræ margo tamdiu ex-

(n) l. c. p. 391. sq.

trorsum versus mansit, quamdiu emplastrum palpebræ adhæsit. Verum periculo rei dies aliquot ita facto observavit, marginem, si palpebra ab emplastro se se expedivit (quod sæpius accidit), protinus iterum ad morbosum suum situm rediisse. Idcirco misso emplastro cuti palpebræ affixit instrumentum BARTISCHII, HEISTERIANO (o) simile, quod in genam pendulum suo pondere marginem palpebræ extrorsum versus tenebat, quin priorem situm repetere posset: sed cum nec diuturnum inde auxilium esset, nec prehensa instrumento cutis dolore vacaret, rejecto etiam hoc præsidio operatio instituta est, videlicet cutem infra palpebram in transversam plicam contractam excidit, tribusque in punctis vulneris labia consuit. Postridie quidem cutis circum oculum valde intumuit; brevi tamen tumor a fotu aqua vegeto-minerali subsedit. Abhinc omnibus bene procedentibus, palpebra naturali in situ manente, ophthalmia confestim disparuit, ac femina brevi ex toto convaluit. Insequenti Decembri ophthalmia dextrum oculum ab eadem causa corripuit, quam similis iterum operatio sustulit. Lævus

autem oculus hactenus semper sanus mansit. Perinde (p) juvenis 18 annorum a trichiasi palpebræ superioris vehementi ac dolorifica ophthalmia laborans, cum nec evulsis sæpius ciliis ab ea liberari posset, quod illa eadem semper directione recreverint, nec V. S. catharses, vesicantia, setacea, cortex Peruv. sanguinem depurantia, omnisque generis ophthalmica, &c. quidquam proficerent, visu tandem privatus est. Cutis supra palpebram excisio hic inutilis futura videbatur; quod morbus a levatoris palpebræ paralyfi profectus esset: alia proinde operatio instituta, nimirum incisione trans cutem superioris palpebræ ab interno cantho usque ad externum producta fibras orbicularis musculi WARE ita separavit, ut expansio fibrarum levatoris proxime (quoad fieri posset) ejus insertionem in marginem palpebræ nudaretur; ac dein exiguo ferramento, figura sua convexitati palpebræ congruente, satis calido fibras tendineas et carneas musculi bis terve cauterisavit, eo scilicet fine, ut irritatio ac jactura substantiæ inde ortæ musculi hujus fibras contraherent, ceu id sæpe post ambustionem passim in cor-

(p) l. c. p. 393. sq.

pore accidit: quod etiam evenerat; ac licet palpebra deinceps semper iusto altior manserit, quam cupiebatur, trichiasis tamen vel potius marginis palpebræ introversio sanata est, et evanescente ophthalmia æger oculo rursus est usus.

§. 78.

Monendum hic unum superest, ut quotiescunque externus stimulus ophthalmiam accersit, simul hujus quoque ita ratio habeatur, ut et ante memorati stimuli ablationem sanguis detrahatur, alvusque ducatur (quo fit, ut detumescentibus partibus affectis eo facilius ad corpus irritans accessus detur), si tumor inflammatorius fuerit insignis, et post eundem sublatum oculus roborantibus adstringentibusque foveatur, quoad omnis rubor fuerit discussus; id quod ex adductis hic exemplis abunde elucescit.

CAPUT X.

EXSTIRPATIO OCULI.

§. 79.

Ubi ab inflammationis vi bulbus oculi tantopere degeneravit a statu sano, ut encephalo etiam vicino a pravitae ejus (seu quod in cancrum abierit, seu quod tantum undique puris collegerit, ut caries ossibus orbitæ, purisque in encephalum ita progressus sit extimescendus) perniciēs immineat; matura illius exstirpatione nequitquam erit differenda: quam citra vitæ periculum hic institui posse, docet observatio D. P. LAYARDI (q), nimirum adolescenti ad 14 annos nato sub improbo labore agresti in Paschate A. 1756 subito lævus oculus vehementer indoluit, crescentique dolori supervenit inflammatio, magnitudine simul bulbi in dies incremente. Post varia nequicquam tentata remedia die 7^a Octobris æger Auctori videndus obtigit: oculus extra orbitam propulsus ad superius usque la-

(q) LESKE Auserl. Abhandl. pract. und chir. Inhalts aus den Philos. Transact. 5 Th. No 18 p. 85. sqq.

bium propendebat; ejus tunicæ perquam alienum habebant colorem, vasæque omnia turgebant, et humores intra hunc oculum visu prorsus orbatum puris ad modum fluctuabant. Cumque dexter etiam oculus admodum jam esset inflammatus, ocyssima exstirpatio indicata erat. Interea verodum chirurgorum quidam oculum lævum digito versus pupillam premebat, bulbus ad iridis marginem crepans puris aliquid profudit. Illico igitur operatio suscepta, et facto in cantho externo lanceola vulnere oculum chirurgus forcice curva proximè palpebras excissum exemit, cavumque pure detersum linteo carpto explevit, extusque splenia calido vino lymphato madida superimposuit, ac monocula fascia omnia firmavit. His peractis vena brachii tusa, anodynaque data, et idonea injuncta diæta. Inflammatio inde ac puris proventus minuebantur, et paucis post diebus pus bonum processit; palpebræ prius distentæ pedetentim detumescere, omniaque citam pollicebantur sanationem. Sed æger diei 7^æ Novembris vespere frigido pluvioque aeri se se fortuito exposuit, dum in janua domus aperientem ventus cum impulla pluvia irrui: unde illico evasit deterior. Insequenti enim nocte vulnus denuo vehementer dolere cocepit, palpebræ iterum

tumuerunt, ac postmodum cum reliquis intra orbitam etiam tum superstitibus partibus sub deligatione perquam inflammata apparuerunt, brevique postea caro fungosa ex ulcere pullulabat, atque febris intermittens supervenit: contra quam cum emetico locus non esset, datum rheum, ac deinceps infusum corticis Peruviani illam aliquanto post profligavit. At partium intra orbitam tumor continenter augebatur, ac fungosa caro usque adeo accreverat, ut quantum ante operationem ipse oculus, tantumdem nunc illa extra orbitam prominuerit. Omnia absumentia et adstringentia in cassum illi applicata; causticis vero, ne in cancrum ulcus indolem ab iis adhibitis degeneraret, diffidebatur. Cum vero ex ulcere nil nisi aqua purulenta procederet, a principio Novembris æger in sicca semper diæta tenebatur. Insequentis anni Februario tunicarum oculi semiextirpati laciniae intra orbitam superstites cœpere in parte carnis fungosæ, quæ maxime prostabat, in conspectum venire, albuginæ oculi instar albæ, quibus digito contrectatis manifesta humorum in iis conclusorum fluctuatio percipiebatur, hydrophthalmiam præsentem prodens; verum crassities earum, ac partium sensibilitas vetabant prius lacum ex una tunicarum oculi

distenta enatum, humoresque coercentem, pertundi, quam a carne fungosa regente evasisset liberior. Accrescente autem in dies illius magnitudine, secedentibusque fungosis marginibus humorum inclusorum fluctuatio semper fiebat manifestior, ac membranæ tenuiores. Tandem 15^a Junii chirurgus saccum lanceola rupit citra notabilem ab ægro perceptum dolorem, unde magnum theatum vasculum plenum aquæ limpidae, inodora ac insipidae effluxit. Inde cavum sicco linteo carpto expletum, et splenia calido vino lymphato imbuta superimposita. Nocte sequenti et aliquot porro diebus multum denuo aquæ ex oculo elapsum est, et die 19^a Junii, 4^a post operationem, fungosa caro multum jam immixta fuit. Vulnus dein calido unguento e gummi elemi deligatum, caro autem fungosa abluebatur MR^a ex aquis rosarum et calcis ac TR^a myrrhae. Die 23^a Junii soluta deligatione saccus adeo apparuit laxus et collapsus, ut sine ullo prorsus dolore se se pateretur extrahi, qui 3½ pollices longus, et sesquipollicis diametro præditus, magnum adhuc theatum vasculum aquæ continebat, et e sclerotica enatus fuisse videbatur, coloris fuit albi ac pellucidi, et usque adeo tener, ut sub exsiccatione perquam fra-

gilis evaserit. Abhinc fungosa caro quotidie decreſcebat, vulnusque poſt ſuppurationem ita conſanabatur, ut æger 7^a Auguſti prorſus iterum ſanus fuerit. Oculus dexter priſtinum recepit vigorem, et adoleſcens ex illo tempore omnis moleſtiæ expers fuit, reliquiis tunicarum muſculorumque oculi ita nihilo minus palpebras explentibus, ut oculus velut clauſus tantum videretur. Juſſus tamen eſt æger oculum hunc tota hyeme contra frigoris vim teſtum habere. Alterum hujusmodi caſum vulgavit J. WARE (r) a WATHENIO communicatum: puero cuidam dexter oculus vehementer intumeſcens intra breve tempus tantam adeptus eſt molem, ut magnum ſarcoma ſpongioſum referret multo cum dolore. Ubi V. S. ſotus, aliaque aliquot hebdomadis fruſtra fuiſſent adhibita, WATHEN demum conſultus oculi tumorem tantum jam reperit, ut bulbum extra palpebras proſtantiem, puero in dies magis ægreſcente ac debilitato, exſtirpare debuerit. Quo facto omnibus ad 3^{um} uſque diem rite procedentibus repente tunc in vulnere et orbita ingens dolor ac pravi ominis obortus eſt. Hunc

(r) l. c. p. 390. ſq.

vero instillatum laudanum liquidum continuo sedavit: unde placido redeunte somno, cunctisque symptomatibus pravis disparentibus, ac vulnere jam bene constituto, puer non multo post convaleuit.

SECTIO III.

DIAETETICUM REGIMEN.

CAPUT UNICUM.

§. 80.

I. QUIES corporis animique inter prima diætetici regiminis capita est referenda. „ Prima omnium, inquit C E L S U S (s), „ sunt quies et abstinencia. Ergo primo „ die loco obscuro cubare debet sic, ut a „ sermone quoque abstineat „. Quantum enim corporis motus ad accelerandum humorum motum conferat, nemini nisi in medicina peregrino ignotum esse potest; quod quantopere hic vitandum sit, ratio juxta ac experientia abunde docent. Animi porro motus quam noxii

(s) l. c. art. I. p. m. 281.

hic sint, dum bilioso in systemate turbascent, jam in causarum pertractatione (†) est ostensum. Ut proinde sedulo ophthalmia præsertim graviore laborantibus cum corporis tum animi quietem inculcare oporteat.

§. 81.

2. ALIMENTA vero quod attinet, in iis per omnia haud secius ac in alia quavis inflammatione curanda tenor est servandus, seu indole illorum seu copia spectata. Per principia, et in vehementiori vel maxime morbo severam CELSUS (u) imperat abstinentiam, oportet, inquit ille „nullum cibum assumere, si „fieri potest, ne aquam quidem; si „minus, certe quam minimum ejus, . . . Atque ita sæpe quiete et abstinentia, paucisque externe oculo applicatis, ophthalmias curari asserit. Hoc forte magistro W. ROWLEY (x) præter vacationes alvi et sanguinis uberiores iteratasque consulit omnimodam fere a potu

(†) Vide §. 19.

(u) l. c.

(x) A Treatise on the principal Diseases of the Eyes.

quocunque et vel ipsius etiam aquæ ab-
stinentiam; quid enim, ait ille, pro-
fuerit vasa alvi ductione sanguinisque
demptione deplevisse, si sub idem tempus
assumpto potu repleantur? Tantum vero
huic a potu abstinentiæ tribuit, ut plus
ab ipsa quam ab iteratis vacuationibus
præstoletur, nec nisi ejus impatientibus
ægris potum concedat, et ne tum qui-
dem dimidia pinta per diem amplius:
contra ea commendat impense fructus
aliaque acescentia. Verum isthæc tam
aperte rerum usui sunt opposita, ut no-
tante A. G. RICHTERO (y) refutatione
vix indigeant. Ubi autem ophthalmia
paulo est diuturnior, aut in vetustatem
plane incidit, multum a primo diætæ
rigore est remittendum, vitæque viribus
consulendum: unde et CELSUS (z)
„ neque tamen (ait) in lippientibus lon-
„ gum jejunium necessarium est, ne pi-
„ tuita tenuior atque acrior fiat; sed
„ secundo die dari debet id, quod le-
„ vissimum videri potest ex iis, quæ
„ pituitam faciunt crassiolem, qualia
„ sunt ova forbilia: si minor vis urget,

(y) Chirurg. Biblioth. 3 Band. I St. No 4.

p. 90. sq.

(z) l. c.

„ pulticula quoque aut panis ex lacte.
„ Insequentibus diebus quantum inflam-
„ mationi detrahetur, tantum adjici ci-
„ bis poterit, sed generis ejusdem, uti-
„ que ut nihil falsum, nihil acre, nihil
„ ex his quæ extenuant, sumatur, nihil
„ potui præter aquam „. Imo vero et
vino quoque interdum, ut superius (a)
jam multis vidimus, indulgere est salu-
bre; et sola hic cerevisia nescio quid in-
salubre adfert.

§. 82.

3. AER quoque, in quo ægro ver-
sandum est, pro ratione status solidorum
varius fit, oportet. Ubi vasorum laxitas
ophthalmiam fovet, nihil aere humido,
in primis si calidus simul fit, est dete-
rius. Rarum hujus rei exemplum refert
M. E. BLOCH (b): mulier juvenis ac
sana ante, ex quo nupsit, perpetuo fere
oculorum rubore vexata est. Cognita
quæque remedia usurpata breve tantum-
modo levamen attulere. Cum vero nun-
quam ante malo ulli oculorum fuerit ob-
noxia, et nupta etiam ordinate vixerit,

(a) Vide §. 47.

(b) l. c. No 13, p. 102. sq.

causa alibi quam in victu vel humoribus tam pertinacis mali quærenda fuit, uti et reperta est. Læctus enim conjugalis cum nescio juxta quem parietem situs esset, cui pone virum mulier accubare nocte qualibet solebat, fvasit БЛОЧ, ut uxor mariti, hic illius locum in læcto caperet. Verbo audientes fuere conjugēs: mulier inde ab oculorum rubore convaluit; vir contra ægrotare occipiens jam edontalgiam, jam cervicis immobilitatem, et id genus alia perpetiebatur. Quoniam autem domicilii adjuncta læcti alium in locum translationem non admitterebant, et viri ægritudo mulieri plus negotii facefsebat, quam propriorum oculorum rubor, maluit denuo juxta parietem cubare, et continuo in pristinum relapsa est malum, a quo non ante liberata est, quam ad aliud migrasset domicilium.

§. 83.

4. STIMULUS *externus* quivis ab oculis arceatur, lucis præcipue, fumi, pulverum, &c. ut ut RIEDLINI (c) Senator fumo extinctæ candelæ oculis mederi

(c) Vide §. 72. I. D. No 1.

mederi consueverit. Quantum vero doloris admissa lux in oculos inflammatos excitare soleat, in superioribus fufius dictum est (d); imo ipsam quoque inflammationem ad exitium usque oculorum intendere est observata. A. 1757 utroque ex oculò lentem a 10 circiter annis jam opacam viro cuidam exemit J. JANIN (e) felicissimo cum successu, nec ante 6um post operationem diem ullum symptoma est consecutum. Sed homo desiderium conjugis ac liberorum intuentorum haud ulterius ferens, oculos revelavit, et spretis doloribus, quos lux diurna attulit, horam integram eosdem objectis dignoscendis fatigavit. Abhinc dolores capitis et oculorum consecuti, accessit oculorum ac palpebrarum tumor, vigilæ, ac demum etiam febris, Væ Ses, vesicantia, severa diæta, externa-que anodina ac derivantia impedire non poterant, quo minus pus oculi colligerent, quo pessumdati conciderunt. Hinc „ curandum est, monente BOERHAA- „ VIO (f), ut dolor a luce productus „ toto curationis tempore caveatur „.

(d) Vide §. 31 No 3.

(e) l. c. p. 255 sq.

(f) l. c. §. 64. p. m. 57. sq.

Imo teste A. G. RICHTERO (g) „ple-
„rumque diu fatis post inflammationem
„dissipatam tanta oculi remanet sensibi-
„litas, ut lucem vix ferant ægri, pa-
„rum vel confuse videant in loco lu-
„cido, melius in obscuriori. Inde ali-
„quandiu in loco obscuriori versentur
„ægri, vel oculum peplo tegant, ut
„sensim admittatur lux ad oculum, sen-
„sim illi assuescat oculus,,. Laxa fascia
aut velo viridi prætenso toto curationis
tempore lucem inedentes ab utroque ocu-
lo arcere solent, et vel tum etiam, ubi
unus tantum oculus laborat; nam perfecta
palpebrarum quiete hic opus est; secus
alterna earum diductio et coitus affri-
ctum perpetuum causant; qui dolorem
et inflammationem adaugeat, est necesse.
Quod si vero sanus oculus sibi relinqua-
tur, fiet, ut motus palpebrarum in ist-
hoc etiam eundem in alterius oculi vela-
ti palpebris e mutuo consensu oculorum
aliquatenus efficiat. Interea tamen vetat
J. L. ODHÉLIUS (h) quidquam lucis ar-
cendæ causâ oculis applicari; quod fascia
eos premat, irritetque, ac liberum la-
crymarum effluxum cohibeat, non sine

(g) Observ. chirurg. fascic. I. cap. II. p. 116.

(h) l. c.

peffimis fequelis, et quod oculus, ut ab aere tangatur, fit creatus. At breviter hæc omnia convellit A. G. RICHTER (i), monens priora a falcia laxa, qualem hic elle oportet, ac tenui nunquam effici poffe; neque argumentum a creatione petatum tanti eft: nam et creatus eft oculus, ut a luce colluftretur; et quis ægrorum ophthalmia laborantium eam fine noxa pertulerit? JANINI homo utique pœnas propterea luit. Imo ipfa natura lucem aeremque ab oculis inflammatis, dum palpebras tumentes claudit, abarcet. Unde neque GENDRON (k) audiendus, qui livadet, ut quandoque lux in oculum affectum admittatur, ne iris diuturna quiete contractilitatem fuam fenfim deperdat; nifi forte id expirante jam inflammatione cenfeatur faciundum, quod multo ante jam H. SLOAN (l) quoque factitarat „ obfervatu dignum (agens), „ illud fcilicet hominibus oculis laboran- „ tibus admodum folenne elle, ut oculos „ umbraculis aliisque fimilibus tegere „ ftudeant, quod sæpe curationem re- „ moratur; quia ejusmodi regimen ocu-

(i) Ibidem.

(k) l. c. p. 177.

(l) l. c. p. 292.

„ lorum justo calidius est. Quamobrem
 „ semper illis svasi, ut quamprimum lu-
 „ cem perferre oculi possent, tegumen-
 „ ta illa ab oculis removerent,,.

HISTORIA I.

F. DECKERI (m)

*Sistens exemplum planissimum ophthalmiæ
 humidæ, quibusdam tamen adiunctis
 non spernendis præditæ, quæ recta me-
 dendi methodo tractata tironibus para-
 digmatis loco habenda erit.*

Juvenis 26 circiter annos natus cali-
 dioris temperamenti, Bacchi castra plus
 solito secutus, indeque calefactus frigi-
 dum aera diu subiit, corporis æstum ut
 temperaret (n). Mane ingentem in dex-
 tro oculo observavit pruritum: quare di-
 gitis valde oculum fricavit. Quo facto
 acutum in utroque oculo sensit dolorem
 ardoremque, ac vesperi ruborem ingen-
 tem in oculorum albo observavit. Noctu

(m) Exercit. medic. pract. Cap. 6. p. m.
 405. 199.

(n) Confer §. 22 No 1.

moderate quiescens curatos oculos putavit; ast eosdem ob pruritus mane iterum fricans talem in oculorum dolorem, ardorem, ruboremque incidit, ut neutiquam lucem tolerare, verum clausis oculis continuo sedere cogeretur: nec diu post maxima quoque lacrymarum copia ex oculis effluxit. Quare aquam rosaceam tepidam oculis ipsemet imposuit: unde malum non tam intolerabile minusque dolorificum fuit redditum. Tertio ab affectus hujus invasione die vocatus sequentem præscripsi clysterem:

℞. Decoct. vulg. pro clystere emoll.

℥ viij

Elect. diaphœnic. ℥jss

Mellis anthosat. ℥vj

Sal. gemm. ʒj. M.F. clyster pro viro.

Quo injecto ter alvum deposuit. Vitum refrigerantem et humectantem statim mandavi, omniaque acria, spirituosâ, aromatica, &c. interdixi, quietem et somnum oculorumque clausuram valde imperavi, omnemque corporis motum sermonemque . . . ac pleraque animi pathemata, præ ceteris tamen iram, vitari oportere monui (o): hocque factò venam secandam, . . . sanguinemque ad ʒx abs-

trahendum iussi. oculisque sequens cataplasmata imponendum, singulisque 3 horis renovandum præscripsi (p):

R. Pulp. pomi dulc. sub ciner. assat. ℥j

Micæ panis alb. recent. ℥ij

Album. ovi diu agitati et in liqv. conversi ℥jss

Croci opt. lævigati ℥ij

Lact. muliebr. recent. mulcti q. s.

F. catapl. supra linteum extendendum, ac moderate tepidum oculis admoventum; quod admodum dolorem et inflammationem sedavit. Secundo vocationis die mane sequentem haustum purgantem . . . assumpsit:

R. Elect. cholagogi SYLVII (q) ℥iij

Tart. vitriolat. ℥j

Aquæ fœnic. q. s. M. F. haustus.

Quo assumpto septies alvum deposuit. In potu quotidie non nisi spiritum nitri usurpavit: 3^o 4^o que vocationis die omnia curata putabat ægrotans, 5^o vero omnia pejora. Hujus mutationis causam cum indagarem, nullam, præterquam quod post purgationem alvum non dum deposuerat, invenire poteram causam: quare clysterem supra dictum statim reiteran-

(p) Confer. §. 72. I. C. No 2.

(q) Pag. 180 descripti.

dum præscripti; quo factò bis alvum deposuit. Sexto omnia iterum meliora: quare singulis diebus clysterem injiciendum mandavi; atque brevi ab ophthalmia fuit postea curatus. Attamen 5^o vocatōnis die loco cataplasmat̃is sequens collyrium usurpavit:

R̃. TR^a ♀ (per. ōum ☉* æri usto infusum ac per octiduum leni calore digestum, sicque TR^a cœrulea visu jucundissima extr.) ʒß

Aquæ euphrag. rosar. aa ʒj.

Croci optimi lævigati ʒj. M. F. collyrium. Hoc usurpato et rubedo et dolor et pruritus &c. brevi evanuerē.

HISTORIA II.

P. FORESTI (r)

Exhibens ophthalmiam priori similem GALLENICA methodo percuratam.

Juvenis Almarinus annos 18 natus, plenitudine satis laborans, cum tempus vernum esset, ac fluxiones acres tum destillationes quosdam subito invaderent,

in ophthalmiam . . . veram lapsus est; ita ut adnata oculi tunica, quæ tota candida esse solet, ob sanguinis confluxum rubea effecta sit cum summa inflammatione et dolore, lacrymis ex oculo refuldantibus admodum fervidis. Cum alvum non deponeret, et clysterem lenientem non admitteret, post cassiam propinatam die subsequenti a sanguinis missione curationem auspicati sumus, vena cephalica incisa in brachio oculum affectum respiciente (*s*), et in magna satis quantitate, ultra 8 uncias sanguinis vel paulo plus extraximus . . . statim vero a Væ Se syrupum hunc propinavi;

℞. Syr. de endivia

— — granatis aa ʒʒ.

Aquæ endiv.

— — cichor.

— — euphrag. aa ʒj. M. pro julebo. Purgavi cum infus. rhab. in aquæ end. ʒjʒ, syr. ex infus. ros. solut. ʒjʒ, aquæ cichorii ʒiij. M. Cucurbitulas quoque dorso tum scapulis cum scarificatione admovimus (*t*), sanguine copiose satis extracto. Et statim sanguine extracto, atque corpore repurgato, ovi albumen instar aquæ fortiter agitatum cum

(*s*) Confer. §. 55. B.

(*t*) Confer §. 60.

farina fabarum et semperviva cruda simul commixta (u) oculo apponebamus ; et statim tota inflammatio ac oculi inflatio cessarunt. Quemadmodum et alteri profuit sola semperviva cum foliis fœniculi contusa et apposita , præcedentibus universalibus evacuationibus.

HISTORIA III.

EJUSDEM (x)

Proponens ophthalmiæ humidæ acerrimæ biliosæ methodo antibiliosa citra sanguinem missum curationem.

Juvenis quidam temperaturæ biliosæ cum longa tristitia et quidem curis afficeretur (y), et diu vigil perstitisset ob obitum parentis, ut sollicitudines illas mitigaret, cum amicis vina potentia largius sumebat ; aliis et acribus cibus delectabatur, sæpe in sole versabatur media æstate : unde acribus humoribus collectis in ophthalmiam incidit ex rodente et acri humore subito catarrhi instar in ocu-

(u) Confer §. 72 I. A. No. 1.

(x) l. c. Observ. 2.

(y) Confer. §. 19.

los prolapsō cum ingenti dolore. Ad quem cum subintrassem, et plane biliosus esset, et animadverterem totum corpus minime plethoricum esse, sed potius præditum vitioso humore, lacrymamque rodentem adeo oculum infestare, ut anguli oculorum simul et genæ tali influxu roderentur, ita ut æger uri videretur, et rofionem non tolerans exfiliret (z), facile intellexi, hanc ophthalmiam a bile erodente originem sumpfisse. Cum hic igitur rubor paucus in oculis adesset, et punctura ac dolor vehementior, et lacrymæ tenues acutæ, et tumor exiguus appareret, et signa totius plenitudinis abessent, et biliola humorum pravitas in corpore satis macilento superaret, curationem auspicati sumus ab iis, quæ totum corpus purgarent, et a recrementis liberarent; statim hanc potionem exhibui:

R. Cassiæ recens ex cannis tractæ ʒvj
Pulpæ tamarind. extr. cum ∇æ
viol. ʒij

Syr. ex infus. ros. pallid.

— violar. aa ʒß Dissolve cum ʒiij

Seri lactis. Quibus ter alvum deposuit. Deinde propinavi ad humores

(z) Confer. §. 31. No 4.

aeres et mordaces contemperandos syr-
pos refrigerantes, incrassantes hoc modo :

R. Syr. ros. ex ros. siccis

—— nymphææ

—— papav. aa ʒj

Aquæ solatri

—— plantag.

—— cichor. aa ʒij. M. pro ij do-

sibus. Postea etiam purgavi cum infuso
rhab. adjecto syr, viol. Oculis vero can-
didum ovi liquorem instar aquæ concus-
sum infundebam (a) . . . et cum dolor
urgeret, accipiebam

aquæ album. ovi ʒij

lactis mulieris ʒiij

Succi plantag. ʒj. M.

Panni duplicati ex lino in eo infusi
oculis imponebantur. Interea et collyrii
albi RHASIS ʒss modo cum lacte mulie-
bri soluti, modo cum aqua ros. oculis in-
stillabam; fovebam etiam oculos cum de-
cocto foliorum malvæ, viol. et scænugræ-
ci prius loti a pulvere ad sedationem
doloris.

(a) Confer. §. 72 I. A. No. 1.

HISTORIA IV.

EJUSDEM (b)

*De ophthalmia cum variis symptomatibus
ab imprudenti odontalgia medicatione
oborta, feliciterque perfanata.*

Cognata uxoris meæ nata annos 29, A. 1556 menſe Majo cum ingenti dolore dentium torqueretur, ut ex dolore decumbere coacta fuerit, temperatura ſanguinea, facie admodum pulchra, imprudenter nescio cujus mulierculæ confilio, corpore nequaquam repurgato . . . aquæ vitæ gargarismo cum uſa eſſet, ac nodulos quosdam ſtaphide agria repletos in ore deinde detinuiſſet ad dolorem dentium mitigandum, et pituitam ab ore eliciendam, in febrem ſatis acutam eamque continuam incidit, et ex impetu vehementioris fluxionis tota maxilla ſubito inflammationem paſſa etiam in ophthalmiam non ſimplicem tantum collapſa eſt et admodum gravem, verum etiam in oculi ac palpebræ inflammationem cum ingenti inflatione earundem partium, ut ovi magnitudinem excederet

(b) 1. c. Obſerv. 3.

adeo , ut nec palpebram ipsam aperire posset (c); erat enim palpebra ad ovi gallinæ magnitudinem inflata , similiter inflammata cum rubedine quadam purpurascēte, et ad nigrum colorem quodammodo inclinante anthracis instar. Primo enim intuitu de carbunculo pestifero seu anthrace dubitabam; at originem hujus mali cum intellexissem, quod ex acribus medicamentis toto corpore pleno existente , tum capite repleto, evenisset : alvo per balanum soluta cum clysterem non admitteret, sanguinem satis copiose detrahere jussi ex cephalica vena in brachio e directo oculi affecti (d). Nam malum dextram fere partem faciei, potissimum vero oculum dextrum et palpebram occupaverat. Et statim a Væ Se propter febrem acutam syrupum istum ut ebiberet, svasi :

R. Syr. rosati
 — de end.
 — cichoreæ aa ʒss
 ▽ cichoreæ
 — end.
 — boragin. aa ʒj. M.

Adeo enim post hæc subito in sudorem

(c) Confer. §. 28.

(d) Confer §. 55. B. No 1. b).

aliquo modo prorupit, quem per 4 horas meis monitis servavit, ita ut febris deinde minus eam affligeret. At tumore circa oculum et palpebram remanente rursus syrupum propinavi, et cucurbitulas cum scarificatione scapulis admoveri præcepi, utcunque etiam sanguine extracto (e). Oculo vero tum palpebris ipsis inflammatis continuo applicabam linteolum duplicatum aqua ros. et lacte muliebri tum liquore albi ovi (f), idque ter quaterve in die: quo dolor mitigari cœpit ac palpebræ inflatio, ut tandem oculum aperire potuerit; et inspecta tunica conjunctiva omnino rubra apparebat: quare liquorem albi ovi cum aqua rosacea in oculum stillabam, et postea facta fomentatione cum decocto foliorum malvæ, sem. cydon. & fœnugræci seminis prius abluti, paulatim inflammatio oculi tum palpebræ cessarunt; maxilla tamen inflata ac inflammata permanente. Præscripta victus ratione tenui, cataplasma sequens apposui:

R. Rad. althææ mund. ℥ss

Fol. malvæ M. iij. Coqv. in

Aqua, ad mollitudinem pistentur,
adde

(e) Confer §. 55 B.

(f) Confer §. 72 I. A. No 1.

Farinæ sem. lini

—— ——— hordei aa ʒiʒ

Olei amygd. dulc. q. s. F. cataplasmā,

et assumpto medicamento leviori in hunc modum concinnato:

℞. Cassiæ recens extractæ

Diacatholici aa ʒiij

Diaprun. simpl. ʒij, cum ʒiij

Aquæ casei F. potio,

qua alvum (dictu mirum) decies deposuit, et intus in faucibus latens abscessus per se ruptus est, pure ex ore defluente satis copiose, ac maxilla detumesciente. Vires tamen tunc non nihil prostratæ erant: ideo victum restaurantem non nihil, qui convalescentibus utilis est, præscripti; cum hætenus tenuiori victu, ut ratio postulabat, usæ fuisset. Utebatur tunc gargarismis non nihil materiam attrahentibus ex ficibus, hyssopo, et uvis passis paratis; deinde magis mundificantibus et abstergentibus ex hordei communis decocto, melle ros. adjecto; postremo vero magis consolidante ex lacte, cui plantago incocta erat. Et istis præsidiis recte habuit.

HISTORIA V.

E J U S D E M (g)

De ophthalmia male tractata in suppurationem adnatæ abeunte, tandem tamen percurata: in qua emollientia collyria sola (quæ tamen aliqui ex toto rejiciunt) profuere, aliis officientibus.

Mulier . . . sub finem æstatis A. 1563 in oculi dextri acutissimum dolorem incidit una cum ophthalmia. Empyrica ocularia ad hanc ingressa rasuram ex lapide Talck dicto . . . capiebat, atque eam nescio qua aqua destillata immixtam collyrii modo in oculum stillabat. At non diu postea dolore ac ardore ingenti subsequente etiam ulcus subsecutum est, acribus humoribus adnatam primo, deinde etiam tunicam corneam, corrodentibus (b). Cum igitur ad hanc vocati essemus, et ulcus una cum ophthalmia et inflammatione spectaretur, atque Væ So prætermissa esset, alvo prius inanita cum cassia recens extracta et pulpa tamarindorum, sanguinem in brachio dextro
oculo

(g) l. c. Observ. 18.

(b) Confer §. 34 No 1. b) d).

oculo affecto correspondente detrahere iussimus . . . Cum . . . que illam purgasset cum infuso rhab. et decocto fennæ, cucurbitulas spatulis admovimus cum scarificatione. Deinde pilulas lucis ut deglutiret, imperavimus (i). . . . Interea et humorum defluxum . . . ad inferiores partes etiam vinculis injectis et frictionibus avertebamus . . . Dolor, qui vehementissimus erat, tum inflammatio cessarunt, ovi albumine (k) omnium primo in oculum instillato, ita ut ab ulteriori curatione abstineret. Verum paulo post cum chirurgum nescio quem vocasset, is collyrium quoddam ex aqua chelidonis, sceniculi, euphrasie cum succo rutæ confectum in oculum mittebat; quo denuo et dolorem et calorem ac fluxionem auxit, ut rursus me revocarint; et imposito iterum collyrio ex aqua rosacea et albumine ovi dolor paulatim mitigatus est. Cum enim ulcus simul cum inflammatione infestabat, curationem ex iis, quoad topica remedia, auspicabamur, quæ inflammationem lenire poterant et concoquere, non neglectis iis, quæ ad ulcus proprie pertinent . . .

(i) Confer §. 41 No 2.

(k) Confer §. 72 I. A. No 1.

Non solum per initia collyrium album muliebri lacte dissolutum immittebam, sed et illud, quod ex albumine ovi constabat, instillabam. Interea abstinebam a vino usque ad declinationem, summo-pere cavendo ea, quæ caput replent, et fluxionem irritant, adhibitis postea quoque fomentis ex malva, floribus ros. et meliloti. Cum dolor præcedentibus præfidiis et evacuationibus sedatus esset, ut pus magis detergeretur, collyrium tale fieri præcepi ex aqua ros. sænic. lacte muliebri et modico melle rosaceo per pannum lineum colatum, ut purius evaderet, quod sæpius instillatum faciebat ad ophthalmiam, ulceris absterfionem, et doloris sedationem. Demum ulcere utcunque repurgato per collyrium prædictum tandem huic adjecimus aliquid sarcocollæ nutritæ, thuris et croci pauxillum, et mucilaginis sænugræci exiguum: quibus remediis optime hæc mulier se habuit. Ceterum corniformis tunica non erat plane perrupta; et sic postremo ad reliquam curationem perficiendam, ut magis epuloticum fieret collyrium, id est cicatricem inducens, tale præscripsimus:

℞. Antimonii

Plumbi usti aa ʒj

Aloes .

Sarcocollæ nutritæ aa ʒſs, cum
 Succo rubi F. collyrium.

Uſus tempore dilui poteſt cum lacte aut
 ovi liquore. . . . Hæc inquam mulier
 brevi curata fuit ab ulceratione, parvo
 tamen foramine inſtar arenulæ impreſſæ
 permanente et conjunctivam tunicam
 tranſeunte, ad corneam etiam pervenien-
 te, ſed non in totum penetrante.

HISTORIA VI.

L. HEISTERI (1)

*De vehementi ophthalmia ab icſtu flagelli
 enata cum ſanguinis pone corneam
 effuſione, feliciter percurata.*

Judicis cujuſdam filius fortuito oculum
 ſiniſtrum icſtu flagelli uſque adeo afflixit,
 ut palpebræ intumuerint magno cum ru-
 bore, albugineaque ruberrima evaſerit,
 et cornea opacata fuerit, pone quam in
 humore aqueo ſanguis effuſus viſebatur.
 Conſultus Auctor demptis e pede ſanguini-
 ſ ʒx, ductaque poſtridie alvo, oculo
 applicari juſſit ſequentes ſacculos reſol-
 ventes :

(1) l. c. I Band No 204.

℞. Herb. roſmarin.

—— majoran.

—— ſalviæ aa M ſ

Flor. ſtœchad.

—— lavend. aa p. ij. M. incif. cr. m.

Dividantur in duos ſacculos ante applicationem parumper leniterque in vino coquendos; alternatimque oculo calide poſt expreſſionem applicandos. Poſt triduum cornea jam paulo pellucidior facta eſt; ſanguine pone illam aliquatenus diſcuſſo; at albuginæ rubor, ut ante, manſit. Idcirco iteratum catharticum, nuchæ veſicans admotum, et ſacculorum applicatio, inditis cuilibet camphoræ gr. vj continuata oculo priſtinam valetudinem viſuique integrum reddidere.

HISTORIA VII.

EJUSDEM (m)

Exemplum ophthalmiæ ſiccæ curandæ tiranibus proponens.

MARIA DE AUERSPERG Comes 20 annos nata, cetera ſana, aliquamdiu tamen ab hinc oculorum ruborem ardorem

que, ut ut sine epiphora, dolore, visus-
que imminutione, passa opem ab Aucto-
re poposcit. Ille imperata Væ Se in pe-
de præscripsit:

R. Extr. panchym. $\frac{1}{2}$ CROL. 3℞

℞ in dulc. 3j

Resin. jalapp. gr. x.

Eff. lign. q. s. F. pil. 45 consperg.

Specif. ceph. Sumat vespere post

V. S. No xv pro dosi, eamque 5^o quo-
que die sub noctem repetat. Porro

R. Succin. ppt.

Conch. acet. ppt.

℞ ii diaph. non abl.

Arcan. dupl. aa 3ij

Nitri depur. 3j. M. F. ☞ tenuis,

cujus quotidie ante somnum sumat 3ij ex
aqua acaciæ vel ceraforum. Pro oculis

R. Aquæ fl. rosar.

—— plantag. aa 3ij

℞ vulgaris 3℞.

Sacch. b ni gr. ij. M. D. pro ocu-
lis sæpius frigide per diem colluendis;
monitaque, ut et aqua frigida pura com-
muni mane ac sæpius interdiu oculos la-
varet, quod a morbo intra 8 vel 10 dies
liberata, ut ad recidivam ejus prohiben-
dam in posterum etiam faceret, serio in-
culcabatur (n).

(n) Confer §. 72. I. D. No 1.

HISTORIA VIII.

EJUSDEM (o)

*De ophthalmia a scrophulis colli remediis
 & libus confanata.*

Mulier a 14 diebus vehementi oculorum inflammatione laborans magna cum cephalalgia collique scrophulis, a sequentibus convaluit:

R. M. P. polychr. nostr. ʒjß

Ess. succini q. s. F. pil. gr. j conspergendæ

Cinnabari nat.

Sumat quovis vespere No 5.

R. Herb. euphras.

—— hyssop. aa M. j

Raf. lign. Sassafr. ʒj M. conc. gr. m. D. pro infuso quotidie bis ad 4. 5 vascula hauriendo, vaporeque calide oculis admittendo. Præterea

R. Aqv. plantag. ʒij

—— rosar. ʒj

Lap. ophthalm. nostr. gr. x. M. D. pro oculis tepide sæpius collinendis. Imperata etiam pedis phlebotomia; vesicans vero pone aures jam tum aderat.

Die 3^o desit dolor, et reliqua omnia in melius ibant, continuatisque remediis mulier ex toto convaluit. Pilularum autem polychrestarum et lapidis ophthalmici Auctoris confectio est sequens (p):

℞. Vitriol. cypr. et alb. aa ʒj

Alum. crud. ʒjss

Sacch. tñi ʒj. Coq. c.

✓ Aqv. rosar.

—— euphras. aa part. æqv. Solutio iterum inspissetur, ad lapidis duritiem, in fine adde

Camphoræ ʒj. M. F. lapis ophth.

℞. Extr. panchym. CRO L.

ʒ dulc. rit. par. aa ʒjv

Res. jalapp. opt. trit. ʒij. M. cum

Ess. lign. F. pilul. gr. j.

HISTORIA IX.

EJUSDEM (q)

De ophthalmia recursante cum aliquali oculi affecti atrophia, nihilominus percurata.

Femina 24 annorum, sanguinea, ante semestrem ramo oculum contundens vehe-

(p) Ibidem in præfatione.

(q) Ibidem No 339.

mentem illius inflammationem nacta est cum tumore bulbi, cephalalgia magna, horrore et calore, ut somno carnerit. Ophthalmia quidem cum dempto sanguine multisque aliis adhibitis remediis cessit, verum ab illo tempore sæpissime revertit: unde oculus debilis factus et altero paulo minor. Eapropter post largam in pede V. S. vespere eodem datæ pilulæ polychrestæ Auctoris (in præced. historia descriptæ) N^o 9, postmodo quoque omni octiduo ante noctem sumendæ, quæ si non quater minimum alvum solvisent, N^o 11 capiendæ imperabantur. Porro cujusvis diei hora 5^a vespertina sumendus erat ☿ temperans Auctoris (quem inter ejus remedia descriptum non reperio) ad 2 cusp. cultri ex aqua ff. sambuci, et ante decubitum denuo iteranda svadebatur dosis eadem, si major calor rubor dolorve oculum vel caput vexarent, omiſſa omni cœna vel tenui tantum jure assumpto. Mane quovis hauriendum erat infusum ad 3 vel 4 vascula e sequentibus speciebus:

℞. Rad. Sarſapar. ℥ij
 Herb. herniariæ
 ——— euphras. aa Mj.
 Sem. fœniculi ℥ss
 Flor. borrag. p. ij

Santal. citrin. ʒij. Conc. cr. m.
D. pro quavis infusione quantum 3 digiti
capiunt. Denique et aqua ophthalmica
sequens præscripta :

℞. Aquæ euphras.

—— fœnicul.

—— plantag. aa ʒij

Trochisc. alb. RHAS. ʒβ. M. D.

ut mane meridie et vesperi ope lintei-
puri hac aqua humectati oculus leniter
collinatur. In cibo potuque monita ca-
veret calefacientia, salsa, flatulenta, fu-
moque durata; potui cerevisia tenuis de-
fecata concessa: lectio multa ad lychnum
præsertim vetabatur, uti et intuitus in
solem, flammam, &c. et pro arcenda ma-
jori luce prætensum oculis scutum viri-
de vel sericeus pannus, donec oculus mul-
tum emendatus foret, continenter gestan-
dus consulebatur. Vitanda quoque erat
asperior aura ac frigus aeris externi.
Denique lapsis a Væ-Se 4 hebdomadis sca-
rificatio, et ante quemvis mensium flu-
xum aliquot diebus continenter pedilu-
via calida vesperi, imperabantur. Atque
his remediis prorsus deumum convaluit.

HISTORIA X.

F. HOFFMANNI (r)

De ophthalmia initio male tractata pene in chemosin abeunte; at dein meliori mendendi methodo prorsus perfanata.

Miles 24 annorum, biliosus non multo post excubias nocturnas in ventis ac pluvia dextrum oculum dolere et calere sensit, superveniente deinde rubore etiam et inflammatione, crebroque lacrymarum profluvio. Alvus ei ducta, et collyria nervina cum adstringentibus ac terreis remixta, nil opis tulere, uti nec ☿^{us} dein catharticus additus; symptomata inflammationis insigniter crevere, elevabatur adnata carnis crudæ instar rubens, accessere lemæ, et oculum affectum æger nec aperire, nec aperto quidquam videre quivit: donec ab Auctore sequentibus remediis est percuratus. Oculo isthoc collyrium fuit instillatum, lintheaque eodem madida sæpius interdiu atque sub noctem imposita (s):

(r) Diss. casum ægri ophthalmia laborantis exhibens (Opp. suppl. 2. Part. 2. p. m. 78. sqq.)

(s) Ibidem §. 20.

℞. Aqv. papav. errat.

—— rofar. alb. aa ʒijʒ

Lap. scissilis ppt.

Tutiæ ppt. aa ʒʒ

Croci orient. gr. x. M. et agita-
tum D. U. Interne (t) scopo temperante
et antibilioſo datum:

℞. C. C. uſti ppt. ʒ iij

Corall. r. ppt. ʒ ij

Matris perlar. ppt.

Arcan. dupl. aa ʒʒ

Extr. opii cydoniati LANGE L.
gr. iij. M. divide in 8 doſes, ſingulas
mane et a meridie ſemper ſumendas. Et
propter ſymptomatum exacerbationes ve-
ſpertinas præſcriptum (u)

℞. Extr. fumarix ʒ iij

Opii cydon. LANGELOTTI ʒj.
M. Sumat gtt. 40 ante ſomnum. Mane quo-
vis poſt ſem prius dictum hauriendum
erat ſemihora poſt infuſum theatum ſe-
quens (x):

℞. Raſur. lign. ſaſſafr. ʒʒ

Rad. liquir.

—— polypod. quern. aa ʒ iij

—— althææ ʒ ij.

Herb. heder. terr. M. ij

(t) Ibidem §. 21.

(u) Ibidem §. 22.

(x) Ibidem §. 26.

Herb. hepaticæ nobil.

—— fumarix

Flor. papav. err. aa. M. j.

—— viol. purpur. pug. ij.

Cort. ☉ recent. ʒ iij

Sem. anisi stell. ʒj. Incis. D.

Post tridui horum usum datum eccoproti-
cum (y):

℞. Rad. liquirit.

—— polypod. quern.

—— jalapp. aa ʒ iij

Herb. plantag.

—— malvæ aa M. j. Coq. in

Aqv. simpl. f. q. sub finem adde

Fol. fennæ f. f. ʒ iij

Flor. papav. err. p. iij

Passular. minor. ʒss. Ebulliant.

Colatura ʒ viij divid. in 2 doses, quarum
una mox, altera post biduum sumenda
fuit, continuatis tempore intermedio pri-
stinis remediis. Ad lemas vero, palpe-
bras glutinantes satis tenaciter, abster-
gendas calidum lac (z) adhibebatur. Ab
his ubi inflammatio magnopere remisisset,
ſes omiffi sunt, guttulæ vero decade
semper pauciores datæ, donec et hæ mor-

(y) Ibidem §. 23.

(z) Confer §. 72 I. A. No 2.

bo evanescente omitterentur (a). Superstiti vero acri lacrymarum profluvio præter infusum ante dictum sequens etiam ☿ opponebatur (b) :

℞. Corall. rubr. ppt.

C. C. usti ppt. aa ʒ iij

Ungul. alc. ppt. ʒ j

Off. sepiæ ppt. ʒss. M. F. ☿ bis

de die minori quantitate sumendus. Hisque biduo usurpatis mane 3^o datum catharticum (c) :

℞. Ocul. 69 ppt. ʒ j

Scammon. sulphurati gr. vi

Arcan. dupl. gr. x. M. D. pro

dosi: unde ter deiecit; sicque ter vel quater ☿ prior cum hocce cathartico alternis exhibitus: ac demum collyrium novum adhibitum (d) ex aqv. fl. cyani ac scenic. aa ʒj, et lap. scissil. et calaminar. aa ʒss. sicque æger sub idoneo simul diætetico regimine (e) pristinam recuperavit sanitatem.

(a) Dis. cit. §. 24.

(b) Ibidem §. 25.

(c) Ibidem §. 27.

(d) Ibidem §. 28.

(e) Ibidem §. 29. sq.

HISTORIA XI.

EJUSDEM (f)

De alia ejusdemmodi ophthalmia perperam initio tractata, et pure collecto visum perdente, demum curata.

Viro 30 annorum inopinato pauxillum fucci illius acris, quo capillorum concinnatores capillos atro colore inficere solent, in oculum ceciderat. Hinc secutus rubor oculi et dolor acerbissimus, ut patiens nec cibum nec somnum capere posset, ac ferendo cruciatui fere esset impar. Chirurgus in consilium vocatus collyrium ex aqua rosarum plantaginis et tutia frigide instillandum svasit, hocque nihil plane proficiente saccharum hni in aqua rosarum solutum crebrius cum linteo dolenti oculo admoveri jussit; sed nihil his dolorum atrociam mitigatâ, oculi potius bulbus quasi decrevit, et minor factus, humores turbati, et visus plane periit, in cornea quoque tumor instar pisi durus apparuit.(g). Admota quidem nuchæ vesicatoria, usurpata quoque pur-

(f) Med. rat. syst. l. c. obs. 5.

(g) Confer §. 73 No 2. a).

gantia; sed malum plus in deterius quam melius versum. Hinc chirurgus desperabundus deseruit ægrum, omnesque adstantes de visu unquam recuperando dubitare cœperunt, in primis cum præterea palpebra oculi affecti elevari non posset, sed semper clausa et elevata manu sensus expers esset; quin vesiculosus tumor in internis palpebræ compareret aspectum oculi fere intercipiens . . . Nos sequentibus ivimus obviam: $\sqrt{\text{S}}$ camphoratus cum balsamo Peruviano, exhalato prius quæ, cum linteo duplicato crebrius oculo fuit admotus: alvus pilulis ex S^{io} dulci, gummi ammoniaco, extr. panchym. CROCOLII, balsamo Peruviano et sale succini, subducta: adhibita pediluvia: potum copiose infusum theiforme ex veronica et semine fœniculi: datum interius diascordium FRACAST. cum lap. 69 et nitro; et exterius cataplasma ex pomo assato, croco, mica panis similaginei cum lacte coctum (*b*), oculo impositum. His dolor et rubor cum ardore sublatus, palpebræ quoque tumor discussus; sed visus ob corneam ruptam et humores incrassatos rediit nunquam.

(*b*) Confer §. 72 I. C. No 2.

HISTORIA XII.

J. JANINI (i)

*De ophthalmia chemosi dicta cum staphylo-
mate complicata, et utroque hoc malo
curato.*

Faber quidam cum repente in vehementissimam cephalalgiam incidisset, illo nihilo minus die labores continuavit. Crevit noctu dolor, oculos inflammatio corripuit cum dolore; et insequenti die minuebatur visus, plena demum oborta cœcitate. Doloribus continenter auctis febris ac pervigilium supervenit. De-tractus e brachio pedeque sæpius sanguis, oculis aqua vegeto-mineralis applicata, severissimaque imperata diæta, nihil opis attulere; quin imo adnata ac bulbus inflabantur adeo, ut ex suppuratione periculum esset proximum: et vero trans corneam, ut ut haud parum pelluciditatis amiserit, in imo anticæ oculi cameræ hypopion visebatur. Idcirco JANIN continuo totam conjunctivæ protuberantiam

(i) I. c. p. 304. sq.

tiam forfice scarificavit (*k*), et fluente inde sanguine purulento admodum cornea pristinam pelluciditatem sensim adipiscebatur adeo, ut iris pupillaque discerni possent. Verum postero die dolores ac febris vehementius, quam unquam ante, recruduere. Idcirco per complures dies solo lactis sero nutriebatur æger, venaque rursus in pede tusa, et pro oculis præscriptum anodynum:

R. Aquæ rosar. ʒvj, in quæis solve

M. P. de cynoglossa ʒss.

D. pro balneandis oculis, intermedioque tempore eadem hac solutione ope spleniorum fovendis. Capiti applicatum vesicans JANINI (*l*), et 4^o quoque die datum hydragogum (*m*). Pediluvia ac narcotica perinde administrata dolores per momentum pacabant, at intra 23 dies nemo momento quidem somnum procurarunt. Unguentum basiliconis ambobus oculis impositum ingentem membranarum oculi tensionem imminuit, at ulcus corneæ in superiore ejus marginis parte præpedire nequivit, quod erosio brevi ejus lamellis iridis prolapsui viam dedit; staphyloma-

(*k*) Confer §. 55 B. No 8.

(*l*) l. c. p. 397 No 18.

(*m*) Ibidem p. 381 No 1.

que hoc brevi tantum incrementum est
nactum, ut iridis lacerandæ elapsusque
humorum e bulbo metus fuerit. Oculi
autem ægri tantopere dolebant, ut re-
positio iridis suum in situm pressione
tentari nequiverit; simulque pars iridis
elapsa erat aliquatenus ab ulceris labiis
incaerata; siquidem e sulco rubebat,
et primo obtutu excrescentiam carcinoma-
tosam referebat. Hujus itaque ulceris ac
staphylomatis sanandi scopo in usum tra-
hebatur JANINI unguentum ophthalmi-
cum (n), oculique spleniis contegebantur
aqua saturnina Auctoris (o) humectatis.
Atque hisce ab remediis cum dolor et
inflammatio desuissent, staphylomatibus
nihil e pristina magnitudine decessit, ut
ut minus jam inflammatis; applicato au-
tem ope exiguæ pennæ pauxillo butyri
§ ii brevi ambo evanuerunt tumores, cura-
tioque ita accelerata fuit. Visus inde
ægro fuit perquam imminutus; tantus ta-
men, ut majora objecta discerneret, ac
sine duce incederet.

(n) Vide §. 72 II. No 2 c).

(o) Vide §. 72. I. D. No 8.

HISTORIA XIII.

E J U S D E M (p)

De ophthalmia cum herpete humido palpebræ complicata, et una cum illo percurata.

Matrona 37 annorum, sanguinea, in superiore oculi sinistri palpebra humidum aluit herpetem, atque in tarsi marginibus exiguæ eminentiæ visebantur, quæ collecto sensim pure in ulcuscula degenerabant: unde intolerabilis pruritus est obortus, et non ita multo post supervenit adnatæ inflammatio cum lucis impatientia, lemis, ac defludio demum ciliorum. Post V. S. cathartes, balnea, serum lactis, jura aperientia, opiata, diaphoretica, variaque ophthalmica in cassum administrata, consultus demum Auctor præbuit mane ac vesperti duas pilulas BELLOSTI, collyriumque præscripsit (q):

℞. Aquæ rosarum ℥jv

Flor. sulphuris ℥ij. M. Pone in arenam vel cinerem calidum per 12 horas digerenda in phiala bene obturata,

(p) l. c. p. 308.

(q) Ibidem p. 406 No 31.

eam identidem agitando ; postea filtretur liquor , et palpebra illo sæpius per diem lavetur , atque aliquot guttulæ in oculum perinde immittantur. Porro 4^o quoque die exhibuit hydragogum e scammonio ac ꝑ^{io} dulci (r). Ab his matrona intra 45 dies penitus e biennali hoc malo et ad omnia alia remedia rebeli convaluit.

HISTORIA XIV.

J. L. SCHMUCKERI (s)

De gravissima chemosi in infante cum dentitione feliciter Auctoris methodo percurata.

Princeps Regiæ profapiæ 9 mensium principio Junii 1770 repente incidit in oculi sinistri ophthalmiam cum tantis doloribus , ut continenter diu noctuque ploraret , ac ne minimam quidem lucem ferret. Initio dentitio in causa esse visa ; at 14 dies morbo durante accitus Auctor. Palpebræ admodum tumebant , viscidusque humor perpetuo effluebat ; diductis vero palpebris ingens apparuit chemosis

(r) Ibidem p. 385 No 2.

(s) l. c. 44 Beobacht. p. 504 sqq.

cum cornea alba et opaca. Eapropter e vestigio 4 hirudines admotæ, quæ egregie vasa deplevere, iisque demptis hæmorrhagia aliquot adhuc duravit horas. Inde datis internis antiphlogisticis oculo externe quovis bihorio aqua rosarum frigida ante semper eluto applicabantur splenio-la sequenti aqua ophthalmica humectata (t):

R. Aquæ rosar.

— plantag. aa ʒiij

Sacch. ʒ ni ʒj

Alum. crud. ʒjss.

Nox ab his placidior solito. Mane tumor externus parumper subsedit, et inflammatio quoque remissior visa: simulque dentitio subesse detecta. Vesper autem prior inquires cum pulsu febrili aderat, puero pleno gutture clamante ac ubera renuente. Dolor hic etsi a dentitione visus, inflammationem tamen auxit; ut quæ postridie una cum tumore major evaserit. Unde cum vasorum infarctus nil nisi suppurationem minaretur, omni conatu resolutio inflammationis quærebatur: denuo ergo 4 hirudines admotæ, quarum ab una læsa arteriola sanguinem velut e syringa elidebat. Verum pro-

(t) Confer §. 72 I. D. No 8:

pter dentitionem juxta ac majorem sanguinis jacturam cum convulsiones prædicerentur timendæ, quæ fatales esse possent, ecce Princeps continuo expallescebat magnam in syncopen cadit; ex qua tamen brevi iterum se collegit. Arteriæ læsæ fungus agaricus arcte appressus, venarum autem hæmorrhagia sibi relicta plus, quam ante, sanguinis dedit. Abhinc aliquid quietis. Interna remedia continuata, et aqua ophthalmica ante dicta omni hora applicata. Æger inde plus quietis nactus etiam somnum recuperavit, ubera jam appetiit, suumque jus sapide comedit. Postero die inflammatio fere omnis disparuit, et continuo remedium usu effectum, ut æger obtento oculis viridi panno serico lucem jam ferre inciperet. Mense Julio in puriorem aerem translatus. Superstiti oculi debilitati et opacitati corneæ arcanum Auctoris collyrium ita deinceps opem attulit, ut Princeps pristinum per omnia receperit oculi vigorem citra vestigium tanti in eo morbi prægressi.

HISTORIA XV.

E J U S D E M (u)

De vehementi chemosi unius oculi, hypopion causante, feliciter nihilo minus curata.

Puella teneri habitus 8° ætatis anno in hyeme incidit in chemosim cum vehementi febre inflammatoria, cephalalgia, doloribusque oculi non ferendis, præsertim ab admittâ luce, quæ brevi hypopion est consecutum. Illico igitur sanguinis 3 viij e brachio detractæ, interne data refrigerantia, et extus applicata aqua ophthalmica cum alumine ante (x) dicta. Mane postero inflammatio paulisper minor est reperta: quapropter palpebris superiori inferiorique 7 hirudines applicatæ; queis delapsis hæmorrhagia diu adhuc perseveravit. Reliqua remedia sedulo continuabantur. Unde insequente nocte puella prima iterum vice

(u) 1 c. 45 Beobacht. p. 515. sqq.

(x) Vide histor. præced.

placide dormivit; ac die 3^o inflammatio multo jam aderat minor, dolore et ardore oculi remittente, nec non et hypopio decrefcente. Lucem item ægra tergo fenestræ obverso melius jam ferebat. Eodem igitur adhuc die datum eccoprocticum, et inter scapulas vesicans appositum. Die 4^o oculus ubertim lacrymari cœpit. Ophthalmia in dies decrefcebat; hypopion die 8^o evanuit, et ex inflammatione nil jam superfuit præter infarcta hic illic vasa. Suppuratio vesicantis absque addito novo stimulo fovebatur; oculus vero crebrius et aqua frigida eluebatur, et aqua ophthalmica fovebatur, omnique bihorio ex arcano Auctoris collyrio immittebatur in oculum. Atque sic puella post 4 hebdomades sine ullo oculi superstite vitio convaluit.

HISTORIA XVI.

E J U S D E M (y)

De gravissima chemosi a gonorrhœa virulenta præpostere suppressa, nec nisi hacce denuo revocata medelam admittente.

Juvenis 22 annorum, temperamenti fervidi, post vinum, epulas; libidinemque noctu exsatiatam mane dolorifice mingere cœpit, effluente ex urethra viridescente materia ac tumente toto pene. Empyricus clanculum ad opem ferendam rogatus exhibet balsamum Copaivæ ac pilulas e terebinthina; verum inflammatio ita indies crevit, ut æger sub mictu incredibiles cruciatus fuerit perpessus. Ad 4^{um} usque diem fluente gonorrhœa, hujus ipsius vespere ingruit vehemens horror ac febris, ut æger lectum peteret. Postridie ambo oculi fuere magnopere inflammati, persistente pristino mictu dolorifico; gonorrhœa vero substitit. Desperabundo sic ægro præbuit idem empyricus collyrium aquosum cum tutia et

(y) l. c. 47 Beobacht. p. 523. sqq.

vitriolo cyprio. Sed ejusdem diei vespera missus ad ægrum Auctor reperit materiam gonorrhœicam in antica oculi camera collectam et ejusdem ex oculo profluvium (z) cum intolerabili dolore. Mox igitur detracta e brachio sanguinis ℥j, data nitrosa et pro potu decoctum avenæ cum succo citri; peni perinæoque fatus e decocto emollienti quavis hora applicati, oculique spongia molli decocto rad. althææ et aristoloch. rotundæ imbuta lavandi tota nocte imperati, ne acris materia effluens eorum tunicas genasque arroderet. Postero mane pulsus repertus remissior, chemosi non ultra crescente; penis tumor paulisper subsedit: at miæctus dolorificus persistit, et gonorrhœa non dum revertit. E pede ergo rursus ℥x sanguinis demptæ, et sub nitri ac decocti usu a meridie hora 2^a ambabus palpebris 14 hirudines admotæ (a), queis delapsis in 5 adhuc horas hæmorrhagia duravit. Hac cessante aqua ophthalmica aluminosa (b) singulis horis applicari cœpta, identidemque adhuc oculi decocto

(z) Confer §. 22 No 7.

(a) Confer §. 55. B. No 6.

(b) Vide histor. 14.

ante dicto lavandi erant ; fatus penis perinæique continuati. Die 3^o exhibita potio mannata alvum aliquoties movit. Penis inde tumor , ardorque urethræ multum remisit, et ophthalmia cum profluvio materiæ non ultra crevit. Die 4^o data Calomelan. gr. x cum sacch. trita alvum copiose aliquoties subduxere ; symptomata manere , ut pridie. Die 5^o maculæ indusii observatæ, lenique penis pressione viridescens materiæ egressus reversuræ gonorrhœæ spem dabant. Ophthalmia nihilo adhuc minor : eapropter denuo palpebris cum superiori tum inferiori 12 hirudines admotæ, hæmorrhagiaque conquiescente aqua ophthalmica dicta denuo continuabatur. Interne dabatur 3^a quaque hora ℞ erhei gr. vj, nitri puri ℞j ; crebra enim observatio docuit, rheum hujusmodi in casibus cum salibus mediis conjunctum admodum esse diureticum. Potus prioris in locum datum decoctum radic. graminis. Intra 6 dies gonorrhœa uberius evasit; contra vero fluxus oculorum et inflammatio sub idem tempus imminui cœpere. Diei 6^{ti} mane rursus mannata potio exhibita non sine convenienti effectu. Die 7^o gonorrhœa magis invalescente oculi insigniter emendabantur. Die 8^o iterum calomel. gr. x

cum sacch. trita porrecta affatim alvum duxerunt. Inflammatio oculorum effluxusque materiæ gonorrhœicæ ex iisdem continenter minuebatur, gonorrhœa pristinum in statum revertente. Rheum cum nitro aliquot adhuc dies datum, et die 10 sex iterum hirudines admotæ ad vasa prorsus deplenda eo cum successu, ut post triduum tantæ inflammationis vix aliquid superfuerit. Ad robur vasis relaxatis restituendum arcanum Auctoris collyrium omni hora oculis immissum, spleniolaque sequenti spiritu humectata applicita :

R. Ω lavendul.

— anthos aa \mathfrak{z} ij

Essent. croc. \mathfrak{z} j

Camphor. c. \odot^* depurato aa \mathfrak{z} ij.

Atque sic oculis ex toto percuratis gonorrhœa abhinc legitime tractabatur. Post 6 hebdomades demum æger pristinæ valetudini est redditus.

HISTORIA XVII.

SIBBERNII (c)

*De adnatæ inflammatione in suppurationem
texti adiposi bulbum ambientis abeunte,
ac demum sine ullo superstite oculi vitio
persanata (d).*

Adolescens 15 annorum sanus et alacer Decembri 1774 sine manifesta causa incidit in vehementem oculi sinistri dolorem punctorium, ab luce deteriorem, cum lacrymatione et adnatæ vasorum infarctu, at sine febre. Ab aqua laxativa Sedlicensi sale acuata alvo rite soluta oculo aqua vegeto-mineralis (e) frigide forma balnei fatusque applicatur. Noctu febris accessit, erubuit magis oculus cum palpebris vix diducendis, calentibus, tumidulis, caput vehementer indoluit cum faciei rubore, æstu, pulsuque celeri ac duro; identidemque alter etiam dolebat oculus, at sine conspicuo vitio. Idcirco mox vena brachii secta; sed vix 3 v

(c) C. TODE med. chir. Biblioth. 3 Band 2 St.
3 Abschn. p. 173 sqq.

(d) Confer §. 34 No 1. b)

(e) Vide §. 72 I. D. No 8.

sanguinis eductis animo linquebatur æger, cito tamen ad se rediens. Nul-
lam crustam præbuit sanguis. Inde
iterato priore cathartico aquæ vege-
to-mineralis usus continuatus. Ver-
sus vesperam capitis oculique affecti do-
lor geminabatur, bulbo ipso, quod ex
orbita promineret magis, tumere viso,
nihilque remittente febre. Unde vesi-
cans nuchæ impositum, imperatum pe-
diluvium, ac MR^a ex aqua flor. sambu-
ci, nitro, crySTALLIS ☐ri, camphora et
oxymelle in horas sumenda data. Inse-
quente rursus nocte omnia symptomata
magnopere increverunt, accessere con-
vulsivi motus musculorum faciei, lævo
præsertim latere, in biduum durantes.
Vesicans multum feri elicuit; at calidæ
adhuc lacrymæ ex oculo fluebant, ac tan-
tus jam fuit palpebrarum tumor, ut di-
duci nequirent. Quapropter inferiori
palpebræ 3 hirudines admotæ cum nil
profuissent, aliæ etiam temporibus a me-
ridie sunt applicatæ, quæ multum qui-
dem, at sine levamine, fluxere. Pro-
inde aquæ Saturninæ suffectus fatus ex
aqua, aceto, ☉*, et camphora. Nihil
inde tamen inflammatione remittente æger
nocte ante 4^{um} diem summe inquietus
delirabat. Die 4^o et 5^o superior palpe-
bra inferiore plus tumens valde etiam a

bulbo manifeste procurrente fuit tensa. MR^a fotuque novissimo continuatis nocte ante diem 6^{um} novus febrilis horror ingruit, indicans, non domandam hæcenus inflammationem transire in suppurationem : idcirco pro resolventibus externis applicatus emolliens fatus e fol. malvæ, summitatibus verbasci, ac fl. sambuci cum lacte coctis ; quo vehementia doloris paulisper sedata, contra ea tumor palpebrarum bulbique ita increvit, ut iste crepaturam minaretur. Die 8^o sub palpebra superiore fluctuatio percepta, postridie tam manifesta fuit, ut facta ope lanceolæ transversa incisione tenue eruperit pus cum adiposis laciniolis grumulisque sanguinis. Quo facto subsidente tumore palpebræ se se digitis diduci siverunt. Rubebat quidem adnata, sed nativam bulbus magnitudinem habere videbatur. Puris fluxus e vulnere pergebat, quo prorsus subsistente cavum quoddam pone bulbum superfuit integram injecti liquidi unciam capiens. Insequentibus diebus cavum dictum injecto decocto corticis Peruviani cum essentia myrrhæ depurabatur, et ad consanationem disponebatur ; at fluxus materiæ in 4^{am} hebdomadem durans metum arrodendorum orbitæ ossium injiciebat. Principio etiam palpebra superior ex toto erat

immobilis; usus tamen roborantium ejus irritabilitatem pristinumque motum restituit. Bulbus aliquamdiu profundius intra orbitam hærebat, quam alterius oculi; verum et hæc deformitas non multo post evanuit, sanitate integra 5^a hebdomade reversa, nisi quod lævus oculus aliquot menses imbecillitate laborarit, quam sensim roborantia remedia sustulere.

* * *

Plures huc facientes historiæ e PLATERO (f) aliisque consuli possunt; magnopere etiam tironi commendo legendos ophthalmiarum operationi characteræ supervenientium casus, quales A. G. RICHTERUS (g) pluresque alii memoriæ prodiderunt.

(f) l. c.

(g) Obs, chirurg, Fasc. 1. Cap. 13, obs. 1.3.5.6.



SYLLABUS AUCTORUM.

A.

Arnold 177.
Augenius 262.

Acrel III. sq.
Acta Berol. (v. Gohlus)

B.

Acta Hafniens. 31. 59.
256. 313. 349. 497.

Acta nov. Hamdens. 354.
367.

Acta Hassiaca 427.

Acta Mogunt. 310. sq.

Act. n. cur. 27. 29. 43.
55. 58. 65. 73. 96. 101.
119. 121. 222. 419.
496.

Acta nov. nat. cur. 199.

Acta Svecica III. 136.
278. 384.

Ægineta 9. 380.

Aetius 512. sqq.

Alischer 379.

Alix 530.

Amatus 48. 245. 332.
343. 436. 463. 502.

Annal. Vratib. 29. 33. 49.

50. 103. 116. 125. 314

347. 379. 435. 437.

439.

Aquapendente 333. 506.

Braunlein 98. 133.

Baglivus 197.

Baldinger 191.

Barchewitz 112. 198.

Bartholinus 31. 35. 256.

340. 422. 430.

Bayrus 328.

Belloste 330.

Bemerk. v. London 216.

Bergen 24.

Bernhard 427.

Biblioth. allgem. deutsche
288.

Bierling 87. 135. 371.

Binninger 433.

Bisset 233. 323. 335.
sq. 429. 526.

Bloch 113. 286. 301. 543.

Boehmer 119.

Boenneken 125.

Boerhaave 3. 70. 89. 174.

176. 242. 244. 246.

SYLLABUS AUCTORUM.

285. 304. 318. 387. fq.	Delan 441.
393. fq. 455. 506. 545.	Delius 408.
Boetticher 58.	Delpuech 444.
Borellus 212. 338. 430.	Demours 109.
Borrichius 59.	Detharding 424.
Bounhiol 441.	Diemerbroeck 38. 72.
Brendel 40.	Dispenf. Vienn. 489.
Breyer 235. 280.	Dobson 149.
Büchner 98. 116. 128.	Doering 90.
133. 177. 198. 202.	Dolæus 212. 289. 455.
205. 396. 418.	
Büchoz 522.	
Burghart 373.	E.

C.	Erndtel 62. 98. 138. 421.
Camerarius 235.	Efchenbach 139.
Cavallo 461.	Ettmüller 66. 196. 267.
Celsus 3. 4. 11. 112. 114.	313. 321. 342.

207. fq. 244. 246. 267.	F.
288. 419. 463. 500.	
540. fq.	

Chenot 61.	Fischer 435.
Comment. v. Edinb. 117.	Fordyce 216.
149.	Forestus 1. 9. 48. 73. 77.
Comment. Gotting. 58.	100. 103. 306. 324.
Commere. Noricum 24.	398. 417. 436. 464.
105. 125. 370.	513. 527. 551. 558.
Comparetti 56.	556. 560.
Constriti 441.	Fothergill 217.
Coulas 443.	Fraendorffer 491.

D.	Fritze 165.
Decker 549.	Fürstenau 27. 29. 65.
Deidier 442.	

SYLLABUS AUCTORUM.

G.

Gabelchover 51. 319. 333.
 Galenus 2. 71. 166. 211.
 245. 248. 253. 291.
 Gautier 441.
 Gazette salut. 116.
 Geach 214. 223. 239.
 289. 335. 353.
 Gendron 27. 76. 547.
 Genfeliuſ 314.
 Gerbez 433. 440. 465.
 490.
 Gefner 260.
 Gherli 466.
 Gockelius 566.
 Goeritz 29. 33. 437.
 Gohlui 32. 51. 60. 64.
 111. 128. 186. ſqq.
 307. 411. 413.
 Gorter 210.
 Goulard 431. ſqq. 448.
 Grignon 36.
 Grölingiuſ 466.
 Guerin 9. 256. 312. 445.
 526.
 Gulbrand 354. 367.
 Gyrſting 438.

H.

Han 350. 416. 426. 438.
 Haller 235. 287. 424.
 Hallman 384.
 Haanemann 349.

Hartmann 198.
 Heimreich 101.
 Heinrici 234.
 Heiſter 14. 21. 23. 35.
 38. 69. 108. 111. 112.
 229. 255. 258. 266.
 324. 332. 469. ſq. 532
 563. ſqq.
 Helwich 439.
 Henze 528.
 Heurniuſ 36. 269.
 Hildanuſ 93. 94. 262.
 267. 332. 351. 357.
 359. 514. 519. 520.
 526. ſq.
 Hildebrand 199.
 Hippocrates 11. 46. 47.
 127. 136. 166. 207.
 213. 380.
 Hiſt. morh. Vratiſl. 49.
 52. 53. 127. 131. 136.
 196. 219. 239. 289.
 376. 438. 439. 502.
 506.
 Hoffmannuſ 32. 48. 52.
 56. 57. 64. 169. 188.
 194. 228. 258. 294.
 296. 298. 331. 358.
 371. 388. 405. 414.
 429. 431. ſq. 456. 471
 501. ſqq. 570. ſqq.

Hoin 34.
 Holleriuſ 266. 276.
 Home 322.
 Horſtiuſ 130. 195. ſq.
 327.
 Huxham 50. 168.

SYLLABUS AUCTORUM.

I.

Jacchius 1.

James 277.

Janin 99. 117. 224. 233.

280. 281. 282. 355. 401.

fq. 454. 472. 492. 545.

576. fq. 579. fq.

Justinus 423.

K.

Kämpf 427.

Kaltschnied 112.

Kanold 29.

Kirchmeyer 293. 425.

L.

Lachenal 116.

Lahme 472.

Lange 66. 93. 266. 275.

fq. 382. 400. 430. 459.

Lanzonus 45. 55. 73.

166. 255. 419.

Layard 535.

Lemoine 190.

Lentilius 358. 400. 493.

499.

Lentin 380.

Leske 535.

Limprecht 96.

Loffius 91.

Ludwig 58.

M.

Maitre-Jean 266.

Marfinus 347.

Marigues 362.

Merclinius 359.

de la Metrie 340.

Mezger 58. 334.

Misc. nat. cur. 5. 20. 26.

45. 50. 131. fq. 255.

343. 359. 413. 423.

426. 440. 472. 491.

Montanus 438.

Morgagni 300. 339. 423.

508. 522. fq.

Morton 265.

Moyſes Rabbi 72.

Müller 439.

Muys 348. 434.

Muzell 510.

N.

Noſe 191.

O.

Odhelius 57. 111. 136.

319. 422. 546.

Oelumb 219.

Ovidius 71.

P.

Pacchionus 223.

Paræus 101. 372.

Partington 461.

Pauli 52. 239.

Paullini 21. 26. 212. 231.

346. 350. 396.

SYLLABUS AUCTORUM.

Pechlinus 166. 524.
 Pénoué 493.
 Perold 40. 50. 190. 363.
 Phædro 407.
 Philaltheus 39.
 Pietsch 42.
 Platerus 100. 280. 328.
 346. 352. 592.
 Plempius 376.
 Plenck 2. 12. 383. 457.
 199.
 Plutarchus 71.
 Pæller 426.
 Poterius 57.
 Poupart 447.
 Preußius 131.
 Pringle 274. 289. 429.
 434. 447. 199. 453.

R.

Ramazzini 26.
 Rehne 73.
 Reimann 49. 122. 170.
 325. 343. 550. 353.
 361. 372. 377.
 Restaurant 321.
 Reußner 370.
 Reydt 186.
 Rhæes 249.
 Rhodius 36. 269.
 Ribe 278.
 Richter 10. 40. 58. 81. 83.
 86. 147. 214. 49. 371.
 452. 503. 547. 546.
 199. 502.
 Ridley 171.

Riedlinus 18. 22. 37. 54.
 6. 73. 127. 137. 107.
 170. 212. 285. 305. 199.
 317. 320. 326. 397.
 405. 417. 422. 490.
 Rigler 227.
 Riverius 177. 180. 211.
 341. 347. 407.
 Rommelius 5.
 Rosenfield 226. 474.
 Roux 34. 36. 42. 190.
 382. 445. 447.
 Rowley 57. 90. 185. 234.
 269. 541.
 le Roy 307.
 Rucker 370.
 Rulandus 196. 406. 420.
 Rumpel 310. 199.

S.

Sagar 227.
 Saint-Yves 8. 42. 59. 62.
 232. 260. 272. 277.
 427. 437. 474. 493.
 Salehow 137. 449. 199.
 Salmuth 98.
 Samml. Fränk. 125.
 Samml. Pract. (v. Ware)
 Sæctorius 342.
 Satyræ Silcf. med. 269.
 Saunler 117.
 Sauvages 23.
 Schacher 90.
 Schacht 231.
 Schaffer 27.
 Schenck 40.

SYLLABUS AUCTORUM.

Schmucker 22. 76. 77.
 113. 182. 251. 256.
 272. fq. 277. fq. 287.
 395. 421. 453. 580.
 583. 585.

Schneider 136.

Schrœckius 426.

Schulze 262. 373.

Schuster 329.

Schwenkfelt 319.

Scultetus 506.

Seneca 74.

Serenus Sammonic. 414.

Severinus 254.

Sibbern 451. 539.

Sims 429.

Sloan 222. 406. 496. 547

Smetius 87.

Stahlius 54. 427. 440.

Störck 177. 190. 323.

417. 495.

Stoll 155. fq.

Strack 169.

Swieten 175. 303. 342.

421.

Sydenham 241.

T.

Theden 17. 493.

Thonerus 348. 487.

Tillingius 182. 397.

Timæus 342.

Tifsot 379.

Tode 438. 451. 528. 589.

Torti 223.

Toutant 445.

Tralles 239.

Trallianus 418.

Trew 125.

Triller 109. 276.

Trioen 100.

U.

Valentini 50. 131. 412.

Vega 167.

Velschius 342. 396.

Vicat 79. 467.

Vogel 8. 339. 380. 418.

W.

Ware 257. 474. fq. 486

512. 526. 530. 533.

539.

Warner 231.

Wathen 483. fq. 539.

Wedelius 20. 73.

Weikard 23. 237. fq.

Wesemius 276.

Westphal 43.

Whytt 41.

Willius 313. 497.

Wolfius 121.

Woolhouseus 276.

Z.

Zacutus 236. 250. 259. fq.

Zinn 287.

Zwingerus 213.

INDEX RERUM.

A.

- A**bcessibus brachii ophthalmia soluta 134.
Abcessus adnatæ 103. genu ex ophthalmiæ metastasi 131.
Acetum in ophthalmicis 416. præsertim lithargyrii 439.
Achores repressi ophthalmiam causant 56. reversi tollunt 135. sq.
Acidularum vis in ophthalmia 182.
Aeria oculis applicata ophthalmiam creant 26. sqq.
Acuta ophthalmia 13.
Adnatæ tumor in chemo-
si 77.
Aeris ratio in ophthalmiæ curatione 543.
Aetas quæ ophthalmiæ obnoxia? 16.
Aethiops mineralis in ophthalmia serophulosa efficax 232. sqq.
Affectus animi vitandi 540. sq.
Album ovi ophthalmiam minuit 396.
Alimentorum ratio in ophthalmia 541.
Alumen ophthalmicis utile 429.
Alvus fluxa solvit ophthalmiam 127.
Amaurosis post ophthalmiam 114.
Amblyopia post ophthalmiam 114.
Achyloblepharosis spuria in ophthalmia 88. vera ex eadem 112.
Anginæ metastasis ophthalmiam invexit 59.
Angularis ophthalmia 8.
Anserum adeps ophthalmicus 406.
Anthelminticorum externus in ophthalmia usus 524.
Apophlegmatismorum utilitas 314.
Aqua vegeto-mineralis 441. sqq. ejus varia confectio et virtus 448. sqq. frigida oculos roborat, et summum est ophthalmicum 421.
Aquæ ophthalmicæ variæ 420. 463. soteriæ in

INDEX RERUM.

eundem usum 182.
186. sqq. 425.

Arnicae fl. ophthalmici
191.

Arteriotomiae in ophthalmia
utilitas 253. difficultates 257.

Arthritis retropulsa causat
ophthalmiam 64.

Attenuantia ophthalmica
415.

Auripigmenti fl. ophthalmici
199.

Axungiae ophthalmicae,
in primis asferina 406.
et viperina 405.

B.

Balneorum in ophthalmia
usus 291.

C.

Cachexiae ophthalmias
creant 20.

Camphorae externus usus
414. 427.

Cancer oculi ex ophthalmia
109.

Cancerosum virus ophthalmiae
causa 22.

Capillis abrasis ophthalmia
sublata 131 (vid. rasura)

Capitiluvia in ophthalmia
301.

Capitis rasura (v. rasura)

Carbunculus oculi ex
ophthalmia 112.

Caries dentium inflammatur
oculos 42.

Carolinae thermæ hic utiles
182.

Catamenia (v. menses).

Cataracta ophthalmiae effectus
114. ex illius operatione ista nata 35.

Catarrhalis ophthalmia
42. 65.

Cathartica in ophthalmia
quo scopo danda? 165.
sqq. cum quibus cautelis?
nempe qualia? 169.
quoties? 177.
quando vetantur? 184.
¶ 10 addito vis eorum
augetur 227.

Causae ophthalmiarum 16.
sqq. ut est

Cephalæa 41. quæ et
symptoma est 84 et
effectus discussæ ophthalmiae
127. sq.

Cephalica vena in ophthalmia
an secanda? 259.

Cerevisia fusca pota semper
ophthalmiam refovescitans 18.

Chelidonium ophthalmicum
306.

Cheme quid? 10

INDEX RERUM.

Chemosis 9. ejus in ad-
nata tumor quantus?
77.

Chronica ophthalmia 13.
raro curabilis 90.

Cicuta ophthalmica 190.

Ciliorum evulsio (v. pha-
langosis).

Clavus hystericus ex oph-
thalmia discussa 128.

Collyria quid? 394. eo-
rum usus 513 varie-
tas (v. ophthalmica).

Consensus oculorum oph-
thalmiæ causa 19.

Contagiosa ophthalmia
aspectu 70. sqq.

Continua ophthalmia 14.

Convulsiones ophthalmia-
rum symptoma 85 sq.

Cortex Peruv. quando in
ophthalmiis dandus?
214.

Crises ophthalmiarum
116.

Crocus ophthalmicus 415.

Crusta lactea repressa oph-
thalmiam suscitavit 56.

Cucurbitularum in oph-
thalmiis præstantia 303

Curationis in ophthalmia
summa capita 147.

D.

Debiles pallidique oph-
thalmici cortice curan-
di 215.

Definitio ophthalmiæ 1.2.

Dentes cariosi causant
ophthalmiam 42. eo-
rumve dolor 43. vel
eruptio difficilis 43. sq.

Deuteropathica ophthal-
mia 16.

Diæta in ophthalmia 540.
sqq.

Diaphoretica quando dan-
da? 194.

Diarrhœa ophthalmiam
solvit 127.

Diurnæ ophthalmiæ 13.
91, sq. earum causæ
93.

Dolor in ophthalmia 79.

Dysenterici reliquiæ cau-
sarunt ophthalmiam
130.

Dyspnœa letalis ex oph-
thalmiæ metastasi 132.
sq.

Dystichiasis (v. phalan-
gosis).

E.

Eclii virtus ophthalmi-
ca 413.

Effectus ophthalmiarum
varii 93.

Electricitas revocat men-
ses 118. ophthalmiam
curat 461.

Emetica ophthalmiam cre-
ant 66, et biliosam cu-
rant 149. sqq.

INDEX RERUM.

Emollientia quando ad-
movenda? 389. *sqq.*
395. *sqq.*

Enemata quando adhi-
benda? 290.

Epidemica ophthalmia 47
sqq. 73.

Epiphora cum ophthal-
mia 86.

Errhina quando præben-
da? 312.

Exanthemata regressa
ophthalmiam generant
55.

Exstirpatio oculi 535.

Externa ophthalmica S.

Extractum Saturni 449.

F.

Febris ophthalmiæ causa
65. 81. alias sympto-
ma 81. tollitne super-
veniens ophthalmiam?
136. *sq.* intermittens
ei juncta vel ophthal-
miæ sub larva latens
cortice curanda 219,
68.

Fissa iris ex ophthalmia
113.

Fonticulus siccatus oph-
thalmiam induxit 61.
excitatus sustulit (*v.*
ulcera arte facta).

Foricariorum ophthalmia
26.

Freyenwaldensis fontis in
ophthalmia laus 186.

Frontis venæ sectio in
ophthalmia 266.

Fuci faciei ophthalmiæ
causa 27.

Fumi acres oculos inflam-
mant 27.

G.

Galbanatus Spiritus Vini
pro collyrio 427.

Gangræna an unquam ex
ophthalmia visa? 110.

Genera ophthalmiæ 4
sqq.

Genu abscessus (*v.* ab-
scessus).

Glacies pro fotu oculi
421.

Gonorrhœa suppressa cre-
at ophthalmiam 12.
62. *sqq.* revocata cu-
rat 382.

Gossypii laus 407.

H.

Habitualis ophthalmia 13

Hæmorrhagia narium re-
pressa inducit ophthal-
miam 53. huic vero
superveniens eam sol-
vit 116. uti et quæ
ex oculorum canthis
accidit 125.

INDEX RERUM.

Hæmorrhoidum fluxus
subſiſtens ophthalmiam
creat 52.
Hæreditaria ophthalmia
17.
Heterogenea oculis il'a-
pſa 29. qui inde exi-
menda? 512. ſqq.
Hirudines vulvæ labiis
admotæ eliciunt men-
ſes 117. in ophthal-
mia quorſum applican-
dæ? 261. 268. 271.
ſqq. 277. 285 ſqq.
Humida ophthalmia 11.
Hydragoga (v. cathar-
tica).
Hydromel (v. mulſa).
Hypercatharſis ophthal-
miæ cauſa 41.
Hypochondriaci, hyſte-
rici ſpaſmi ophthal-
miam generant 40.
Hypopion ex ophthalmia
97. ſqq. ei inederur
malva 401.
Hyſterici (v. hypochon-
driaci).

I.

Idioſyncraſia ad ophthal-
miam 17.
Ignis oculo illapſus 28.
Illapſa ex oculo eximen-
da 512.
Imperfecta ophthalmia 8.

Impetigo retrogreſſa oph-
thalmiam fecit 55.
Indicationes in ophthal-
mia 148.
Ingeſta ophthalmiam cre-
antia 36.
Inoculatio gonorrhœæ vel
ſcabiæ repreſſæ oph-
thalmiam tollit 382.
ſqq.
Intermittens febris oph-
thalmiæ cauſa 66.
Interna ophthalmia 7.
Iris fiſſa ex ophthalmia
113.
Irritabilitas oculi diſponit
ad ophthalmiam 18.
Iugularis venæ ſectio uti-
lis in ophthalmia 262.

L.

Lac acre nutricis oph-
thalmiam generat 38.
tepidum pro collyrio
397.
Læſio externa oculi 31.
ſqq.
Larvata febris (v. febris).
Latrinæ effluvia (v. fo-
ricariorum).
Laud. liqv. ophthalmicum
474. ſqq.
Laxitas oculi diſponit ad
ophthalmiam 18.
Lentorem humorum fran-
git ☿, præſertim ſcro-
phuloſum 228. 232.

INDEX RERUM.

Letalisne ex se ophthalmia? 114.
 Leucomata ex ophthalmia 111.
 Lignorum decoctum efficax 196.
 Lippitudo 3. arida 4.
 Lonium (v. urina).
 Lucubratio nimia ophthalmiam affert 24.
 Lumbricorum terrestr. succus 190.
 Lux nimia ophthalmiam creat 27. non fertur ea præsentē 86. ideo sub curatione arcenda 544. sqq.

M.

Magnetis in ophthalmia usus 520.
 Malvæ fl. decocti præstantia 401.
 Menses suppressi ophthalmiam accersunt 51. 121. reversi solvunt 116. (v. hirudines).
 Mercurii in ophthalmia multiplex usus 227. sqq. 234 455.
 Metastases ophthalmiam creant 45. eandem solvunt 127. 131. sq.
 Mezerei cortex 310.
 Minii tinctura, ejus vires 450.
 Monocula ophthalmia 5.

Morbi capitis, narium, dentium ophthalmiam inferunt 41.
 Mucilagines pro collyriis 400.
 Mulsæ pro iisdem 418.
 Musculorum faciei spasmi in ophthalmia 85.
 Myosis ophthalmiæ symptoma 85.

N.

Nihili albi unguentum 489
 Nitrum quando dandum? 185.
 Nix ad oculum inflammatum 422.
 Nutricis lac (v. lac).

O.

Oculi extirpatio 535.
 Odontalgia ophthalmiæ causa 43.
 Ophthalmia quid? 1. 2. ejus genera 4. sqq. causæ 16. sqq. prognosis 90. curatio 148. sqq.
 Ophthalmica externa 387. sqq. cautèke in eorum usu 500. delectus illorum 506. sq.
 Ophthalmites quid? 8.
 Ophthalmoxysis 276.
 Opii in ophthalmia usus

INDEX RERUM.

internus 241. externus
474. *sqq.*
Ovi albumi pro collyrio
396.

P.

Palpebrarum spasmus 85.
tumor 77.
Pediluvia 294.
Perfecta ophthalmia 8.
Periodica ophthalmia 14.
curatur cortice 223.
Perla ex ophthalmia 112.
Persicorum ab esu oph-
thalmia 36.
Periscyphismus 380.
Perspiratio suppressa oph-
thalmiam consciscit 45.
Phalangoseos curatio 530
Pharmacía ophthalmiæ
149. *sqq.*
Phimosis palpebrarum 77.
Phlegmone oculi 7.
Phlyctenæ ex ophthalmia
112.
Phosphori urinæ virtus
198.
Phthisis ex ophthalmiæ
metastasi 131.
Piperinæ aquæ laus 189.
Pleuritidis metastasin oph-
thalmia consecuta 59.
Podagram regressam oph-
thalmia excepit 64.
Pomorum pulpa minuit
ophthalmiam 416.

Potus spirituosus ophthal-
miam concitant 36.
Procatacticæ causæ 24.
sqq.
Proegumenæ causæ 16.
599.
Prognosis in ophthalmia
90. *sqq.*
Protopathica ophthalmia
16.
Pterygia ex ophthalmia
111.
Ptyalismo tollitur oph-
thalmia 229. licet non
semper tutus sit 239.
Pupilla arte facta 282.
Purgantia (v. cathartica).
Purulenta cachexia (v. ca-
chexiæ).
Pymontanæ aquæ laus
188.

Q.

Quies animi et corporis
in curatione ophthal-
miæ necessaria 540.

R.

Rasura capitis in ophthal-
mia an tuta? 315.
Recidivæ queis fugiendæ?
342.
Reliquias morbi cortex
abolet 214.
Remedia interna 149. *sqq.*

INDEX RERUM.

- Repercutientia quando in ophthalmia adhibenda? 389. *sqq.* qualia? 420. *sqq.*
 Resolutio benigna ophthalmiæ 116.
 Rubefacientium usus 304.
 Rubor oculi in ophthalmia 76.
- S.**
- Saburra biliosa ophthalmiam inducit 39. *sq.*
 Saccharum Saturni 440.
 Salvatellæ sectio an utilis? 259.
 Sanguinis missio 243. *sqq.* eam indicantia 244. *sqq.* quantitas demendi sanguinis 246. quibus e vasis? 253. modi 284. contraindiantia 288. *sqq.*
 Sanguinis excretiones non factæ ophthalmiam creant 51. *sqq.*
 Saniosa ophthalmia 12.
 Saturni extractum 449.
 Saturnina pro topicis 439.
 Scabies oborra ophthalmiam solvit 136. vel inoculata 384.
 Scarificatio neglecta excitat ophthalmiam 51. facta tollit 268. *sq.* 276. *sqq.*
 Scirrhus oculi ex ophthalmia 109.
 Sclerophthalmia 11.
 Scorbutica ophthalmia 212.
 Scrophulosa ophthalmia 22. queis curanda? 216.
 Sedlicensis aquæ laus 182.
 Seri ex oculis inflammatis effluentis indoles et copia 86. *sq.*
 Serosa ophthalmia 12. 20.
 Setaceæ (v. ulcera arte facta).
 Sexus ophthalmiæ obnoxius 15.
 Sicca ophthalmia 11.
 Siccitas ophthalmiæ causa 47.
 Sinapismi 306.
 Solventia 185.
 Solutio ophthalmiæ varia 116.
 Spasmi ophthalmiæ causa 40. ejusdem symptoma 85.
 Spinæ ventosæ metastasin secuta ophthalmia 59.
 Spiritus (v. vini spiritus).
 Spirituosa (v. potus).
 Staphylomata ex ophthalmia 113.
 Stercus columbæ oculo illapsum 26. vaccinum pro fotu 413.

INDEX RERUM.

Stimulantia topica 408.
 Stimuli ex oculis auferendi 508. cavendique sub curatione 544.
 creantes ophthalmiam 26.

Sudor repressus ophthalmiam causat 45. obortus solvit 126.

Suppuratio oculi ex ophthalmia quotuplex? 97.
 Symptomata ophthalmiæ 74. sqq.

Syphilis ophthalmiæ causâ 23. solo mercurio curabilis 234.

T.

Taraxis 9.

Tarsi ulcerosi ex ophthalmia 108.

Tempestates ophthalmiarum feræces 46.

Tempus ophthalmiam curans 138.

Thymelææ cortex 307.

Tinctura minii 450.

Tineam repressam ophthalmia secuta 57.

Topica (v. ophthalmica).

Trichiasis 530.

Tumor ophthalmiæ varius 77.

Tumores oculi qui exstirpandi? 510.

Tumorum a metastasi ophthalmiæ 61.

Tussis ab ophthalmiæ abitu 132.

Tutia ophthalmica 436.

U.

Vapores resolventes 408.

Variolarum reliquiæ ophthalmiam generant 57. sq. earum miasma scabiem regredi fecit, si-bique univit 385.

Venereum virus (v. syphilis).

Vermes intestinales ophthalmiam movent 39. sq.

Venæ in ophthalmia quæ secundæ? 258.

Væ So (v. sanguinis missi).

Vesicantia alii commendant 319. sqq. alii rejiciunt 318.

Vinum ophthalmiam creat 36. sq. interdum tollit 207. auget præpostere datum 213. ejus spiritus pro collyrio efficax 431. sqq.

Viperarum axungia pro collyrio utilis 405.

Vis externa ophthalmiæ causa 31.

INDEX RERUM.

- Vifus minor ophthalmiæ
 fympfoma et effectus
 89. acutior poft oph-
 thalmiam 93.
- Vitriola ophthalmica
 431. fqq.
- Ulcera arefcemia oph-
 thalmiam fecere 61.
 cornæ tarforumque ab
 ophthalmia 108. fq.
 arte facta eam tollunt
 318. ubi excitanda?
 334. quibus in cafi-
 bus? 342. queis cum
 cautelis? 357. quid
 eadem contraindicet?
 376.
- Unguenta ophthalmica
 489. fqq.
- Urina pro fotu 419.
 ejus contenta refitanti-
 tia ophthalmiam fece-
 re 54.
- Urticæ urentis virtus
 307.

X.

Xerophthalmia 11.

Z.

Zinci flor. pro cölyrio.
 438.



B U D Æ,
 TYPIS CATHARINÆ LANDERER
 VIDUÆ 1783.

